


QK299


.k65

pt.1



Gray Herbarium  
Purchase  
August 1970







# PRODROME

DE LA

# FLORE DU GRAND-DUCHÉ

DE LUXEMBOURG

PAR

J.-P.-J. KOLTZ,

Agent des eaux et forêts.

---

Première partie.

Plantes Phanérogames.

---

LUXEMBOURG.

IMPRIMERIE DE ... RUE DU CURE.

1873.



LIBRARY  
NEW YORK

1. 6  
2. 2



---

Extrait des Publications de la section des sciences naturelles  
de l'Institut R. G.-D.

---

# PRODROME

DE LA

# FLORE DU GRAND-DUCHÉ

DE LUXEMBOURG

PAR

J.-P.-J. KOLTZ,

Agent des eaux et forêts.

---

Première partie.

Plantes Phanérogames.

---

LUXEMBOURG.

L. Schamberger in Luxembourg.

1873.

1211  
K-5  
P-1

**MAR 26 1912**  
Gray Herbarium  
Harvard University

## PROLÉGOMÈNES.

---

---

La connaissance des plantes usuelles, utiles ou nuisibles, remonte à la plus haute antiquité. Elle répondait d'abord à l'indispensable nécessité de l'alimentation et devint ensuite importante comme base de l'exercice de l'art de guérir. Aussi, est-ce par l'étude des simples que commencèrent les recherches approfondies sur le règne végétal ; c'est aussi pourquoi la botanique ne put s'affranchir de la médecine que dans le dernier siècle. Linné lui-même était médecin, et c'est à raison de cette qualité qu'il parvint à obtenir une chaire universitaire. Le grand botaniste était avant tout chirurgien de l'Amirauté. Ajoutons que tout ce que nous comprenons sous la dénomination de sciences naturelles était dans le même cas. Aujourd'hui encore les universités sont faciles à compter, où il existe des facultés spéciales pour ces branches si importantes des connaissances humaines.

Le rôle secondaire, l'espèce de sujétion, dans lequel les hautes études tenaient les sciences naturelles, l'absence de cours spéciaux dans nos établissements d'enseignement moyen, semblent donner le motif pour lequel les Luxembourgeois qui s'illustrèrent en si grand nombre dans les autres branches de l'activité humaine, comptent si peu de représentants parmi les naturalistes. H. Crantz (1721—1800) est le seul qui se soit fait un nom comme botaniste. Encore son activité a-t-elle été, avant tout, consacrée à la médecine.

L'esprit Linnéen, qui s'était fait jour par les progrès réalisés dans les sciences naturelles, parvint enfin à prendre droit de cité chez nous. L'abbé Munchen (1763—1818), nommé en 1803 direc-

teur du collège de Luxembourg, y donna le premier cours de botanique. L'abbé Mazuir, le maître de Tinaut, le remplaça en cette qualité, et jusqu'ici l'aimable science eut sa place au programme, pour prendre une extension exceptionnelle sous le professeur Moris. Au collège de Diekirch, le cours de botanique fut créé par M. Krombach (1831). A l'école modèle des instituteurs, fondée en 1817 à Luxembourg, l'abbé Mazuir professait la botanique dès 1821 à la section française. Ce cours fut donné, à partir de 1823, à la section allemande par M. le directeur Muller. Notre regretté collègue Gærens l'introduisit dès 1844 à l'école normale actuelle, mais l'étude de cette science n'y fut pas continuée.

L'étude des richesses végétales du pays remonte à des temps plus anciens ; c'est ainsi que Dodæns cite la station du *Cyclamen Europæus* <sup>1)</sup> dans la forêt des Ardennes. De Pœderlé <sup>2)</sup> indique le *Pirus intermedia* comme croissant dans le Duché. Plus tard, (1810) Pyrame de Candolle, chargé par le Gouvernement de l'investigation de la Flore du vaste Empire français, explora le département des forêts. Il était accompagné de son frère. S'il y avait eu des botanistes dans la région, l'administration n'aurait pas manqué, comme cela avait eu lieu dans les autres départements, de les lui signaler. <sup>3)</sup> Ses excursions doivent toutefois avoir été très-superficielles, attendu que dans son rapport il dit : « Le pays » est tellement monotone dans sa nature physique que le nombre » des plantes y est très-borné. » Un quart de siècle plus tard, Tinant se chargeait de démontrer que cette contrée si pauvre renfermait près de 1500 espèces, dont plus d'un tiers étaient rares, même pour les régions de la France actuelle.

L'exploration sérieuse du Grand-Duché, sous le rapport botanique, commença vers 1815. MM. Krombach, Marchand père et fils, étudièrent d'abord la Flore des environs de Diekirch. En 1822 et

1) Dodæns, R. Cruydbœck. Anvers 1454.

2) B<sup>on</sup> de Pœderlé. Manuel de l'arboriste et du forestier Belgique. Bruxelles 1792.

3) M. de la Fontaine, père, qui faisait alors son droit à Paris, avait exploré les environs de la ville et de Stadtbredimus. L'herbier qu'il réunit avant 1810 comme élève de München, et qu'il compléta ensuite comme avocat stagiaire, fait partie des collections de la société des sciences naturelles.



1823, M. B. Du Mortier explora une partie du pays en compagnie de Michel. C'est alors qu'il fit la connaissance de Tinaut et que celui-ci s'associa à M. Krombach et à Marehand pour la réunion des matériaux de la *Flore des Ardennes*. L'herbier ainsi formé en commun, fut communiqué à M. Du Mortier, à Lejeune, l'auteur de la Flore de Spa, et à Courtois, directeur du jardin botanique de Liège, pour en vérifier les déterminations. Ce dernier parcourut également le pays <sup>1)</sup> avec Th. Würth, Marchand, Tinant et M. Krombach, et fut suivi de M<sup>lle</sup> Libert, de Nyst, Deronnay, Schaefer, Ch. Morren, Mathieu, Wirtgen, Löhr, Bové, etc.

Le Grand-Duché n'étant alors autonome que de nom, une partie des plantes du pays fut d'abord publiée dans des recueils étrangers. <sup>2)</sup> D'autres plantes furent incorporées aux flores des régions voisines, <sup>3)</sup> et il faut remonter à l'année 1826 <sup>4)</sup> pour trouver les premières notions spéciales sur la végétation du pays. Elles parurent alors en langue hollandaise et furent le précurseur de :

Tinant F.-A. Flore luxembourgeoise, ou description des plantes phanérogames recueillies et observées dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Ce dernier ouvrage qui parut en 1836, étendit ses investigations au Luxembourg, tel que le laissa les traités de 1815. Il remplaça la Flore des Ardennes citée plus haut, dont les événements politiques de 1830 avaient retardé la publication, en en dispersant les auteurs. Tinant le fit suivre d'un herbier des plantes du Grand-

1) Verslag van een Plantkundig Reisje, gedaan in July 1826 in de Ardennes en het Groothertogdom Luxemburg; Dori, R. Courtois. Bydragen II<sup>e</sup> 450 ss.

2) Lejeune A.-L.-S. — Revue de la Flore de Spa. Liège. 1824.

Du Mortier B. C. Flora Belgica, operis majoris prodromus. Tornaci Nerviorum, 1827. — Lejeune A.-L.-S. et Courtois R. Compendium Floræ belgicae. Leodi 1828—1831, Vervie 1836.

3) Schaefer M. Trierische Flora. Trier 1827.

4) Tinant. Opmerkingen over den Grond en de Gewassen der provincie Luxemburg. Bydragen 1826, p. 60.

— Waarnemingen over den Grond en de Gewassen van het Domeinbüsch Grünenwald, by Luxemburg. Bydragen 1826, p. 300.

— Opmerkingen over den Grond en de Gewassen van de oëvers der Mezel, in het Groothertogdom Luxemburg. Bydragen 1826, p. 423.

Marchand. Verhandeling over de Standelkruiden, van het Groothertogdom Luxemburg. Bydragen 1827, p. 423.

Tinant. Opmerkingen over den Grond en de Gewassen van de oëvers der Sure en omstrecken, in het Groothertogdom Luxemburg. Bydragen 1827, p. 517.

Duché dont il entra 10 centuries dans le commerce. Cet exsiccata avait toutefois été précédé de Lejeune et Courtois, choix des plantes de Belgique, Verviers 1825—1827, qui renferma beaucoup d'espèces rares du Grand-Duché.

Depuis lors, les plantes du pays se trouvent très-souvent comprises dans les Flores des contrées voisines. <sup>1)</sup> C'est ainsi que Wirtgen, *Flora der Rheinprovinz* (Bonne 1857), et surtout Garke, *Flora von Norddeutschland* (10<sup>e</sup> éd. 1871), donnent les stations des plantes rares de la vallée de la Syr, de la Moselle, etc. Les mémoires de la société des sciences naturelles contiennent également divers travaux relatifs à notre Flore. <sup>2)</sup> Ce sont tous les ouvrages cités qui forment le fond du présent Prodrôme. Toutefois celui-ci n'a pu se borner à les colliger; ils ont tous été soumis à une étude sérieuse, ce qui donne le motif pourquoi des plantes indiquées ailleurs ont été négligées. En effet, il importait surtout de ne pas devenir le complice d'erreurs de déterminations et autres.

La Flore luxembourgeoise de Tinant, d'une grande exactitude sous le rapport du nombre des espèces, laisse certes à désirer pour ce qui concerne la géographie botanique. La station des plantes rares y est d'ordinaire trop vaguement libellée. Des indications multiples, réunies pendant de nombreuses excursions ou communiquées par la petite phalange de nos botanistes indigènes, a permis de délimiter plus exactement l'aire de dispersion de chaque espèce, d'en reconnaître la distribution ainsi que le plus ou moins de vulgarité ou de rareté. La grande excursion faite en 1869 par la Société royale de botanique de Belgique dans la partie sud du Grand-Duché, par cela qu'elle servit de trait-d'union aux amateurs du pays, imprima un nouvel élan aux recherches des disciples de Flore. La section de botanique de la société des sciences naturelles, créée en 1863, recruta alors de nouveaux adhérents et se forma en comité particulier. Cette réunion de bota-

1) Löhr. *Taschenbuch der Flora von Trier und Luxemburg*. Trier. 1844.

2) Brimmeyr, J.-P. — *Esquisse des environs de la ville d'Echternach*, 1854. Layen. — *Révision des Orchidées du Grand-Duché*, 1855.

Eug. Fischer et A. Meyer. — *Rapport sur les travaux de la section de botanique de la société des sciences naturelles*, 1869.

Meyer, *Hypericineæ*, 1869, p. 135.

Fischer E. — *Les plantes subspontanées et naturalisées de la Flore du Grand-Duché de Luxembourg*, 1872.

nistes luxembourgeois, qui compte aujourd'hui plus de 60 membres, explora le pays dans tous les sens, et ce sont ces nombreuses excursions qui provoquèrent le présent travail et permirent d'en réunir les éléments comme point de départ d'études ultérieures. Aucune recherche n'a été épargnée pour le rendre aussi exact que possible. Témoins les sources où il nous a été donné de puiser et que nous indiquons plus haut.

Le Prodrôme de la Flore luxembourgeoise se meut dans les limites politiques du Grand-Duché actuel. Dans le but de le relier aux pays environnants et de présenter pour autant que possible les avantages d'une botanographie régionale, il se rattache par la classification adoptée aux Flores des pays voisins. Le Synopsis de Koch avec les modifications y apportées par Garke, dans sa *Flora Deutschlands*, celles adoptées par Cosson et Germain de St-Pierre dans leur Flore des environs de Paris, comme aussi le manuel de la Flore de Belgique de Crépin, servirent de guide pour sa partie systématique. C'est dire que le système de Candolle a été généralement adopté.

Pour ce qu'il en est de la nomenclature, les droits acquis par suite de la priorité ont été respectés comme devant seuls être admis par la science. Ceci pour les espèces. Quant aux variétés, celles qui à cause de leur importance avaient été élevées au rang d'espèce, ont seules été portées à la suite du type. Les plantes cultivées d'ancienne date ou généralement ont été exclusivement mentionnées.

L'herbier de Tinant ayant été gracieusement mis à notre disposition par M. Renaud-Boch, il nous a été permis de vérifier jusqu'où les plantes qu'il renferme, concordent avec sa Flore et avec les déterminations des auteurs. L'herbier Ducommun et la Flore de Schlechtendahl nous ont été d'un grand secours sous ce rapport. Il nous a été en outre donné de compléter le travail de Tinant avec l'aide du Prodrôme de la province du Rhin, annoté par lui. C'est à ce dernier qu'il faut rapporter les modifications indiquées sous son nom à la Flore luxembourgeoise.

Les progrès de la culture du sol amènent forcément le défrichement des terrains incultes, le dessèchement des marais et le déboisement. Plus d'une espèce rare ou peu répandue a ainsi été dé-

truite et d'autres encore sont menacées d'une prochaine disparition. Plus d'une localité indiquée par Tinant n'a plus qu'une valeur historique, et il en sera de même pour celles indiquées dans ce Prodrôme. C'est pourquoi nous nous sommes astreint à donner la liste des localités aussi exacte que possible, et que nous recevons avec reconnaissance toute nouvelle indication complétive sous ce rapport.

Il en sera de même pour les noms vulgaires des plantes. Si une synonymie complète sous ce rapport est d'après G. W. Bischoff d'une grande utilité dans les usages de la vie, elle a en outre pour nous un intérêt ethnographique d'autant plus grand qu'elle peut donner le plus souvent une idée de l'aire d'extension de la plante. Nous n'ignorons pas que ces dénominations populaires sont essentiellement vagues et diffèrent très-souvent d'une localité à l'autre; mais nous sommes convaincus que l'essai laborieux tenté sous ce rapport ne sera pas la partie la moins intéressante de ce Prodrôme, que nous plaçons sous le patronage des disciples de Flore, dans le désir de leur être utile.

---

## LISTE DES PERSONNES

**auxquelles sont dues le plus grand nombre  
d'indications de localités.**

- A. Dr Aschmann, président du collège médical à Luxembourg.
- B. Bockholz, ancien ingénieur à Trèves.
- BB. Société de botanique de Belgique.
- BL. Société de botanique du Grand-Duché de Luxembourg.
- Dmtr. Du Mortier, président de la société royale de botanique de Belgique, à Tournay.
- EF. Fischer, Eug., président de la commission d'agriculture à Luxembourg.
- J. Dr Ilse, auteur de la Flore de Thuringen, à Lemberg.
- Kz. Koltz, agent forestier à Luxembourg.
- K. Krombach, père, président de la société de botanique à Luxembourg.
- Md. Marchand, fils. †
- M. Meyer, pharmacien à Eich.

- R. Dr Rosbach, médecin à Trèves.  
 Dr W. Warnimont, employé des contributions à Luxembourg.  
 W. Werner, ancien instituteur à Mersch. †  
 Wtg. Wirtgen, professeur à Coblenze. †

## Ouvrages botaniques

concernant la Flore du Grand-Duché.

- Sch. Schæfer, M. Trier'sche Flora. Trier, 1826.  
 Lj. Lejeune, A. L. S. Revue de la Flore des environs de Spa. Liège, 1824.  
 Lj. et C. Lejeune, A. L. S. et Courtois, R. Compendium Flora Belgicæ. Leodi 1828-1831. Vervie 1836.  
 FB. Du Mortier, C. B. Florula Belgica, operis majoris prodromus. Tornaci Nerviorum. 1827.  
 T. Tinant, L. A. Flore luxembourgeoise. Luxembourg, 1836.  
 L. Löhr, Dr M. J. Taschenbuch der Flora von Trier und Luxemburg. Trier, 1844.  
 EM. Mathieu E. Flore générale de Belgique. Bruxelles, 1853.  
 EB. Bommer et Bautier. Tableau analytique de la Flore belge. Bruxelles, 1854.  
 M. Meyer. Beschreibung der im Groszherzogthum Luxemburg vorkommenden Orchideen. Luxemburg, 1864.  
 BB. Compte-rendu de la 8<sup>e</sup> herborisation (1869) de la société royale de botanique belge (Bulletin t. VIII, de 377 à 405).

## Abréviations et signes.

- C. Commun.  
 AC. Assez commun.  
 R. Rare.  
 AR. Assez rare.  
 ? Plante douteuse ou litigieuse pour notre Flore.  
 ! Signe de certitude. Plante retrouvée à la station indiquée.  
 † Espèce naturalisée, introduite, subspontanée ou cultivée.  
 ① Annuelle.  
 ② Bisannuelle.  
 ♀ Vivace.  
 † Plante ligneuse.

*Les chiffres romains placés entre (—) à la suite d'une famille ou d'une espèce, indiquent la classe de Linnée.*

---

# PLANTES PHANÉROGAMES ou COTYLÉDONÉES.

---

DIVISION I. — **DICOTYLÉES** ou Exogènes.

SUBDIVISION I. — **Dialypétales** ou Polypétales.

CLASSE I. — **Dialypétales hypogynes.**

---

## FAMILLE I. RENONCULACEÆ.

(Juss. Gen. 231. DC. sys. I. p. 127.) [XIII].

Tribu I. — **Clematideæ.** (DC. Sys. I, p. 131.)

**1. Clematis.** (L. Gen. 696.) — Clématite. — Waldrebe.

1) *C. Vitalba.* (L. Sp. 766.) — Hexenstrang, Judesël. T. n° 809.

‡ Fl. Juin-Août. Fructification, Octobre.

AC. Haies, buissons, taillis, particulièrement des terrains calcaires; spontané en Ardennes.

2) ? *C. recta.* (L. Sp. 767) . . . . . T. n° 810.

‡ Fl. Juin-Juillet. Fr. Octobre.

R. Prés en dessous de la Fels-lez-Schengen. T. Cette plante paraît être spontanée; elle a été trouvée entre Marienthal et Hunebour (Mersch) W.; mais elle ne dure que quelques années aux stations fortuites où on la rencontre.

Tribu II. — **Anemoneæ.** (DC. Sys. I, p. 168.)

**2. Thalictrum.** (L. Gen. 697.) — Pigamon. — Wiesenraute.

3) *T. minus.* (L. Sp. 769). . . . . T. n° 811.

‡ Juin-Juillet.

R. Prés et côteaux secs, calcaires, sur la Moselle, entre Remich et Schengen.

AC. En aval de Schengen. T. !

Var. *β. saxatile.* (Gaud Fl. Helv. 3, p. 505) . . . T. n° 812.

‡ Juillet-Août.

R. Prés aux environs de Remich.

4) *T. majus.* (Jacq. Fl. Aust. V. p. 9. t. 420) . . . T. n° 813.

‡ Juillet-Août.

AC. Prairies des vallées de la Moselle et broussailles au-dessus de Schengen.

T. EF. A. !

Var. *β. elatum.* (*Murs. præter Jacq.*) . . . Dmtr. F. B. 1668.

‡ Juillet-Août.

R. Prés secs de la Moselle.

5) *T. flavum.* (*L. Sp. 770*) . . . . . T. n° 815.

‡ Juillet-Août.

AC. Prairies humides et tourbeuses. Bords des rivières, surtout de l'Alzette et de la Sûre près d'Ingeldorf. (Post.) Diekirch et Echternach. M. — Manque en Ardennes.

**3. Anemone.** (*L. Gen. 694.*) — Anemone. — Windröschen.

Sect. I. — *Pulsatilla.* (*Tournf. Inst. 284.*)

6) *A. Pulsatilla.* (*L. Sp. 759.*) — Oschterblum . . . T. n° 816.

‡ Mars-Juin. Refleurit quelquefois à l'automne.

C. par place: Hauteurs arides du grès luxembourgeois et du calcaire conchylien: Pulvermühl, Pétrusse, T. Fort Olizy, Kz. Herrenberg (Diekirch), K. etc. ! R ailleurs Echternach, M.; manque en Ardennes.

Sect. II. — *Anemone.* (*Koch, syn. 10.*)

7) *A. silvestris.* (*L. Sp. 761.*) . . . . . T. n° 817.

‡ Mai et quelquefois en automne.

AR. Lisière des bois, côteaux herbeux sur le calcaire jurassique. Wasserfall (coupe n° 20 du bois de Schifflange.) Kz. Langenberg. Bois de Dudelange. Kz. Grünenwald T. Bois de Vianden K. Côtes de la Sûre au-dessus d'Erpeldange T. K.

8) *A. nemorosa.* (*L. Sp. 762*) . . . . . T. n° 818.

‡ Avril-Mai.

C. Bois, broussailles de tous les terrains.

9) *A. ranunculoides.* (*L. Sp. 762*) . . . . . T. n° 819.

‡ Avril-Mai.

AC. Bois ombragés. C. par place: Birkenbüsch (Ansembourg). Kz. Kopstal, EF. Mandelbach. DW. Bois au-dessous de Bastendorf. K. etc. — R. Ardennes.

Sect. III. — *Hepaticæ.* — (*Koch, syn. 7.*)

10) † *A. Hepatica.* (*L. Sp. 758*) . . . . . E. F. n° 2.

‡ Mars-Avril.

AC. Cultivé. R. subspontané: Howald (Hesperange.) 1844 Clausen. Limpertsberg. EF.

**4. Adonis.** (*L. Gen. 698.*) — Adonide. — Teufelsauge.

11) † *A. autumnalis.* (*L. Sp. 771*) . . . . . E. F. n° 5.

① Juin-Août.

AR. Cultivé, subspontané. Champs arides entre Mondorf et Burmerange, EF. près de Remich. (Dmtr. et Michel.) — Beggen. EF. M.

12) *A. æstivalis*. (*L. Sp.* 771) . . . . . L. n° 13.

① Mai-Juillet.

AR. Champs calcaires et argilo-calcaires, moissons près de Remich. Dmtr. Ehnen, Winfrange, Bous. BB. Wormeldange. L. Mersch. W.! Au-dessus de Mondorf. (A. EF et Kz.)

Var. *β. flava*. (*DC. Sys. I*, 223) . . . . . T. n° 820.

① Juillet.

AR. Moissons aux environs de Remich. L. Wormeldange, Roth, Schrassig, etc. Munsteracht (Fetschenhof). T.

13) *A. flammea*. (*Jacq. Aust. IV.* 355) . . . . . L. n° 14.

② Juillet-Août.

AR. Moissons sur le calcaire de la Moselle, Ehnen. BB! Mondorf. A. EF. Kz.

Tribu III. — *Ranunculeæ*. (*DC. Sys. I*, 228.)

5. *Myosurus*. (*L. Gen.* 394.) — Ratoncule. — Mäuseschwanz.

14) *M. minimus*. (*L. Sp.* 407) . . . . . T. n° 505.

① Avril-Mai.

AC. par place: Champs argileux, imperméables, cultivés avant et inondés pendant l'hiver. Bettembourg. T. Champs au-dessus du village entre le chemin de fer et le chemin de Dudelange. BL ! Au-dessus des étangs de Kockelseheur près du Schnapshof. Kz. Entre Bettendorf et Diekirch. K. Entre Remich et Stadtbredimus. Kz.

6. *Ranunculus*. (*L. Gen.* 699.) — Renoncule. — Hahnenfuss.

Sect. I. — *Batrachium*. (*DC. Sys. I*, 233.)

15) *R. hederaceus*. (*L. Sp.* 781 *ex parte*) . . . . . T. n° 826.

‡ Mai-Août.

AC. Lieux marécageux, tourbeux. Bords des mares, eaux peu profondes.

16) *R. aquatilis*. (*L. Sp.* 781. *Var. α et γ*) . . . . . T. n° 828.

‡ Mai-Juillet.

AC. Eaux tranquilles ou rivières à courant très-rapide. C. dans la Bles. K.

17) *R. tripartitus*. (*DC. Sys. I*, 234) . . . . . T. n° 827.

‡ Mai-Juillet.

R. Mares et fossés tourbeux.

18) *R. trichophyllus*. (*Chaix in Vill. Fl. Dauph. p.* 335.)

‡ Mai-Septembre.

R. Dans la Sûre en amont de Wasserbillig. Erpeldange. K.

19) *R. fluitans*. (*Lmk. fl. Fr. III*, 164.) *R. peucedanifolius*. T. 829.

‡ Mai-Août.

C. Ruisseaux, rivières.



20) *R. divaricatus*. (*Schrank, Bâvierische Fl. II, 104.*)

‡ Juin-Juillet.

AR. Eaux stagnantes, tranquilles, mares. Itzig. EF.

Sect. II. — *Hecatonia*. (*Lour. non DC. nec Koch.*)

21) *R. sceleratus*. (*L. Sp. 776*) . . . . . T. n° 834.

① Mai-Septembre.

AR. Lieux fangeux, marais, fossés. C. par place. Alluvions artificielles de la Sûre entre Ettelbruck et Reisdorf. K. Fossés près de Schuttrange. DW. Queue de l'étang de la Neumühl (*Schrassig*). BL.!

Sect. III. — *Vesicastrum*. (*Gren. et God. Fl. Fr. I, 26.*)

22) *R. platanifolius*. (*L. Mant. 79.*) *R. aconitifolius*. T. n° 830.

‡ Mai-Juin.

R. Bois montueux de l'Ardenne et de sa lisière calcaire. Dnitr. F. B. 1689.

Sect. IV. — *Euranunculus*. (*Gren. et God. Fl. Franç. I, 29.*)

23) *R. Flammula*. (*L. Sp. 772.*) *Botterblumen*. . . T. n° 832.

‡ Juin-Octobre.

C. Marais, fossés, lieux humides.

24) *R. Lingua*. (*L. Sp. 773*) . . . . . T. n° 831.

‡ Avril-Juin.

R. Bords herbeux des étangs, eaux stagnantes, mares. Birel. T. Pleitrang. BL.!

25) *R. auricomus*. (*L. Sp. 775*) . . . . . T. n° 833.

‡ Avril-Mai.

C. Bois humides et haies, lieux herbeux.

26) *R. acris*. (*L. Sp. 779.*) — *Delpes*. *Pelpes* . . T. n° 835.

‡ Mai-Juillet.

C. Prés et lieux humides, mardelles boisées.

27) *R. lanuginosus*. (*L. Sp. 779*) . . . . . T. n° 837.

‡ Mai-Juin.

R. Forêts accidentées. Bois de la Sûre au dessus du moulin d'Erpeldange. T.

28) *R. nemorosus*. (*DC. Sys. I, 280*) . . . . . T. n° 836.

‡ Avril-Juin. Refl. qqf. à l'automne.

AC. Bois montueux, couverts.

29) *R. repens*. (*L. Sp. 779.*) — *Gromes (Moselle)* . . T. n° 838.

‡ Avril-Septembre.

C. Champs, prairies, vignes, lieux frais.

30) *R. bulbosus*. (*L. Sp. 778*) . . . . . T. n° 839.

‡ Mai-Août.

C. Prairies, gazons, bords des chemins, etc.

31) *R. sardous*. (*Crantz, Aust.* 111.) *R. philonotis*. T. n° 840.

① Mai-Août.

C. Champs, près sablonneux humides, bords des mares, endroits inondés, etc.

Var.  $\beta$ . *parvulus*. (*L. et C. Comp. II*, 995) . . . T. n° 840b.

R. Champs secs près de Remich. T.

32) ? *R. parviflorus*. (*L. Sp.* 780) . . . T. n° 842.

① Avril-Juin.

R. Graviers des bords de la Moselle près Wasserbillig. T.

33) *R. arvensis*. (*L. Sp.* 780). . . T. n° 841.

① Mai-Juillet.

C. Moissons, champs cultivés.

Var.  $\beta$ . *inermis*. (*Koch, Sys. p.* 20.)

R. Moissons près de Merzig. K.

**7. Ficaria.** (*Dill. Nov. gen.* 108.) — Ficaire. — Feigwurz.

34) *F. ranunculoides*. (*Mönch, Meth.* 215) Schuörbock. T. n° 843.

‡ Mars-Mai.

C. Bois, prairies, champs humides.

Tribu IV. — Helleboræ. (*DC. Sys. I*, 306.)

**S. Caltha.** (*L. Gen.* 703.) — Populage. — Dotterblume.

35) *C. palustris*. (*L. Sp.* 784.) Schmalz=Frescheblum. T. n° 821.

‡ Avril-Juin.

C. Prés humides, bords des eaux.

Var.  $\beta$ . *minor*. (*DC. fl. Fr. IV.* 918.)

AR. Avec le type.

**9. Eranthis.** (*Salisb. Trans. Linn. Soc. VIII*, 303.) — Éranthie.  
— Winterling.

36) † *E. hiemalis*. (*Salisb. l. c.*) . . . T. n° 825.

‡ Février-Mars.

R. Cultivé et quelquefois spontané.

**10. Helleborus.** (*L. Gen.* 702.) — Hellebore. — Niesswurz.

37) † *H. niger*. (*L. Sp.* 783.) Chreschtblum. . . T. n° 823.

‡ Janvier-Avril.

R. Bois sur la hauteur de Rosport. ? Md. K. Cultivé et quelquefois spontané.

38) *H. viridis*. (*L. Sp.* 784) . . . T. n° 824.

‡ Mars-Avril.

R. Bois secs, pierreux et montueux entre Kopstal et Ansembourg. T. Vieux châteaux. Kz. Entre Steinheim et Echternach. M. Hautes-Ardenes. Dmlr.

39) *H. foetidus*. (*L. Sp.* 784) . . . . . T. n° 822.

‡ Février-Mars.

C. Lieux pierreux des côtes de la Sûre entre Echternach et Rosport. T. Bois de Beaufort. K. Bois d'Echternach (Brimmeyr père). Champs de la Moselle. Lj. et C.

**11. Nigella.** (*L. Gen.* 685.) — Nigelle. — Schwarzkümmel.

40) ? *N. arvensis*. (*L. Sp.* 753) . . . . . T. n° 807.

① Juin-Août.

R. Moissons des terrains calcaires, entre Septfontaines et Kehlen, et sablonneuses le long du Kiém (Niederanven.) T.

41) † *N. damascena*. (*L. Sp.* 753.) Jungfer-im-Grünen. EF. 11.

① Juin-Juillet.

C. Cultivé et souvent subspontané.

42) † *N. sativa*. (*L. Sp.* 753.) Kimmel . . . . . T. n° 808.

① Juillet.

R. Cultivé et quelquefois subspontané dans les champs après la moisson. Le long du Kiém. T.

**12. Aquilegia.** (*L. Gen.* 275.) — Ancolie. — Akelei.

43) *A. vulgaris*. (*L. Sp.* 752.) — Goldwurzel . . . . . T. n° 806.

‡ Juin-Juillet.

C. Bois montueux, rochers.

**13. Delphinium.** (*L. Gen.* 681.) — Dauphinelle. — Rittersporn.

44) *D. Consolida*. (*L. Sp.* 748.) Spuörblum . . . . . T. n° 802.

① Juin-Août.

AC. Moissons, champs cultivés. C. Champs calcaires de la Moselle.

45) † *D. Ajacis*. (*L. Sp.* 748) . . . . . T. n° 803.

① Juin-Juillet.

R. Cultivé et quelquefois subspontané. Vieux château d'Ansembourg. Kz.!

**14. Aconitum.** (*L. Gen.* 682.) — Aconit. — Eisenhut.

46) *A. lycoctonum*. (*L. Sp.* 750) . . . . . T. n° 804.

‡ Juin-Juillet.

AR. Bois, taillis montueux. Kahlscheuer, Kopstal. BL.! Kamphengen (Eisemburg.) T. Stolzemburg. T. K. Hoffelt-Hachiville (van Bastelaar).

47) † *A. Napellus*. (*L. Sp.* 751.) *A. intermedium*. T. n° 805.

‡ Juin-Juillet.

C. Cultivé. Les racines employées par nos pharmacies proviennent du calcaire devonien de l'Eifel (Prüm).

Tribu V. — Paeoniae. (*DC. Prod.* 1. 64.)

**15. Actaea.** (*L. Gen.* 644.) — Actée. — Christophskraut.

48) *A. spicata.* (*L. Sp.* 722.) — Mutterkraut. . . . T. n° 794.  
 4 Mai.

AC. Bois montueux, frais. Fels (Schengen), Johannisberg. Kz. Rodenhof. M. Echternach (Brimmeyr père), etc. R. Ardennes.

**16. Pteronia.** (*L. Gen.* 678.) — Pivoine. — Mohning.

49) † *P. officinalis.* (*L. Sp.* 767.) — Patscheblum. — Peischtrös.  
 4 Mai-Juin.

C. Cultivé et qqf. spontané. Vieux château d'Ansembourg! Eicherberg. Kz.

## II. BERBERIDEAE.

(Vent. Tabl. III. 83. [VI. I.]

**17. Berberis.** (*L. Gen.* 442.) — Vinettier. — Sauerdorn.

50) *B. vulgaris.* (*L. Sp.* 472.) — Dreidaar . . . . T. n° 506.  
 5 Mai-Juin. Fr. Août-Octobre.

AR. Haies, rochers. Wurthsberg (Clausen), Haute- et Basse-Pétrusse. BL! Nouveau château d'Ansembourg. T! Tunnel au-dessous de Schuttbourg. Kz.

**18. Epimedium.** (*L. Gen.* 448.) — Epimède. — Sockenblume.

51) ? *E. alpinum.* (*L. Sp.* 471) . . . . . T. n° 265.  
 4 Avril-Mai.

Spontané. Taillis ombragés du Grünwald près du Kiém. T. Taillis montueux des Ardennes. Md. Dmtr. Prod. 1657. Bettendorf (Courtois).

## III. GARYOPHYLLEAE.

(Juss. Gen. 299.) [X.]

Tribu I. — Sileneae. (*DC. Prod. I.* 351.)

**19. Gypsophila.** (*L. Gen.* 768.) — Gypsophile. — Gypskrant.

52) *G. muralis.* (*L. Sp.* 583) . . . . . T. n° 625.  
 ① Juillet-Septembre.

AR. Champs siliceux un peu humides, murs, chemins, environs de Luxembourg. T. Stolzenbourg. K.

**20. Dianthus.** (*L. Gen.* 365.) — Oeillet. — Nelke.

Sect. I. — Armericastrum. (*DC. Prod. I.* 355.)

53) *D. prolifer.* (*L. Sp.* 587) . . . . . T. n° 630.  
 ① Juin-Septembre.

AC. Champs sablonneux, côtes arides, bords des chemins R. Ardennes.

Var  $\beta$ . *diminutus.* (*L. Sp.* 587.)

R. Avec le type. Johannisberg (Courtois).

54) *D. Armoria.* (*L. Sp.* 586) Wel Armence. . . . T. n° 629.

① Juin-Septembre.

C. Lieux secs, lisières et chemins des bois. haies. Sûre et Ardennes.

- 55) *D. Carthusianorum*. (*L. Sp.* 586) . . . . . T. n° 628.  
 4 Juin-Septembre.

C. Rochers, lieux secs, montueux, sablonneux. R. en Ardennes.

Sect. II. — *Caryophyllum*. (*DC. l. c.*)

- 56) † *D. Caryophyllus*. (*L. Sp.* 587.) — Arménie.  
 4 Juillet-Août.

Cultivé. C'est l'œillet des fleuristes

- 57) *D. arrectus*. (*Dmtr. l. c.*) . . . . . *Dmtr. F. B.* 1353.  
 4 Mai-Juin.

R. Sur les murs des Ardennes. D.

- 58) *D. deltoides*. (*L. Sp.* 586) . . . . . T. n° 631.  
 4 Juin-Septembre.

AC. Prés et collines arides, incultes le long des bois sablonneux.

Var.  $\beta$ . *glauca*. (*L. Sp.* 588.)

R. Avec l'espèce.

- 59) ? *D. cæsius*. (*Smith, in act. Soc. Lin.* 2. 302) . . . T. n° 632.  
 4 Juin-Juillet.

R. Rochers schisteux des Ardennes. D. 1350. Stolzenbourg. Kz.

- 60) † *D. plumarius*. (*L. Sp.* 589.) — Gräsarménie. EF. 17.  
 4 Juillet-Août.

C. Cultivé sur le chaperon des murs surtout en Ardennes. Souvent subspontané.

**21. Saponaria.** (*L. Gen.* 564.) — Saponaire. — Seifenkraut.

- 61) *S. Vaccaria*. (*L. Sp.* 585) . . . . . T. n° 627.  
 ① Juin-Juillet.

C. par place. Moissons de la Moselle et de l'Attert. EF. Hauteur de Dalheim. EF. entre Tuntingen et Greisch. DW. entre Rodange et Lasauvage. A. — Mersch. W. Kz. Simmern. Kz. Lintgen BL. ! Wasserbillig. R. BB ! etc. R. Ailleurs.

- 62) *S. officinalis*. (*L. Sp.* 584) . . . . . T. n° 626.  
 4 Juillet-Septembre.

C. Lisière des bois, berges des rivières, bords des chemins, champs pierreux, décombres; également en Ardennes.

**22. Cucubalus.** (*Gartn. Fruct. I.* 376.) — Cucubale. — Tauben-  
 kropf.

- 63) ? *C. baccifer*. (*L. Sp.* 591.)  
 4 Juin-Août.

R. Bois humides aux environs de Diekirch. Friedbüsch. K.

**23. Silene.** (*L. Gen.* 772.) — Siléné. — Leimkraut.

- 64) *S. inflata*. (*Sm. Fl. Brit. II.* 467.) — Kleckkraut. T. n° 644.

‡ Juin-Septembre.

C. Champs, lieux pierreux, près secs, moissons, rechers, bords des chemins, etc. R. Ardennes.

65) *S. conica*. (*L. Sp.* 598) . . . . . T. n° 649.

① Juin-Juillet.

C. par place. Champs secs et sablonneux, moissons maigres, bords des chemins. Pulvermühl, Dommeldange, Clausen, Bettborn. T. BL.!

66) ? *S. conoidea*. (*L. Sp.* 598) . . . . . T. n° 650.

① Juin-Juillet.

R. Lieux secs. Bellevue, Clausen, Pulvermühl, Dommeldange. T.

67) *S. nutans*. (*L. Sp.* 596) . . . . . T. n° 646.

‡ Mai-Juin.

C. Rochers, le long des bois montueux, coteaux secs R. Ardennes.

68) *S. gallica*. (*L. Sp.* 595.)

① Juin-Juillet.

R. Moissons des terrains secs. Carlshof. EF.

69) *S. noctiflora*. (*L. Sp.* 599) . . . . . T. n° 648.

① Juillet-Octobre.

R. Champs des terrains argileux ou calcaires. Bettendorf (entre la Sûre et la Bles. K. (Courtois). Dommeldange, Beggen. T.

70) *S. Armeria*. (*L. Sp.* 601). . . . . T. n° 645.

① Juillet-Septembre.

R. Rochers entre Gebelsmühl et Kautenbach. BL. entre Vianden et Gemünd vers Hosingen (Courtois). — R. ailleurs et alors échappé des cultures.

**24. Melandryum.** (*Ræhl. Deutschl. Fl. I, 254.*) — Melandre. — Lichtnelke.

71) *M. silvestre*. (*Ræhl. l. c.*) — *Lychnis silvestris*. T. n° 676.

‡ Juin-Août.

C. Prés, lisières des bois.

72) *M. pratense*. (*Ræhl. l. c.*) — *Lychnis dioica*. T. n° 675.

‡ Mai-Septembre.

AC. Bords des chemins, moissons, champs cultivés.

**25. Lychnis.** (*Tourn. Inst.* 175.) — Lychnide. — Kranzrade.

73) † *L. chalconica*. (*L. Sp.* 436.)

‡ Mai-Août.

Se trouve dans la plupart des jardins du cultivateur sous le nom de: Brennende Liebe.

74) *L. Flos-Cuculi*. (*L. Sp.* 625.) — Flèschblum. T. n° 674.

‡ Mai-Juillet.

C. Prés humides, marécageux, bords des fossés, etc.

75) † *L. tomentosa*. (*L. Hort. Ups. Abr.*)

‡ Juin-Août.

C. Cultivé et subspontané. Bellevue. Clausen. Kz.

76) *L. Viscaria*. (*L. Sp.* 625). . . . . T. n° 673.

‡ Mai-Juin.

AR. Gazons secs, montueux, bois siliceux. Durensberg (Pulvermühl), Neudorf. Plankenhof (Fischbach.) BL. Meysembourg T. Le long de la Schetzellbach (Eisembourg.) T. Eisch (Simmern). DW. Krischelheid (Ardennes.) Kz.

77) *L. Githago*. (*Lmk. Ency. méth. III, 643.*)—Roid. T. n° 672.

① Juin-Août.

C. Moissons.

Tribu II. — *Alsineæ*. (*DC. Fl. Fr. 4, 766.*)

Sous-tribu I. — *Sabalineæ*. (*Fenzl. in End. gen. p. 965.*)

**26. *Spergularia***. (*Pers. sys. pl. 504.*)—Spergulaire. — Schuppenmiere.

78) *S. segetalis*. (*Fenzl. in. Led. Fl. Ross. II, 466.*) — *Arenaria segetalis*. . . . . T. n° 636.

① Juin-Juillet.

R. Champs incultes et siliceux aux environs de Dudelange. T. Luxembourg. (Koch syn. 120.)

79) *S. rubra*. (*Pers. sys. pl. I, 504.*)—*Arenaria rubra*. T. n° 637.

① ou ② Mars-Automne, quelquefois jusqu'en Décembre.

C. Lieux sablonneux, bruyères, rues et cours peu fréquentées, décombres.

**27. *Spergula***. (*L. Gen. 586 ex parte.*)—Spargoute. — Spark.

80) *S. arvensis*. (*L. Sp.* 430). . . . . T. n° 659.

② Mai-October.

C. Terrains siliceux, moissons, bords des chemins.

† Var.  $\beta$ . *maxima*. (*Weihe in Bönning's. Prod. 570.*) T. n° 661.

AR. Moissons des Ardennes, linières aux environs de Kockelscheuer. T. !

† Var.  $\gamma$ . *sativa*. (*Bönn. Fl. Monast. 569.*)

AR. Cultivé.

81) *S. pentandra*. (*L. Sp.* 630). . . . . T. n° 660.

② Avril-Mai.

R. Lieux secs et exposés au soleil.

**28. *Sagina***. (*L. Gen. 178 ex parte.*)—Sagine. — Mastkraut. (IV. 3.)

82) *S. procumbens*. (*L. Sp.* 185). . . . . T. n° 272.

① Mai-Août.

AC. Lieux un peu humides et frais, entre le pavé des cours, bords des chemins.

83) *S. apetal.* (*L. Mant.* 559) . . . . . T. n° 273.

① Mai-Août.

C. Lieux herbeux, sablonneux; champs frais, bords des chemins.

Var. *β. saxatilis.* (*Lj. Rev.* 268) . . . . . T. n° 275.

② Mai-Août.

R. Champs humides aux environs de Dudelange et Beltembourg. T. Md.

84) *S. ciliata.* (*Fries, Nov. Ed.* 2. p. 59.) Koch synopsis, ed. 2. 117.

① Mai-Octobre.

R. Champs, jachères.

Var. *β. depressa.* (*Schulz, Koch. l. c. Suppl. Fl. Starg.* 10.)

R. Bruyères entre Fischbach et Plankenhof. K.

**29. Alsine.** (*Whlb. Fl. Lapp.* 87.) — Alsine. — Mire.

85) *A. tenuifolia.* (*Walh. Helv.* 87.) — *Arenaria tenuifolia.*

① Mai-Août. [T. n° 635.

C. Champs incultes, moissons, côteaux secs, bords des chemins, vieux murs.

86) *A. viscosa.* (*Schreb. Koch. Syn.* 125) . . . . . Wtg. n° 227.

① Mai-Juin.

R. Jachères, pâturages, champs arides et sablonneux. Stromberg. Wtg.

**sous-tribu II. — Stellarinae.** (*Fenzl. in End. Gen.* p. 966.)

**30. Mœhringia.** (*L. Gen.* 494.) — Mœhringie.

87) *M. trinervia.* (*Clairv. Man. d'herborisation,* p. 150.) — *Arenaria trinervia* . . . . . T. n° 633.

① Mai-Juin.

C. Bois et haies humides, chemins creux, etc.

**31. Holosteum.** (*L. Gen.* 104.) — Holostie. — Spurre. (III. 1.)

88) *H. umbellatum.* (*L. Sp.* 130) . . . . . T. n° 224.

① Avril-Mai.

AC. Terrains sablonneux, champs incultes, bords des chemins, vieux murs.

**32. Arenaria.** (*L. Gen.* 569 *ex parte.*) — Sabline. — Sandkraut.

89) *A. serpyllifolia.* (*L. Sp.* 606) . . . . . T. n° 634.

① ou ② Mai-Août.

C. Lieux secs et sablonneux, moissons, bords des chemins, murs, etc. R. Ardennes.

**33. Stellaria.** (*L. Gen.* 568.) — Stellaire. — Sternmiere.

90) *S. nemorum.* (*L. Sp.* 603) . . . . . T. n° 639.

② Mai-Juin.

R. Bois humides, bords des ruisseaux boisés, lieux frais. Grünenwald. EF. Beaufort. Senningen. Niederanven. Kz. AC. Ardennes.



91) *S. media*. (*Vill. Fl. Delph. III, 615.*) — Vulekraut. — Vulegràs.  
 ① ou ② Toute l'année. [T. n° 496.

C. Lieux frais, champs humides, bords des fossés, etc.

92) *S. Holostea*. (*L. Sp. 603.*) — Geeskraut. . . . T. n° 640.  
 ④ Mai-Août.

C. Haies, buissons, endroits herbeux, bords des chemins, etc.

93) *S. glauca*. (*Withering, arrang. I, 420*) . . . T. n° 644.  
 ① Juin-Juillet.

R. Prairies humides, bords des fossés, tourbières.

94) *S. graminea*. (*L. Sp. 604*) . . . . . T. n° 642.  
 ④ Mai-Août.

C. Haies, buissons, champs humides, lisières des bois.

95) *S. uliginosa*. (*Murray. Prod. Gött. p. 55.*) *S. aquatica*.  
 ② ou ④ Juin-Octobre. [T. n° 643.

AR. Fossés, bords des mares, ruisseaux, près paludéens des Ardennes.

**34. Cerastium.** (*L. Gen. 585.*) — Ceraste. — Hornkraut.

96) *C. cæspitosum*. (*Link. Enum. Hort. Berol. I, 433.*) *C. viscosum* . . . . . T. n° 665.

① ou ④ Avril-Septembre.

C. Lieux arides, bords des chemins, murs, terrains cultivés, etc.

97) *C. pumilum*. (*Curt. Fl. Lond. fasc. VI, 30.*) T. n° 667 bis.  
 ① Avril-Mai.

AC. Pelouses, rochers, bords des chemins, vieux murs. R. Ardennes.

98) *C. semidecandrum*. (*L. Sp. 627*) . . . . . T. n° 667.  
 ① Avril-Mai.

AR. Champs sablonneux, moissons, bords des chemins.

99) *C. tomentosum*. (*DC. Prod. I, 418*) . . . . . T. n° 669.  
 ④ Mai-Juin.

R. Vieux murs, lieux secs aux environs d'Ansembourg. T.

100) *C. brachypetalum*. (*Desp. ap. DC. Fl. Fr. IV, 777*) T. n° 668.  
 ① Mai-Juillet.

R. Lieux secs, arides, montueux, vignes, bords des chemins du calcaire jurassique.

101) *C. glomeratum*. (*Thuill. Fl. Pa. 225.*) *C. vulgatum*. T. n° 664.  
 ① Avril-Juin.

C. Lieux humides, forêts feuillues, sources, fossés, champs montueux.

Var.  $\beta$ . *apetalum*. (*Dr.*) . . . . . Obs. bot. p. 47.  
 Avec le type: Environs de Luxembourg. Dr.

402) *C. arvense*. (*L. Sp.* 628) . . . . . T. n° 670.  
 † Mai-Juin.

C. Lieux secs, le long des chemins.

35. *Moenchia*. (*Ehrh. Beit.* 2. 277.) Mœnchie.

403) *M. erecta*. (*Flor. der Wett.* 1. p. 219.) *Sagina recta*. T. n° 274.  
 † Avril-Mai.

C. Bruyères sablonneuses, bords des chemins. R. Ardennes.

36. *Malaechium*. (*Fries Fl. Hall.* 77.) — Malaquie. — Weichkraut.

404) *M. aquaticum*. (*Fries l. c.*) *Cerastium aquaticum*. T. n° 674.  
 † Juin-Septembre.

C. Lieux humides, fossés aquatiques, bords des étangs calcaires.

Var.  $\beta$ . *arenaria*. (*God.*) . . . . . Fl. 1. 427.

R. Sables de la Moselle.

#### IV. ELATINEAE.

(Cambessèdes in *Mém. mus.* XVIII, 225.) [VIII, 4.]

37. *Elatine*. (*L. Gen.* 502.) — Elatine. — Tännel.

405) *E. Alsinastrum*. (*L. Sp.* 527) . . . . . T. n° 610b.  
 † Juin-Juillet.

R. Bord des étangs de Kockelscheuer. T. Eaux mortes de la Moselle. L. C.

#### V. LINEAE.

(DC. *Théor. éd.* I. 217.) [V, 5.]

38. *Linum*. (*L. Gen.* 389.) — Lin. — Lein.

406) *L. catharticum*. (*L. Sp.* 401) . . . . . T. n° 502.  
 † Juin-Août.

C. Lieux herbeux, clairières des bois, chemins.

407) *L. tenuifolium*. (*L. Sp.* 398) . . . . . T. n° 501.  
 † Juin-Août.

AR. Bois sablonneux, côteaux calcaires, pelouses arides. C. Par place sur la Moselle. T. Kempgen (Fouhren). Courtois. Bettendorf. BL. ! Rosport. Echternach. Brinmeyr père. Angersberg. Dommeldange. T.

408) † *L. usitatissimum*. (*L. Sp.* 397.) — Flûôs. T. n° 500.  
 ① Juin-Août.

Cultivé, souvent subspontané. Bettembourg, gare. BL. ! Glacis de Luxembourg. Kz.

39. *Radiola*. (*Gml. Sys.* I, 289.) — Radiole. — Zwerglein.

409) *R. linoides*. (*Gml. l. c.*) — R. millegraua . . . T. n° 276.

## ① Juin-Août.

C. Essarts et bruyères tourbeuses des Ardennes. Rambruch. Kz. R. Ailleurs, ordinairement en compagnie de *Centunculus*.

## VI. OXALIDAE.

(DC. Prod. 1. 659.) [X, 5.]

10. *Oxalis*. (*L. Gen.* 582.) — Oxalide. — Sauerklee.

110) *O. acetosella*. (*L. Sp.* 620.) — Guegueksbröd. Huösebröd.

‡ Avril-Mai. [T. n° 677.

C. Bois monteux, humides, lieux ombragés, pierreux.

111) *O. stricta*. (*L. Sp.* 624) . . . . . T. n° 678.

‡ Juin-Octobre.

R. Champs cultivés, jardins, vignes, décombres. (Lj. et C. p. 1. 112.) Schras-sig. EF.

## VII. RUTACEAE.

(Juss. Gen. 295.) [VIII, 1.]

11. *Ruta*. (*L. Gen.* 523.) — Rue. — Raute.

112) † *R. graveolens*. (*L. Sp.* 548.) — Raut . . . EF. 34.

‡ Juillet-Septembre.

Subspontané. Altwies. EF.

12. *Dictamnus*. (*T. Gen.* 522.) — Fraxinelle. — Diptam.

113) † *D. albus*. (*L. Sp.* 548.)

‡ Mai-Juin.

Subspontané. Rochers dans les environs du château de Vianden.!

## VIII. BALSAMINEAE.

(A. Rich. in diet. class. Hist. nat. II. 173.) [V, 1.]

13. *Impatiens*. (*L. Gen.* 1008.) — Impatiente. — Springkraut.

114) *I. noli-tangere*. (*L. Sp.* 1328). . . . . T. n° 373.

① Juin-Août.

AR. Bois ombragés, humides, bords des rivières, mardelles des bois et des mares. Bobüsch (Schrassig.) BL. † Schieren. A. Mandelbach. Toutschennühle (Wiltz.) Kz.

115) *I. Balsamina*. (*L. Sp.* 1325.) — Balsamine.

① Juillet-Septembre.

C. Cultivé et quelquefois subspontané.

## IX. GERANIACEAE.

(DC. Fl. Fr. IV. 838.) [XVI, 2.]

14. *Geranium*. (*L. Gen.* 832.) — Geranium. — Storchschnabel.

116) *G. phaeum*. (*L. Sp.* 953) . . . . . T. n° 1021.

‡ Mai-Juin.

R. Bois montueux près de Stolzenbourg. K.

117) *G. silvaticum*. (*L. Sp.* 953) . . . . . T. n° 1022.

‡ Mai-Juin.

R. Bois montueux, prairies, bords des ruisseaux. Greiveldange. K. Schwarze-  
grund (Baumbüsch.) Kz. Plus abondant en Ardennes. K.

118) *G. pratense*. (*L. Sp.* 954). . . . . T. n° 1023.

‡ Juin-Août.

R. Prairies, bords des eaux. Diekirch. K. Broueb. Kz. AC. Prairies humides  
des bords de la Moselle. Ehnen. BB. ! C. dans les prés de Nagem et Hachiville. !

119) *G. palustre*. (*L. Sp.* 954) . . . . . L. et C. III, 6.

‡ Juillet-Août.

R. Prés paludéens, forêts humides, sources. !

120) *G. sanguinum*. (*L. Sp.* 958) . . . . . T. n° 1020.

‡ Mai-Septembre.

AR. Côtes pierreuses exposées au soleil, Clausen. L. et C. Pulvermühl!, Ma-  
rienthal, Mersch, Diekirch, etc. T.

121) *G. columbinum*. (*L. Sp.* 955) . . . . . T. n° 1027.

① ou ‡ Juin-Septembre.

AC. Bois, buissons, haies, bords des chemins, champs, vignes.

122) *G. dissectum*. (*L. Sp.* 956) . . . . . T. n° 1028.

① Juin-Octobre.

C. Champs argileux, haies, lieux incultes, bords des chemins.

123) *G. molle*. (*L. Sp.* 955) . . . . . T. n° 1024.

① ou ② Juin-Septembre.

AC. Lieux pierreux, secs, décombres, bords des chemins. C. Ruines.

124) *G. pusillum*. (*L. Sp.* 957). . . . . T. n° 1025.

① ou ② Juin-Septembre.

C. Haies, bords des chemins, voisinage des habitations. R. Ardennes.

125) *G. rotundifolium*. (*L. Sp.* 957.) — Daüveföss. T. n° 1026.

① Mai-Octobre.

AR. Lieux stériles, pierreux, haies, buissons, bords des chemins des contrées  
vignobles. Moselle. L. et C. III, 8.

126) *G. Robertianum*. (*L. Sp.* 954.) — Stenkert. T. n° 1029.

① Mai-Septembre.

C. Rochers frais, rocailles, vieux murs, bois, vignes.

**45. Erodium**, (*L'Heritier, Geran. med. DC. Fl. Fr. IV. 838.*) —  
Erodion. — Storehschnabel.

127) *E. cicutarium*. (*L'Héritier in Ait. Hort. Kew. II, 414.*) —  
Sësselblum. . . . . T. n° 1018.

② ou ① Avril-Octobre.

C. Bords des chemins, murs, pelouses, lieux cultivés, etc. des terrains calcaires. R. En Ardennes.

128) *E. pimpinellæfolium*. (*Sibth. Fl. Oxon, p. 211.*) T. n° 1018b.

② ou ① Avril-Octobre.

AR. Moissons, lieux cultivés, bords des chemins des sables des terrains jurassiques.

### X. MALVACEAE.

(R. Brown Cong. p. 8.) [XVI, 5.]

46. *Malva*. (*L. Gen. 841.*) — Mauve. — Malve.

129) *M. Alcea*. (*L. Sp. 971.*) . . . . . T. n° 1033.

‡ Juin-Septembre.

AR. Bords des bois, lieux secs entre Diekirch et Bastendorf (Courtois.) K. Dommeldange. Leespech (Simmern), entre Tuntingen et Greisch. Ehternach (Brimmeyr père.) T. — C. Sur la Moselle L. et C. III, 15.

Var. *β. fastigiata*. (*Malva hismalva.*) (*Lej. Rev. Fl. Spa. p. 147.*)

Avec l'espèce. Lj. et C. III, p. 15.

130) *M. moschata*. (*L. Sp. 971.*) . . . . . T. n° 1034.

‡ Juin-Septembre.

C. Lisières des bois, près secs, endroits arides.

131) *M. silvestris*. (*L. Sp. 969.*) . . . . . T. n° 1031.

② Mai-Octobre.

C. Bords des chemins, haies, buissons, endroits arides. AR. Ardennes.

132) *M. rotundifolia*. (*L. Sp. 969.*) — Këskreitgen. Brëderches-

kraut . . . . . EF. 28. T. n° 1030.

① ou ② Mars-Octobre.

C. Lieux incultes, bords des chemins, voisinage des habitations. R. Ardennes.

133) † *M. crispa*. (*L. Sp. 969.*) . . . . . T. n° 1032.

① Juillet-Août.

Subspontané dans le voisinage des habitations. C. Herrenberg (Diekirch.) K. (Courtois). Finsterthal. Kz.

47. *Altea*. (*L. Gen. 839.*) — Guimauve. — Eibich.

134) † *A. officinalis*. (*L. Sp. 955.*) — Guimov. . . . . T. n° 1036.

‡ Juin-Août.

Naturalisé autour des villages, dans les haies et endroits humides. Vieux château d'Ansembourg. Kz.

135) *A. hirsuta*. (*L. Sp.* 965) . . . . . T. n° 1025.

② Juin-Septembre.

AR. Coteaux calcaires et arides de la Moselle : Machthum. Kz. Wecker à Mauternach. R., de la Sûre. L. et C. (III, 12.) Echternach (Brimmeyr père). Coteau à droite du chemin de Diekirch à la Bleesmühle. K. Helmdange. T.

136) † *A. rosea*. (*Car. dis.* 2 t. 28.) — Rose papale. EF. 28.

② Juillet-Septembre.

C. Cultivé.

48. *Hibiscus*. (*L. Gen.* 846.) — Ketmie. — Eibisch.

137) † *H. Trionum*. (*L. Sp.* 981) . . . . . EF. 36.

① Juin-Septembre.

R. Spontané dans le voisinage des jardins. Parvis de l'église de Clausen. Kz.

138) † *H. syriacus*. (*L. Sp.* 979) . . . . . EF. 29.

‡ Septembre-Octobre.

Cultivé et spontané dans les bosquets abandonnés de la forteresse. Clausen, Limpertsberg, EF. etc.!

## XI. TILIAGEAE.

(*Juss. Gen.* 299.) [XIII, 1.]

49. *Tilia*. (*L. Gen.* 660.) — Tilleul. — Linde. <sup>4)</sup>

139) *T. platyphyllos*. (*Scop. Carn. I*, 373.) — Lann. T. n° 796.

‡ Juin-Juillet. Fr. (Krackelsnoss.) Juillet.

C. par place, manque sur de grands espaces. Bois de la Moselle, de Mersch, de Hosingen, etc. C. Cultivé en allées.

140) *T. silvestris*. (*Desf. Cat. hort. Par.* 152.) Lann. T. n° 795.

‡ Juillet. Fr. Août.

C. par place, manque sur de grands espaces. Bois, forêts des Ardennes et du bon pays. Moselle.

## XII. POLYGALEAE.

(*Juss. in Ann. Mus.* XIV, 386.) [XVII, 3.]

50. *Polygala*. (*L. Gen.* 851.) — Laitier. — Kreuzblume.

141) *P. vulgaris*. (*L. Sp.* 986.) — Kranzblum . . . T. n° 1043.

‡ Mai-Juin.

C. Bois, près, pâturages, bords des chemins

1) Il existe dans le pays plusieurs tilleuls remarquables par leur taille. Nous citerons entre autres celui de Schimpach, 9 mètres de tour; Kehlen, 6 m. 40 de tour; Ansembourg, 3 m. 50 de tour; Clemency, 4 m. 90 de tour; Hostert, 5 m. 10 de tour, etc., le tout à hauteur d'épaules.

Var. *β. oxyptera*. (*Reich. ic.* 46. 49.)

R. Avec l'espèce. Groeknap (Altrier). EF. Kz.

142) *P. comosa*. (*Sch. k. II*, 294) . . . . . T. n° 1043b.

‡ Mai-Juillet.

AC. Lisières boisées et près calcaires près de Luxembourg (L. et C. III, 29), Maethum. BB.! Wecker à Mertel. R. Echternach. K.

143) *P. calcarea*. (*Fr. Schultz, Bot. Zeit.* 1837, p. 752.) Wtg.

‡ Mai-Juin. [Fl. R. n° 250.

R. Gazons calcaires près Mompach (Boekholz et Ilse.) Mertel, Lellig, Wasserbillig (Ilse.)

144) *P. Austriaca*. (*Crantz, Aust. V.* 439.) T. amara. T. n° 1044a.

‡ Mai-Juin.

AR. Prairies humides des terrains calcaires. C. sur la Moselle. T. Sûre près d'Echternach. (L. et C. III, 27.) Nommern. BL.

### XIII. ACERINEAE.

(DC. Théor. élé. 2<sup>e</sup> ed. 244.) [VIII, 1.]

**51. Acer.** (*L. Gen.* 1155 *ex parte*.) — Érable. — Ahorn.

145) *A. campestre*. (*L. Sp.* 1497.) — Hârtholz. — Masselter.

‡ Mai. Fr. Septembre-Octobre. [T. n° 591.

C. Bois taillis, montueux. AC. Ardennes.

146) *A. platanoides*. (*L. Sp.* 1496.) . . . . . T. n° 590.

‡ Avril-Mai. Fr. Septembre.

R. Bois et taillis montueux des Ardennes. T. Schûtbourg. Kz. Cultivé dans les avenues.

147) *A. pseudo-platanus*. (*L. Sp.* 1495.) — Aschtholz, Plaine.

Aschtert . . . . . T. n° 589.

‡ Mai. Fr. Septembre.

C. Bois du calcaire oolitique, manque sur de grands espaces. AC. bois montueux calcaires et des Ardennes. Cultivé dans les avenues.

### XIV. HIPPOCASTANEE.

(DC. Théor. élé. 2<sup>e</sup> éd. 244.) [VII, 2.]

**52. Æsculus.** (*L. Gen.* 488.) — Marronnier. — Rosskastanie.

148) † *Æ. hippocastanum*. (*L. Sp.* 488.) Keschtebâm. T. n° 570.

‡ Mai. Fr. Septembre-Octobre.

C. planté dans les parcs et les avenues; spontané.

149) † *Æ. rubicunda*. (*DC. Lod. bot. cab.* 1242). EF. 31 bis.

‡ Mai. Fr. Septembre-Octobre.

AC. Cultivé comme arbre d'ornement.

## XV. AMPELIDEAE.

(Kunth. in Humb. et Bonpl., nov. Gen. et Sp. V. 223.) [V, 1.]

**53. Vitis.** (*L. Gen.* 284.) — Vigne. — Weinstock.150) † *V. vinifera.* (*L. Sp.* 293.) — Rîf. . . . T. n° 384.

‡ Juin. Fr. Septembre-Octobre.

C. cultivé. Subspontané au bois de Fœls (Schengen); Kz. dans les lieux incultes, montueux et couverts de broussailles au-dessus de Schengen! et vis-à-vis de Wormeldange. T. Clausen. Neudorf. EF. Ourthe et Sûre. EF.

**54. Ampelopsis.** (*Michaux. Fl. bor. am.* I, 159.) — Ampéloside.

— Zauberebe . . . . . EF. 33.

151) † *A. hederacea.* (*Michaux. l. c.*) — Weirîf.

‡ Juillet. Fr. Octobre.

Souvent cultivé pour couvrir les vieux murs et garnir les tonnelles.

## XVI. CELASTRINEAE.

(R. Brown. Gen. rem. 225.) [V, 1.]

**55. Staphylea.** (*L. Gen.* 374.) — Staphylier. — Pimpernuss.152) † *S. pinnata.* (*L. Sp.* 386.) — Kokelter . . . T. n° 495.

‡ Mai-Juin. Fr. Août.

AC. cultivé, subspontané dans les haies, les taillis. Clausen, Bellevue, Bisserpoirt! etc. T.

**56. Evonymus.** (*L. Gen.* 271.) — Fusain. — Spindelbaum.153) *E. europæa.* (*L. Sp.* 286.) Rôde Pâffeschengchen. Rôdmutz.

‡ Mai-Juin. Fr. Septembre-Octobre. [T. n° 372.]

C. Haies, bois taillis. R. Ardennes.

## XVII. MONOTROPEAE.

(Nuttal. Gen. am. I, 272.) [X, 1.]

**57. Monotropa.** (*L. Gen.* 536.) — Monotrope. — Ohnblatt.154) *M. hypopitys.* (*L. Sp.* 555) . . . . . T. n° 613.

‡ Juin-Août.

AC. par place. Parasite sur les racines du pin. Rodenhof, Ditzenberg, Sœul. Kz.

Var.  $\beta$ . *M. hypophegea.* (*Wallr. Sched.* 491.) L. et C. T. n° 737.

AC. sur les racines du hêtre, et du chêne de tous les terrains. Manque sur de grands espaces. T. L. et C.

## XVIII. HYPERICINEAE.

(DC. Fl. Fr. IV, 860.) [XVIII, 1.]

**58. Hypericum.** (*L. Gen.* 982.)—Millepertuis.—Johanniskraut.

— Hardnôl.



155) *H. perforatum*. (*L. Sp.* 1104) . . . . . T. n° 1116.

‡ Juin-Août.

C. Lisières, clairières des bois, bords des chemins.

156) *H. humifusum*. (*L. Sp.* 1105) . . . . . T. n° 1117.

‡ Juin-Septembre.

C. Moissons, bruyères, bois des terrains sablonneux, humides, jeunes coupes.  
AC. Ardennes.

157) *H. quadrangulum*. (*L. Sp.* 1104) . . . . . T. n° 1114.

‡ Juin-Juillet.

C. Bois, buissons, lieux herbeux. R. Ardennes.

158) *H. tetrapterum*. (*Fries, Novit. Succ. ed.* 1. 94) *H. dubium*.

‡ Juin-Août. [T. n° 1115.]

C. Prés et bois humides, bords des fossés. R. Ardennes.

159) *H. pulchrum*. (*L. Sp.* 1106) . . . . . T. n° 1119.

‡ Juin-Septembre.

C. Taillis, lisières des bois, lieux arides, bruyères. AC. Ardennes.

160) *H. montanum*. (*L. Sp.* 1105) . . . . . T. n° 1118.

‡ Juin-Août.

R. Bois et taillis montueux. Steinsel, Bofferdange. BL! Sengels (Tuntingen.) Kz.

161) *H. hirsutum*. (*L. Sp.* 1105) . . . . . T. n° 1120.

‡ Juin-Août.

AC. Bois, buissons, lieux marécageux. R. Ardennes.

### XIX. DROSERACEAE.

(DC. Théor. élém. éd. 1, 214.) [V, 6.]

**59. *Drosera*.** (*L. Gen.* 391.) — Rossolie. — Sonnentrau.

162) *D. rotundifolia*. (*L. Sp.* 402) . . . . . T. n° 503.

‡ Juin-Août.

AC. par place, mais manque sur de grands espaces. Prairies spongieuses, marais tourbeux à *Sphagnum*. Finsterthal (Bœvange) Kz. Buchebüsch (Büschdorf.) Mandelbach (Brouch.) Kz. Clervaux. K. Grosbous. K.

163) *D. longifolia*. (*L. Sp.* 501) . . . . . T. n° 504.

‡ Juillet-Août.

R. Prairies marécageuses, marais tourbeux aux environs de Rambrouch. T. Basbellain. K.

**60. *Parnassia*.** (*Tourn. Inst.* 127.) — Parnassie. — Herzblatt.

164) *P. palustris*. (*L. Sp.* 391.) — Herreblum . . . T. n° 498.

‡ Août-Septembre.

AC. par place. Prairies spongieuses, lieux tourbeux. Eisembourg, Helmdange, T. Brouch, Oberpallen, Fischbach. Kz. etc.

## XX. PYROLACEAE.

(Lindley. nat. syst. 219.) [X, 1]

**61. Pyrola.** (*Tourn. Inst.* 132.) — Pyrole. — Wintergrün.165) *P. rotundifolia.* (*L. Sp.* 567) . . . . . T. n° 616.

‡ Juin-Juillet.

AC. par place. Bois et taillis montueux vers la lisière. R. Ardennes.

166) *P. minor.* (*L. Sp.* 567) . . . . . T. n° 617.

‡ Juin-Juillet.

R. Bois montueux et humides. Unter dem Weyer (Lintgen) Kz. Eicherbüsch.  
BB. ! Echernach (Brimmeyr père). Altrier (Ilse).

## XXI. RESEDACEAE.

(DC. Théor. élém. 214.) [XI, 3.]

**62. Reseda.** (*L. Gen.* 608.) — Reseda. — Wau.167) *R. luteola.* (*L. Sp.* 645) . . . . . T. n° 686.

② Juin-Septembre.

C. Bords des chemins, lieux arides, lisières des bois. AR. dans les Ardennes.

168) *R. lutea.* (*L. Sp.* 645.) — Wele Réséda . . . T. n° 687.

② Juin-Septembre.

C. Lieux arides, bords des chemins. R. Ardennes.

169) † *R. odorata.* (*L. Sp.* 645.) — Réséda. . . . EF. 22.

① Juin-Novembre.

C. Cultivé et quelquefois subspontané dans le voisinage des habitations.

## XXII. NYMPHEACEAE.

(DC. Prop. médie. éd. 2. 119.) [XIII, 1.]

**63. Nuphar.** (*Smith, Prod. Fl. Græc. I,* 361.) — Nuphar. — Mumel.170) *N. luteum.* (*Smith, l. c.*) . . . . . T. n° 801.

‡ Juin-Septembre.

AC. Dans l'Alzette depuis la Gantebeinsmühl jusqu'à Lorentzweiler; ! les eaux mortes de la Moselle (Wintrange.) Kz. C. Ardennes.

**64. Nymphaea.** (*Tourn. Inst.* 137, 138.) — Nénuphar. — Seelilie.171) † *N. alba.* (*L. Sp.* 729) . . . . . T. n° 800.

‡ Juin-Septembre.

Introduit du Luxembourg belge dans les pièces d'eau des parcs de Walferdange, Eisembourg, Steinsel!, etc.

## XXIII. PAPAVERACEAE.

(DC. sys. II, 105.) [XIII, 1.]

**65. Papaver.** (*L. Gen.* 408.) — Pavot. — Mohn.172) † *P. somniferum.* (*L. Sp.* 726.) — Pavô . . . T. n° 792.

## ① Juin-Septembre.

R. Cultivé comme plante oléagineuse et spontané dans les terrains remués, les décombres près des habitations.

Var.  $\beta$ . *setigerum*. (*DC. Fl. Fr.* 5. 985.)

## ① Juin-Juillet.

C. Cultivé dans les jardins pour ses fleurs et plus souvent spontané que le précédent.

173) P. *Rhœas*. (*L. Sp.* 726.) — Engelsblum. — Röd Kûrblum.

① Mai-Septembre. [T. n° 790.]

C. Champs, moissons, terres remuées en compagnie de la Centaurée bleue.

174) P. *hybridum*. (*L. Sp.* 725) . . . . . T. n° 788.

## ① Mai-Juin.

AR. Champs pierreux ou sablonneux, terrains en friche.

175) P. *Argemone*. (*L. Sp.* 725) . . . . . T. n° 789.

## ① Mai-Août.

C. Champs, lieux incultes.

176) P. *dubium*. (*L. Sp.* 726) . . . . . T. n° 791.

## ① Mai-Septembre.

AC. Champs, moissons.

177) C. *Lecoquii*. (*Lamott. Cat.* 1848). . . . . Dr. 41.

## ① Juin-Août.

AC. dans les sols calcaires et argilo-sablonneux: moissons, champs cultivés.

**66. Chelidonium.** (*Tourn. Inst.* 116.) — Chelidoine. — Schellwurz.

178) C. *majus*. (*L. Sp.* 726.) — Gîlzegskraut . . . T. n° 793.

## ② Avril-Septembre.

C. Vieux murs, décombres, lieux pierreux, humides, etc.

Var.  $\beta$ . *laciniatum*. (*Mill. Dict.* 2. non *L.*)

R. Avec l'espèce.

**67. Glaucium.** (*Tourn. Inst.* 130.) — Glaucière. — Hornmohn.

179) † G. *flavum*. (*Crantz. Aust. II*, 141.)

## ① Juin-Août.

R. Anciennement cultivé, spontané dans le voisinage du château de Vianden. K.

**68. Eschscholtzia.** (*Champ swt. br. gard.* 276.)

180) E. *Californica*. (*DG. l. c.*) . . . . . EF. 41.

## ‡ Juillet-Octobre.

Cultivé et très-souvent spontané.

## XXIV. FUMARIACEÆ.

(DC. *sys.* 2. 105.) [XVII, 2.]**69. Corydalis.** (*DC. syst. II.* 113.) — Corydalide. — Hohlwurz.181) *C. solida.* (*Sm. Fl. Beit. II.* 948.) *C. bulbosa.* T. n° 1138.

‡ Mars-Mai.

AC. Bois montueux, haies, broussailles de la région jurassique et calcaire. R. Ardennes et sur le grès bigarré.

182) *C. lutea.* (*DC. Fl. Fr. IV.* 638.) . . . . . EF. 42.

‡ Avril-Septembre.

AC. Vieux murs, décombres à Clausen. !

**70. Fumaria.** (*L. Gen.* 849.) — Fumeterre. — Erdrauch.183) *F. officinalis.* (*L. Sp.* 981.) — Katzekierwel. T. n° 1040.

① Mai-Octobre.

C. Champs, vignes, jardins, terrains nouvellement remués.

184) *F. tenuifolia.* (*Fr. Fl. der Wett.* 9. 14.) . F. Wirtgenii.

① Mai-Septembre.

R. Champs cultivés sur la Moselle. A. environs de Luxembourg. R.

185) *F. Vaillantii.* (*Lois. Not.* 102) . . . . . T. n° 1042.

① Mai-Juin.

R. Champs argilo-sablonneux, vignes. Moersdorf. R.

186) *F. parviflora.* (*Lmck. Enc.* 2. 567) . . . . . T. n° 1044.

① Mai-Août.

AR. Lieux cultivés. Johannisberg. Courtois. Kockelscheuer, Blaschette, sur la Moselle. T.

187) *F. capreolata.* (*L. Sp.* 985) . . . . . T. n° 1039.

① Mai-Septembre.

R. Haies, jardins, buissons, décombres. Johannisberg. Courtois.

## XXV. CRUCIFEREÆ.

(Juss. *Gen.* 257.) [XV.]. DIVISION I. — **SILIQUOSÆ.** (Magnol.)SOUS-DIVISION I. — **Pleurorhycæ.** (DC. *syn.* 2. 157.)Tribu I. — Arabideæ. (*Koch syn.* 36.)**71. Matthiola.** (*DC. Prod. I.* 232.) — Mathiole. — Levkoje.188) † *M. annua.* (*Brow. Kew.* 2. 4. 119.) — Millionair.

① En été.

C. cultivé sous le nom de millionnaire.

189) † *M. incana*. (DC. Prod. 1. 134.) — Quarantaine.

② ou 4 Mai-Juin.

C. cultivé sous le nom de quarantaine.

**72. Chefranthus.** (L. Gen. 815.) — Giroflée. — Lack.

190) *Ch. cheiri*. (L. Sp. 924.) Metzveyol. Märzveyol. T. n° 991.

4 Mai-Juin.

C. Rochers du Boek à Clausen, murs au-dessus du Neuenweg. !

**73. Barbarea.** (Brown. l. c. 409.) — Barbarée. — Winterkresse.

191) *B. vulgaris*. (B. l. c.) *Erysimum barbarea*. . . T. n° 995.

② Avril-Juin.

C. Lieux herbeux, humides.

192) *B. arcuata*. (Rehb. Bot. Zeit. 1820.) *Erysimum arcuatum*.

① Mai-Juin.

AC. par place. Lieux humides. Wasserbillig (Dr Ilse.)

193) *B. stricta*. (*Andozejowsci. apd. Bess. en. pl. Volh. 72.*) *B. parviflora*. (Fries nov. ed. 2. 207.)

② Mai-Juillet.

AC. par place. Lieux humides, manque sur de grands espaces.

194) *B. præcox*. (B. l. c.) *Erysimum præcox*. . . T. n° 996.

② Avril-Juin.

AC. Champs un peu humides des Ardennes, notamment entre Dahl et Wiltz. K.

**74. Arabis.** (L. Gen. 818.) — Arabette. — Gänsekresse.

195) *hirsuta*. (*Scop. Carn. 2. 30*) . . . . . T. n° 1008.

② ou 4 Mai-Juillet.

C. Prairies, lieux pierreux, décombres.

196) *A. sagittata*. (DC. Fl. Fr. V. 592) . . . . . T. n° 1007.

② Mai-Juillet.

AR. Lieux pierreux, côteaux secs, jeunes taillis. Schleifmühl, BL. !

197) *A. arenosa*. (*Scop. Carn. 2. 32*) . . . . . T. n° 1010.

② Avril-Juillet.

C. Murs, rochers, endroits sablonneux, vignes.

198) *A. Turrita*. (L. Sp. 930) . . . . . T. n° 1011.

① Mai-Juin.

R. Taillis rocheux des Ardennes. Rambrouch, Wiltz. T. K. Echternach.

**75. Cardamine.** (L. Gen. 812.) — Cardamine. — Schaumkraut.

199) *C. amara*. (L. Sp. 915) . . . . . T. n° 1012.

4 Avril-Mai.

AC. par place. Ruisseaux ombragés, endroits humides, les bois près du Schetzelbour, bords de la Sûre. C. En Ardennes.

- 200) *C. pratensis*. (*L. Sp.* 915.) — Keesblum . . . T. n° 1013.  
 2 Avril-Juin.  
 C. Prairies, bois humides, etc.
- 201) *C. hirsuta*. (*L. Sp.* 915) . . . . . T. n° 1014.  
 ① Mars-Juin.  
 AR. Clairières des bois, lieux humides et cultivés. C. vignobles.
- 202) *C. silvatica*. (*Link. in Hoffm. phys. Blätt.* 1. 50) T. n° 1015  
 2 Avril-Juillet.  
 R. Bois montueux, lieux ombragés, bord des eaux. Howald (Lintgen.) BL. AC.  
 Ardennes.
- 203) *C. impatiens*. (*L. Sp.* 914) . . . . . T. n° 1016.  
 ① Mai-Juin.  
 AC. en Ardennes, bords des ruisseaux, lieux ombragés. R. ailleurs.
- 76. Nasturtium.** (*R. Brown. in Hort. Kew.* 2. IV. 110.)—Cresson.  
 — Brunnenkresse.
- 204) *N. officinalis*. (*R. Br. l. c.*) — Burekascht. . . T. n° 997.  
 2 Mai-Septembre.  
 AC. par place. Ruisseaux, fontaines, étangs, mares.
- 205) *N. silvestre*. (*R. Br. l. c.*) . . . . . T. n° 998.  
 2 Mai-Automne.  
 C. Bords des eaux, lieux humides, endroits inondés l'hiver; manque dans les  
 Ardennes.
- 206) *N. amphibium*. (*R. Br. l. c.*) . . . . . T. n° 1000.  
 2 Mai-Juillet.  
 C. Bords des eaux, lieux humides.
- 207) *N. palustre*. (*DC. sys. II.* 491) . . . . . T. n° 999.  
 ① Juin-Octobre.  
 R. Endroits humides. AR. Dans les Ardennes.
- 77. Turritis.** (*L. Gen.* 819.) — Tourette. — Thurmkraut.
- 208) *T. glabra*. (*L. Sp.* 930) . . . . . T. n° 1006.  
 ① Mai-Juillet.  
 AC. mais isolé dans les lieux secs et pierreux, sur la bordure des bois, les  
 jeunes coupes de tout le pays.
- Tribu II. — Sisymbriæ. (*Koch, l. c.*)
- 78. Sisymbrium.** (*L. Gen.* 813. *ex parte.*)—Sisymbre.—Ranke.
- 209) *S. Alliaria*. (*Scop. Carn. II.* 26.) — Blöderkraut. Hesperis  
 alliaria . . . . . T. n° 990.  
 ① ou ② Avril-Juin.  
 C. Lieux couverts, buissons, fossés humides.

210) **S. Thalianum.** (*Gaudin. Fl. Helv. 4. 348.*) **Arabis** Th.

① ou ② Avril-Juin. [T. n° 1009.

C. Bois sablonneux, lieux pierreux, champs arides, vignes, bords des chemins.

211) **S. officinale.** (*Scop. Carn. II. 26*) . . . . T. n° 1001.

① Mai-Septembre.

C. Bords des chemins, lieux incultes.

212) **S. Sophia.** (*L. Sp. 922*) . . . . T. n° 1002.

① Mai-Octobre.

AC. par place. Manque sur de grands espaces et en Ardennes. Lieux incultes, décombres, carrières, bords des chemins. Pulvermühl. BL! Cimetières: Bettembourg (Courtois), Tuntingen, DW.

**79. Braya.** (*Sternb. et Hopp. Denksch. I, 65.*) — Braye. — Braya.

213) **B. supina.** (*Koch, Syn. fl. Germ. II, 54.*) — *Sisymbrium supinum.* (*L. Sp. 917.*) . . . . T. n° 1003.

① Juin-Août.

R. Graviers des bords de la Moselle: Grevenmacher. T. Sables humides et champs des rives de la Moselle. Lj. et C. 1162.

**80. Erysimum.** (*L. Gen. 814.*) — Velar. — Hederich.

214) **E. cheiranthoides.** (*L. Sp. 923*) . . . . T. n° 992.

① Juin-Septembre.

C. Bords des chemins et des rivières, champs cultivés, moissons. Manque à l'Ardenne.

215) **E. hieracifolium.** (*L. Sp. 923.*) **E. strictum.** T. n° 993.

① Juin-Juillet.

R. Champs sablonneux entre Dommeldange et Wallerdange. T.!

216) **E. virgatum.** (*Roth. Cat. bot. I, 75*) . . . . T. n° 994.

② Juin-Juillet.

R. Champs humides aux environs de Bettembourg. T.

217) **E. orientale.** (*R. Brown. h. Kew. 2. IV, 117.*) **Brassia** or.

① Mai-Juin. T. n° 981.

C. Champs pierreux de la Moselle à Stadtbredimus. BB! Dans les marnes irisées de Rodenhof, Schrondeweiler, Stegen, Steinsel, etc. BL!

**81. Hesperis.** (*L. Gen. 817.*) — Julienne. — Nachtviole.

218) **H. matronalis.** (*L. Sp. 927.*)

‡ Mai-Juin.

AC. Carrefour du bois: Wasserfall au-dessus du village et du plan incliné en aval du cimetière de Schifflange. R. Chemins de fer de Bettembourg au tunnel près de la barrière n° 7, A. EF, Kz. Ruisseau près de Bastendorf. DW.

Var.  $\beta$ . † *incana* fl. pl. (*Hort.*) *Damaschteblum*.

C. Cultivé pour ses fleurs odorantes.

Tribu II. — Brassicæ. (*Koch, syn.* 58.)

**82. Diplotaxis.** (*DC. Syst. II*, 628.) — Diplotaxe. — Doppelsame.

219) *D. tenuifolia*. (*DC. Sys. II*, 632) . . . . T. n° 1004.

② ou 4 Avril-Octobre.

AC. Murs des fortifications, chemins de rondes : Luxembourg ; Rochers de la Pulvermühl. R. Ruines d'Ansembourg et de Larochette.!

220) *D. muralis*. (*DC. Syst. II*, 634) . . . . T. n° 1005.

② ou ① Mai-Juillet.

AR. Murs et rochers de la Sûre vis-à-vis de Langsur. (Löhr.) Diekirch (Courtois.) AC. environs de Luxembourg, avec le précédent.

**83. Erucastrum.** (*Schimper et Spenner fl. Frib.* 3. 946.) — Erucastrum. — Hundsrauke.

221) *E. obtusangulum*. (*Rehb. fl. excurs.* 693.) — Brassica obtusangula . . . . T. n° 987.

② ou 4 Mai-Juillet.

R. Bords de la Moselle entre Grevenmacher et Wasserbillig. T.

**84. Brassica.** (*L. Gen.* 820 *ex parte.*) — Chou. — Kohl.

222) † *B. oleracea*. (*L. Sp.* 932) . . . . T. n° 982.

② Mai-Juin.

Cultivé partout en grand nombre de variétés.

Var.  $\alpha$ . *acephala*. (*DC. Sys.* 2. 590.)

† *vulgaris*. Schlappmös.

† † *quercifolia*. Wanterkool.

† † † *crispa*. — id. —

Var.  $\beta$ . *capitata*. (*DC. Syst. I*, 2. 590.) Kabes.

† *alba*. Weisse Kabes.

† † *rubra*. Rõde Kabes.

Var.  $\gamma$ . *Sabauda*. L. Savoyer, Wirschem.

† *gemmifera*. (*DC. l. c.* 2. 589.) Brokelë.

Var.  $\delta$ . *gonglioides*. (*L. Sp.* 932.) Coleräv.

Var.  $\varepsilon$ . *botrytis*. (*DC. l. c.* 2. 589.) Choufleur.

† Brocoli.

223) † *B. Napus*. (*L. Sp.* 931) . . . . T. n° 984.

② Avril-Juin.

Var.  $\alpha$ . *oleifera*. (*DC. l. c.* 2. 590.) Kool.



† biennis. (DC. l. c. 592.) ② Wanterkool.

† † annua. ① Summerkool.

Var. β. *Napo brassica*. (L. Sp. 932.) *esculenta*. (DC. l. c. 2. 589.)

† Chou-navet. Erdeoleräv.

† † Navet de Suède. Rutabaga.

† † † Turneps.

224) † *B. Rapa*. (L. Sp. 931) . . . . . T. n° 986.

① ou ② Avril-Juin.

Var. α. *oleifera*. (DC. l. c. 591.) Ribkraut . . . . T. n° 985.

† annua. ①

† † biennis. ②

Var. β. *rapifera*. (Metzger *Kohllart* p. 52.) ② Rib.

† oblonga.

† † depressa.

225) *B. nigra*. (Koch. D. fl. 4, 713.) *Sinapis nigra*. T. n° 979.

① Juin-Août.

AR. Bords des rivières, lieux herbeux, buissons, terrains cultivés. R. Ardennes. C. sur les bords de la Moselle, Mondorf. A. EF. Kz.

**85. *Sinapis***. (L. Gen. 821.) — Moutarde. — Senf.

226) *S. arvensis*. (L. Sp. 933.) *Sinèf* . . . . . T. n° 978.

① Avril-Août.

C. Champs, moissons, lieux cultivés.

227) † *S. alba*. (L. Sp. 934) . . . . . T. n° 980.

② Mai-Juillet.

AR. Moissons, lieux cultivés, linières près Bastendorf. BL. ! Oberanven, EF. Beltembourg. Kz.

228) *S. Cheiranthus*. (Koch. D. fl. IV, 717.) *Brassica Ch*. T. n° 988.

② ou ④ Mai-Août.

R. Lieux cultivés, secs, arides, pierreux, bords des champs. C. Ardennes.

**86. *Raphanus***. (L. Gen. 822.) — Radis. — Rettig.

229) *R. Raphanistrum*. (L. Sp. 935) . . . . . T. n° 977.

① Juin-Août.

C. AC. Moissons, lieux cultivés.

230) † *R. sativus*. (L. Sp. 935.)

① ou ② Mai.

Var. α. *Radicula*. (DC. Sys. 2. 663.) Mondrèdig.

Var. β. *niger*. (DC. l. c.) Ramelasse. Wanterrèdig.

DIVISION II. — **SILICULOSÆ.**Sous-DIVISION I. — **Latifseptæ.**Tribu I. — *Alyssineæ.* (*Koch, Syn.* 621.)**87. Lunaria.** (*L. Gen.* 809.) — Lunaire. — Mondviole.231) *L. rediviva.* (*L. Sp.* 911) . . . . . T. n° 951.

‡ Mai-Juillet.

R. Rochers ombragés et humides des côtes de l'Our entre Stolzembourg et Vianden. T. K.

232) † *L. biennis.* (*Mönch. meth.* 126) . . . . . T. n° 952.

② Avril-Mai.

Cultivé et quelquefois subspontané. Limpertsberg au-dessous du pare de la Fontaine. Kz. Chemin de Godbrange au-dessous de Bourglinster. Kz.

**88. Alyssum.** (*L. Gen.* 805.) — Alysson. — Steinkraut.233) *A. calycinum.* (*L. Sp.* 908). . . . . T. n° 954.

① ou ② Mai-Juin, quelquefois à l'automne.

AC. Lieux secs et sablonneux, tuf calcaire, oolite ferrugineuse. R. Ardennes.

234) ? *A. campestre.* (*L. Sp.* 909) . . . . . T. n° 955.

① Juin-Juillet.

R. Champs pierreux aux environs de Perlé (Ardennes). T.

235) † *A. saxatile.* (*L. Sp.* 908) . . . . . EF. 59.

‡ Mai-Juin.

Cultivé d'ancienne date et quelquefois échappé des jardins.

**89. Berteroa.** (*DC. Sys.* 2. 291.) — Berteroa. — Berteroe.236) *B. incana.* (*DC. l. c.*) *Alyssum incanum* . . . . . T. n° 953.

② Juin-Août.

R. Rochers derrière la maison Hippert de Hesperange. EF.! Bifurcation du chemin de fer en aval de la gare de Bettembourg. A. EF. Kz.

**90. Draba.** (*L. Gen.* 809.) — Drave. — Hungerblume.237) *D. verna.* (*L. Sp.* 896.) *Wieselchen* . . . . . T. n° 956.

① Mars-Mai.

C. Lieux secs, terrains incultes, jachères, vieux murs, etc.

238) *D. muralis.* (*L. Sp.* 643) . . . . . T. n° 957.

② Avril-Juin.

R. Rochers près d'Echternach du côté de Bollendorff. K.

**91. Cochlearia.** (*L. Gen.* 803.) — Cranson. — Löffelkraut.239) † *C. Armoracia.* (*L. Sp.* 904.) *Mièrredeg* . . . . . T. n° 959.

4 Juin-Juillet.

C. Cultivé et souvent subspontané le long des cours d'eaux.

240) ? *C. officinalis*. (*L. Sp.* 903) . . . . . T. n° 958.

4 ou ② Juin-Juillet.

R. Bords de la Moselle près de Wintrange. T. in Prod.

**92. Camelina.** (*Crantz, Aust. I, 70.*) — Cameline. — Dotter.

241) *C. silvestris*. (*Wallr. Sched.* 347). . . . . T. n° 972.

① Juin-Juillet.

AR. Champs au-dessus de Dommeldange. Echternach. T. Pulvermühl, Clausen.

BB. ! AC. dans les guérets montueux de la Moselle. T. !

242) *C. sativa*. (*Crantz. l. c.*) Dföderchen. Gfêle Sämchen.

① Juin-Juillet. [T. n° 971.

Cultivé et souvent naturalisé dans les champs et le long des chemins.

243) *C. dentata*. (*Pers. syn. I. p.* 191). . . . . T. n° 973.

① Juin-Août.

R. Linières. Beaufort 1871 EF. ! Ellange. 1872. A. Kz.

Var.  $\beta$ . *pinnatifida*. (*Pers. l. c. Lej. Rev.*). . . . . T. n° 973b.

Avec l'espèce.

**93. Teesdalia.** (*R. Br. in Hort. Kew. ed. 2. IV, 23.*) — Teesdalie.

244) *T. nudicaulis*. (*R. Br. l. c.*) *T. iberis* . . . . . T. n° 969.

① ou ② Avril-Juin.

C. par place. Lieux secs et siliceux, bords des chemins, surtout en Ardennes.

Var.  $\beta$ . *integrifolia*. (*Dmtr. prodr. fl. Belg.*) . . . . . T. n° 1546.

Avec l'espèce.

**94. Thlaspi.** (*L. Gen.* 802 *ex parte.*) — Tabouret. — Täschelkraut.

245) *T. arvense*. (*L. Sp.* 901.) Herzgespann. . . . . T. n° 964.

① ou ② Mai-Septembre.

AC. Champs, lieux cultivés un peu humides, décombres, bords des chemins.

C. dans le grès rouge. R. en Ardennes.

246) *T. montanum*. (*L. Sp.* 902). . . . . T. n° 967.

4 Avril-Mai.

R. Lisière des bois montueux, côteaux calcaires aux environs d'Echternach. T. (Brimmeyr père.)

247) *T. perfoliatum*. (*L. Sp.* 902) . . . . . T. n° 965.

① ou ② Mars-Mai.

AR. Terres remuées, vignes, clairières dans les taillis. Fœls (Mertert). Kz.

Mont St-Jean. BL. ! Esch s/S. T. Rambrouch. T. aussi commun que *Capsella Bursa pastoris* entre Heiderscheid et Wiltz. DW. !

248) *T. alpestre*. (*L. Sp.* 903) . . . . . T. n° 966.

① Avril-Mai.

R. Schistes arides près de Hosingen, Folschette, Rambrouch, T. Rochers : Echartnach (Brimmeyr père).

**95. Iberis.** (*L. Gen.* 804.) — Iberide. — Bauernsenf.

249) *I. amara*. (*L. Sp.* 906) . . . . . T. n° 970.

① Mai-Septembre.

A. Champs de l'oolite ferrugineuse. ! R. ailleurs. Moselle et Sûre inférieure, Kockelseheuer, T. !

**96. Capsella.** (*Medikus, DC. Sys. II,* 383.) — Capselle. — Hirtentasche.

250) *C. Bursa pastoris*. (*Mönch. Met.* 271) Beitelshmidler.

① ou ② Toute l'année.

[T. n° 973.

C. Plante polymorphe et ubiquiste, généralement répandue.

**97. Lepidium.** (*L. Gen.* 801.) — Passerage. — Kresse.

251) † *L. sativum*. (*L. Sp.* 899.) Cressong. Carmelina. S.

① Juin-Août.

[T. n° 971.

C. cultivé et souvent subspontané près des jardins. Bofferdange. BL. !

252) *L. campestre*. (*R. Brown. in Hort. Kew.* 4. 88). T. n° 968.

② Mai-Juillet.

C. Lieux incultes, clairières des bois sablonneux, bords des chemins.

253) *L. graminifolium*. (*L. Sp.* 900.)

② ou † Juin-Septembre.

R. Bords des chemins, murs, quai près de Wormeldange. K. Vallée de la Moselle. Garke.

254) *L. rudérale*. (*L. Sp.* 900) . . . . . T. n° 961.

① ou ② Mai-Septembre.

AR. Décombres, endroits pierreux près du café Glodt (Gare de Luxembourg.)  
EF. Wecker, Manternach, Mertert, R.—AG. Moselle : Schengen, Wintrange, Stadtbredimus, Wasserbillig. BL. !

255) ? *L. Draba*. (*L. Sp.* 645.)

† Mai-Juin.

R. Champs, décombres derrière le moulin de Steinsel. (1871.) EF.

Tribu II. — Isatideæ. (*Desv. Journ. bot.* III, 162.)

**98. Senebiera.** (*Pers. Sys.* 2. 185.) — Senebrière.

256) *S. Coronopus*. (*Poirier. Ency. méth.* 7. 76.) *Coronopus Senebiera* . . . . . T. n° 960.

## ① Mai-Octobre.

C. Bords des chemins et des évièrs, rues peu fréquentées sur la Moselle, et dans les terres calcaires. R. ailleurs et manque sur de grands espaces.

**99. Isatis.** (*L. Gen.* 824.) — Pastel. — Waid.

257) *I. tinctoria.* (*L. Sp.* 936) . . . . . T. n° 976.

## ① Mai-Juin. Fr. Août.

R. Collines arides aux environs d'Echternach. T. Brimeyr père. Dreisermühl, rochers entre Grevenmacher et Fronay. A ! entre Mertert et Wecker. R.

**100. Neslia.** (*Desvauz, Journ. bot.* III, 162.) — Neslie.

258) *N. paniculata.* (*Desv. l. c.*) . . . . . T. n° 974.

## ‡ Mars-Juin.

C. Champs arides lez Schengen. T. Grevenmacher. L. Pulvermühl. BL.!

**101. Calepina.** (*Desv. Journ. bot.* III, 158.) — Calepine.

259) ? *C. Corvini.* (*Desv. l. c.*) . . . . . , . T. n° 975.

## ① ou ② Mai-Juin.

R. Jachères près d'Echternach. Wrtg.

## XXVI. CISTINEAE.

(*Juss. Gen.* 294, ex parte.) [XIII, 1.]

**102. Helianthemum.** (*Tournf. Inst.* 128.) — Helianthème. — Sonnenröschen.

260) *H. Chamæcistus.* (*Mill. dict. n° 1.*) [1768.] *H. vulgare.* G. [1788]. . . . . T. n° 797.

## ‡ Juin-Septembre.

C. Lieux secs, arides, clairières des bois.

Var.  $\beta$ . *obscurum.* (*Pers. syn. II*, 79.) *H. obscurum.*

[T. n° 798.]

R. Lieux secs au-dessus de Dommeldange. T.

Var.  $\gamma$ . *sperpyllifolium.* (*Crantz, a. f. 2. t. 6. f. 2.*) T. n° 797b.

## ‡ Juin-Août.

R. Champs secs des Ardennes. (Michel.) Dmtr. P. fl. B. 1500.

261) *H. polifolium.* (*Cistus. L. Sp.* 745) . . . . . L. n° 146.

## ‡ Juin-Août.

R. Coteaux secs de la Moselle près Schengen. (Löhr, 146.)

Var.  $\beta$ . *pulverulentum.* (*DC. Fl. Fr. IV*, 823) . . . T. n° 799.

AG. Les lieux secs des côtes de la Moselle, de Remich à Schengen. T. et aux environs de Luxembourg. C. et L. 957. Bellevue (Courtois.)



271) † *V. Altaica*. (*Pall. in R. et S. syst. V, 383.*)

‡ Avril-Septembre.

272) † *V. elatior*. (*Fr. nov. ed. II, 277.*)

‡ Avril-Septembre.

Ces deux variétés et leurs hybrides (*tricolor-altaica*, *elatior-tricolor*) donnent les variétés de Pensées cultivées pour leur coloris, leur ampleur et leur richesse florifère.

273) *V. Rothomagensis*. (*Desf. cat. 152*) . . . . T. n° 382.

‡ Mai-Octobre.

AR. Moissons et bois taillis des Ardennes. T. entre Stolzenbourg et Bivels, entre Feulen et Heiderscheid. K.

274) *V. intermedia*. (*Lej. Fl. Spa. 343*) . . . . T. n° 383.

① Juin-Août.

R. Prés secs aux environs de Rambrouch. T.

## CLASSE II. — Dialypétales périgynes.

### XXVIII. RHAMNEAE.

(R. Brown. Gen. rem. 22.) [V, 1.]

**104. Rhamnus.** (*L. Gen. 265.*) — Nerprun. — Wegdorn.

275) *R. cathartica*. (*L. Sp. 279.*) Weedaar. Scheisdaar.

‡ Mai-Juin. Fr. Août-Septembre. [T. n° 370.

AC. par place, mais manque sur de grands espaces. Haies, bois et taillis montagneux, rochers : Clausen, Pétrusse, Pulvermühl, Tuntingen ; manque en Ardennes.

276) *R. frangula*. (*L. Sp. 280.*) Schwarze Faulbaum. Polferholz.

Stenkhholz. Krætzschîel . . . . . T. n° 371.

‡ Mai-Juillet. Fr. Août-Septembre.

C. Bois taillis, haies, clairières des bois, sur les sols secs et arides.

### XXIX. PAPILIONACEAE.

(L. Gen. ord. nat. 32.) [XVII, 4.]

Tribu I. — Lotææ. (*DC. Prod. I, 115.*)

Sub-tribu I. — Genisteæ. (*Koch, Syn. 165.*)

**105. Sarothamnus.** (*Wim. Fl. v. Schles 278.*) — Sarothamne. — Binsenstrauch.

277) *S. scoparius*. (*L. Sp. 996.*) Ginz. (*Genista scoparia.*)

‡ Avril-Juin. [T. n° 1046.

C. Terrains incultes, siliceux, notamment en Ardennes.

**106. Cytisus.** (*L. Gen. 785 ex parte.*) — Cytise. — Bohnenbaum.

278) † *C. Laburnum*. (*L. Sp.* 1041) . . . . . T. n° 1053.  
‡ Mai-Juillet.

C. cultivé, spontané au Prinzenberg (Petange).!

**107. Genista.** (*L. Sp.* 859 *ex parte.*) — Genêt. — Ginster.

279) *G. germanica*. (*L. Sp.* 999) . . . . . T. n° 1052.  
‡ Mai-Juin.

R. Forêts à sols sablonneux ou pierreux entre Kopstal et Ansembourg. T. Juckelsbüsch. (Mamer.)! T.

280) *G. sagittalis*. (*L. Sp.* 998) . . . . . T. n° 1050.  
‡ Mai-Juillet.

AC Pelouses sèches, bruyère dans les poudingues de l'Attert, manque sur de grands espaces R. en Ardennes.

281) *G. tinctoria*. (*L. Sp.* 998.) Rhamheed . . . . . T. n° 300.  
‡ Mai-Juillet.

G. Lisière des bois, bruyères, coteaux incultes, surtout de la Moselle. AC. Ardennes.

282) *G. pilosa*. (*L. Sp.* 999) <sup>1)</sup> . . . . . T. n° 1048.  
‡ Mai-Juillet.

Coteaux, pâturages, bruyères exposés au soleil. C. Ardennes et dans les marnes irisées. AR. ailleurs.

283) † *G. juncea*. (*L. Sp.* 995). . . . . EF. 75.  
‡ Juin-Juillet.

Cultivé pour ses fleurs.

**108. Lupinus.** (*L. Gen.* 774.) — Lupin. — Lupine.

284) † *L. luteus*. (*L. Gen.* 1015.) Luping . . . . . EF. 76.  
① Juillet-Août.

C. Cultivé comme engrais vert dans les sols sablonneux et très-souvent spontané.

285) † *L. angustifolius*. (*L. Sp.* 1015.) Wele Kafè. EF. 77.  
① Juin-Août.

Cultivé depuis le blocus continental comme succédané au café.

**109. Ulex.** (*L. Gen.* 881.) — Ajonc. — Hecksame. EF. 79.

286) † *U. europæus*. (*L. Sp.* 1045, *var. α.*) . . . . . T. n° 1045.  
‡ Avril-Juin.

AC. Hauteur entre Rambrouch et Arsdorf. EF.! Scheid (Luxembourg).!

1) *G. prostrata*, T. n° 1049, est une variété décombante de *G. pilosa*, commune à la Fels de Schengen. Tiuant l'avait d'abord rapportée à *G. humifusa*. (Bydragden. I, 426.)



## Sub-tribu II. — Anthyllidées. (Koch, Syn. 173.)

110. *Ononis*. (L. Gen. 863.) — Bugrane. — Hauhechel.

287) *O. spinosa*. (L. Sp. 1003, var.  $\beta$ .) Tandeldaar. Domeldaar.  
 4 Juin-Septembre. [T. n° 1054.

AC. Lieux incultes, accotement des chemins. Manque à l'Ardenne.

288) *O. repens*. (L. Sp. 1006.) Tandeldaar. Stagnon. *O. pro-*  
*curens* . . . . . T. n° 1055.  
 4 Juin-Septembre.

C. Lieux arides, incultes R. Ardennes.

111. *Anthyllis*. (L. Gen. 773.) — Anthyllide. — Wundklee.

289) *A. vulneraria*. (L. Sp. 1012.) Gèle Männchen. T. n° 1056.  
 4 Mai-Juillet.

C. Bords des chemins, coteaux arides, pelouses calcaires. R. Ardennes.

## Sub-tribu III. — Trifoliteae. (Koch, Syn. 173.)

112. *Lotus*. (L. Gen. 897 ex parte.) — Lotier. — Schotenklee.

290) *L. corniculatus*. (L. Sp. 1092.) Éerblum. . . . . T. n° 1080.  
 4 Mai-Octobre.

C. Pelouses sèches et humides, prairies, champs.

Var.  $\beta$ . *tenuis*. (Kit. in Willd. Enum. 797). . . . . T. n° 1080d.

AR. Lieux secs.

291) *L. uliginosus*. (Schkuhr I, 211.) *L. major*. T. n° 1080b.  
 4 Juin-Septembre.

C. Fossés, bords des eaux, lieux herbeux, humides.

113. *Trigonella*. (L. Gen. 898.) — Trigonelle. — Hornklee.

292) ? *T. Fœnum græcum*. (L. Sp. 1410.) — Fullegrèthen.

② Juin-Juillet. [T. n° 1070.

R. Champs de la vallée de la Moselle entre Remich et Stadtbredimus. T.

114. *Robinia*. (L. Gen. 819 ex parte.) — Robinier. — Robinie.

293) † *R. pseudo-acacia*. (L. Sp. 1043.) Acacien. T. n° 1081.  
 † Mai-Juin.

C. Cultivé, subspontané.

Var.  $\beta$ . *umbraculifera*. (Des.) A. boule.

‡ Mai-Juillet.

C. Cultivé.

294) † *R. viscosa*. (Vent.) A. rose.

‡ Mai-Juin.

Cultivé pour ses fleurs roses.

**115. Galega.** (*Tourn. Inst.* 222.) — Galega. — Geisraute.295) † *G. officinalis.* (*L. Sp.* 1063) . . . . . EF. 84.

‡ Juillet-Août.

Cultivé comme plante d'ornement et tout récemment comme fourrage. Subspontané près du Birkenwäldchen (Gare de Luxembourg).! Clausen, Bellevue, Mersch,! etc.

**116. Colutea.** (*L. Gen.* 880.) — Baguenaudier. — Blasenstrauch.296) † *C. arborescens.* (*L. Sp.* 104) . . . . . T. n° 1082.

‡ Mai-Juin. Fr. Août.

Quelquefois cultivé. Naturalisé dans les haies, taillis; près l'étang de Fischbach. BL.!

**117. Astragalus.** (*L. Gen.* 892 *ex parte.*) — Astragale. — Traganth.297) *A. glycyphyllos.* (*L. Sp.* 1067.) Sëssholz . . . T. n° 1083.

‡ Juin-Juillet.

AR. Lisières des bois calcaires. Bour (Tuntingen). DW. Mont St-Jean. Kz. Wecker, Manternach. R.

**118. Melilotus.** (*Tournf. Inst.* 406.) — Mélilot. — Honigklee.298) *M. arvensis.* (*Wallr. Sched.* 892) . . . . . T. n° 1072.

② Juin-Septembre.

G. Lieux secs, bords des chemins. R. en Ardennes.

299) *M. macrorrhiza.* (*Pers. Syn.* 2. 348.) *M. officinalis.* T. n° 1070.

② Juin-Septembre.

G. Lieux frais, bords des eaux, prairies. R. Ardennes.

300) *M. leucantha.* (*DC. Fl. Fr.* V, 564). . . . . T. n° 1071.

‡ Juin-Septembre.

R. Lieux cultivés, bords des chemins, Septfontaines, Schengen, T.

301) † *M. alba.* (*Lmk. Ency. méth.* IV, 361.) Russesch Lizèr.

② Juin-Septembre.

[EF. 83.]

Introduit sous le nom de trèfle de Bockhara ou trèfle géant et quelquefois subspontané. Colmar. EF. Godbrange. Kz.

302) *M. parviflora.* (*Desf. Atl.* 2. p. 192.)

① Juin-Juillet.

R. Luzernière près du chemin de Wasserbillig à Mertert. (Bockholtz.)

303) † *M. cœurulea.* (*Lmk. dict.* 4. p. 62) . . . . . EF. 82.

① Juin-Juillet.

Cà et là cultivé pour son emploi dans la médecine populaire. R. échappé des jardins. Steinsel.!

**119. Medicago.** (*L. Gen.* 899.) — Luzerne. — Schottenklee.

304) *M. lupulina.* (*L. Sp.* 1097.) Geckige Klee. T. n° 1073.

① ou ② Mai-Octobre.

C. Lieux herbeux, secs, bords des chemins, prairies. Généralement cultivé.

Var.  $\beta$ . *Willdenowii.* (*Bönnig. Fl. Monst. p.* 216.)

AR. avec le type.

305) *M. falcata.* (*L. Sp.* 1096) . . . . . T. n° 1074.

④ Juin-Septembre.

AC. Prés secs, coteaux arides, bords des chemins.

306) † *M. sativa.* (*L. Sp.* 1096) . . . . . T. n° 1075.

④ Juin-Septembre.

Cultivé, souvent subspontané.

307) *M. falcato-sativa.* (*Rehb. Fl. exc. p.* 504.) Versicolor.

④ Juin-Septembre. [T. n° 1075b.

AR. Terrains secs et sablonneux. Machtum. BB. ! Bollacker (Mersch.) Kz.

308) *M. minima.* (*Lmk. Ency. méth. III,* 636.) T. n° 1076.

① Mai-Juillet.

AR. Lieux secs et sablonneux. C. Rochers entre le chemin de fer de Trèves et Pulvermühl. Cimetière des Israélites (Luxembourg). BB. ! Diekirch. (Courtois.)

309) ? *M. Echinus.* (*DC. Prod.* 2. 181.) Intertexta. T. n° 1078.

① Juin-Août.

R. Champs, moissons : Everlange. (L. et C. 1273.) Bissen. T. Dmtr. 1280 ; est cultivé dans quelques jardins et s'est probablement échappé de là.

310) ? *M. maculata.* (*Willd. Sp. III,* 1412) . . . T. n° 1077.

① Mai-Juillet.

R. Lieux incultes des bords de la Moselle : Schengen. T. Champ près d'Ansembourg. EF. Mersch, Rumelange. Kz., où il a été introduit avec de la graine falsifiée du N° 305.

311) ? *M. denticulata.* (*Willd. Sp. III,* 1414) . . . EF. 85<sup>3</sup>.

① Mai-Juin.

R. Avec la précédente et introduite dans les mêmes conditions.

**120. Trifolium.** (*Tourn. Inst.* 228.) — Trèfle. — Klee.

Sect. I. — *Chronosomium.* (*DC. Prod.* 2. p. 204.)

312) *T. filiforme.* (*L. Sp.* 1088 *ex parte.*) . . . T. n° 1069.

① Mai-Septembre.

C. Prés secs ou humides, lisières des bois, bords des chemins.

313) *T. procumbens.* (*L. Sp.* 1088) . . . . . T. n° 1068.

① Mai-Août.

C. Prés secs, bords des chemins, endroits pierreux et cultivés.

314) *T. aureum*. (*Poll. Palat.* 2. 344.) Gêle Klè. T. n° 1067.  
 2 Juin-Juillet.

C. Lieux secs et sablonneux dans les clairières et sur les lisières des bois.

315) *T. agrarium*. (*L. Sp.* 1087) . . . . . T. n° 1067.  
 ① ou ② Juin-Juillet.

Var. *α. majus*. (*Koch.*) campestre. (*Schreb. ap. Sturm.* l. 16.)  
 Dreschklè.

C. par place. Champs, moissons, jachères. C. en Ardennes.

Var. *β. minus*. (*Koch.*) procumbens. (*Schreb. ap. Sturm.* l. 16.)

AC. Prairies, pâturages.

Sect. II. — *Trifolium*. (*DC. Prod.* 2. 198.)

316) *T. pratense*. (*L. Sp.* 1082) . . . . . T. n° 1063.  
 2 ou ② Mai-Septembre.

C. Prairies, pelouses, bords des chemins, bois, etc.

Var. *β. † sativum*. Dreijährige Klè. (*Rehb. fl. exc.* 494.)  
 ② ou 2 Mai-Septembre.

C. Cultivé comme fourrage.

317) *T. medium*. (*L. Fl. Suec. ed.* 2. 758.) Wele Klè. T. n° 1062.  
 2 Juin-Août.

C. Bois montueux, bords des chemins. R. Ardennes.

318) *T. alpestre*. (*L. Sp.* 1082) . . . . . T. n° 1061.  
 2 Mai-Août.

R. Rochers entre le chemin de fer de Trèves et la Pulvermühl. T. ! entre Wecker et Mertel. R. Echternach, Brimmeyr père.

319) *T. ochroleucum*. (*L. Sys. nat.* 144.)  
 2 Juin-Juillet.

AR. Lieux herbeux des bois, pâturages élevés. Manque sur de grandes étendues. C. Canach, coteaux de la Moselle. BB. ! R. Ardennes.

320) *T. rubens*. (*L. Sp.* 1081.) Hapklè . . . . . T. n° 1057.  
 2 Juin-Juillet.

R. Bois montueux, pelouses élevées. Stromberg (Schengen.) BB. ! Aspelt vers Preisch. EF Kz. Angelsberg, entre Dudelange et Wolmerange. T. et Courtois.

321) † *T. incarnatum*. (*L. Sp.* 1083.) Russesche Klè. T. n° 1058.  
 ① Mai-Juillet.

AR. Cultivé, quelquefois subspontané. Septfontaines. T. Schäferei près Schönfels. Kz.

322) *T. arvense*. (*L. Sp.* 1083.) Kätzercher. Miezchen.  
 ① Juillet-Août. [T. n° 1050.

AC. Champs après la moisson, lieux cultivés. R. Ardennes.

323) *T. striatum*. (*L. Sp.* 1068) . . . . . BB. 393.

② Mai-Juillet.

R. par place dans les terrains calcaires. Fetschenhof. BB. !

324) *T. montanum*. (*L. Sp.* 1087) . . . . . T. n° 1063.

‡ Mai-Juillet.

AR. Prairies montueuses, C. Marnes irisées. Eisembourg, Graueknop, bois de Grevenmacher, Beaufort. R. Ardennes.

325) † *T. repens*. (*L. Sp.* 1080.) Weisse Klë . . . T. n° 1064.

‡ Mai-Octobre.

C. Prés, accotement des chemins. Cultivé généralement en Ardennes comme fourrage.

326) † *T. hybridum*. (*L. Fl. Succ. ed.* 2, p. 258.) Hybridklë.

‡ Juin-Septembre. [EF. 89.

C. Prairies humides fertiles. Cultivé en grand depuis 1850 ; mais il appartenait avant cette époque à notre Flore. W. K.

Sect. III. — *Fragiferae*. — (*Koch, Syn.* 189.)

327) *F. fragiferum*. (*L. Sp.* 1086). . . . . T. n° 1066.

‡ Juin-Octobre.

AC. Lieux humides des terres fortes, bords des chemins.

**121. Phascolus.** (*L. Gen.* 860.) — Haricot. — Miërbön.

328) † *P. vulgaris*. (*L. Sp.* 1016) . . . . . EF. 90.

① Juin-Septembre.

Cultivé en grand nombre de variétés.

Var. *α. volubilis*. Stachebön.

Var. *β. nanus*. Stäckelchesbön.

329) † *P. multiflorus*. (*Lam. Ency.* III, 701) . . . EF. 91.

① Juin-Septembre.

Cultivé comme plante d'ornement, en Ardennes comme légume.

**122. Cercis.** (*L. Gen.* 510.) — Gainier. — Judasbaum.

330) † *C. siliquastrum*. (*L. Sp.* 1. 534.) Arbre de Judée.

‡ Avril-Mai.

Un de nos plus anciens arbuste d'ornement.

Tribu II. — *Viciae*. (*DC. Prod.* II, 353.)

**123. Vicia.** (*L. Gen.* 873.) — Vesce. — Wieke.

331) *V. pisiformis*. (*L. Sp.* 1034) . . . . . T. n° 1097.

‡ Mai-Juin.

R. Broussailles le long du bois de Dudelage vers Wolmerange. T. L. et C. 1314.

332) *V. Cracca*. (*L. Sp.* 1035.) Weï Wick . . . T. n° 1098.  
 2 Juin-Août.

C. Moissons, haies, bois, etc.

333) *V. tenuifolia*. (*Roth. Tent. fl. Germ.* 1. 309.) T. n° 1098b.  
 2 Juin-Août.

AC. Sur la Moselle: Kleeberg (Remerschen), BB.! derrière la halte de Mertert vers Berbourg. EF. Kz.

334) *V. onobrychioides*. (*L. Sp.* 1036) . . . T. n° 1099.  
 2 Juin-Juillet.

AR. Broussailles dans les rochers des bords de la Sûre en aval d'Echternach. Forges du Grundhof et rochers près de Grevenmacher. T.

335) *V. sepium*. (*L. Sp.* 1038.) Weï Wick . . . T. n° 1102.  
 2 Mai-Juillet.

C. Haies, bois et buissons. R. Ardennes.

336) *V. lutea*. (*L. Sp.* 1037) . . . . . BL.  
 ① Mai-Juin.

R. Moissons près de la Seitert, bois de Lintgen. 1872. BL.!

337) † *V. sativa*. (*L. Sp.* 1037.) Wick.  
 ① Mai-Août.

C. Cultivé et naturalisé dans les champs, les moissons.

338) *V. angustifolia*. (*Roth. Tent. fl. Germ.* I, 300.) T. n° 1100d.  
 ① ou ② Mai-Juillet.

C. Champs, haies, buissons, lisières des bois, bruyères.

339) *V. lathyroides*. (*L. Sp.* 1037) . . . . . T. n° 1001.  
 ① Avril-Juin.

AC. Hauteurs entre Pulvermühl et le chemin de fer de Trèves. BL. ! Fort Olizy, Höhl (Luxembourg). EF. Kz.

**124. *Ervum***. (*L. Gen.* 874.) — Ers. — Lein.

340) *E. hirsutum*. (*L. Sp.* 1039.) Fetz . . . . . T. n° 1106.  
 ① Mai-Septembre.

C. Moissons, bois, buissons. AR. Ardennes.

341) *E. tetraspermum*. (*L. Sp.* 1039). . . . . T. n° 1108.  
 ① Juin-Septembre.

C. Moissons, lieux cultivés, buissons. R. Ardennes.

342) *E. gracile*. (*DC. Fl. fr.* 581) . . . . . T. n° 1109.  
 ① Juin-Août.

AR. Moissons du calcaire coquillier. Champs près de la Coup (Ellange) A. EF. Kz.

343) † *E. monanthos*. (*L. Sp.* 1040.)  
 ① Juin-Juillet.

Autrefois cultivé; spontané dans les haies aux environs de Diekirch. L. et C. 1324.

344) E. **Ervilia**. (*L. Sp.* 1040) . . . . . T. n° 1107.

① Juin-Juillet.

C. Champs de lentilles des bords de la Moselle. T. mept.

345) † E. **Lens**. (*L. Sp.* 1039.) **Lenz**. . . . . T. n° 1105.

① Juin-Juillet.

Cultivé çà et là, notamment dans les terres légères. Subspontané dans les moissons.

**125. Faba**. (*Tournf. Inst.* 202.) — Fève. — Bohne.

346) † F. **vulgaris**. (*Mönch. meth.* 130) . . . . . EF. 98.

① Juin-Août.

Var.  $\alpha$ . F. **equina**. (*Bauh.*) Perdsbõn. Saubõn . . . T. n° 1104.

Var.  $\beta$ . F. **sativa**. (*DC.*) Gardebõn . . . . . T. n° 1103.

C. Cultivé et quelquefois subspontané.

**126. Pisum**. (*Tourn. Inst.* 215.) — Pois. — Erbse.

347) † P. **sativum**. (*L. Sp.* 1026.) Ierbes . . . . . T. n° 1092.

① Mai-Juillet.

C. cultivé dans les jardins et quelquefois subspontané.

Var.  $\alpha$ . **saccharatum**. (*Ser.*) Zockerfêrbes.

Var.  $\beta$ . **macrocarpum**. (*Ser.*) Pelfêrbes.

Var.  $\gamma$ . **humile**. (*Poir.*) Bordurfêrbes.

Var.  $\delta$ . **quadratum**. (*Lin.*) Ridesfêrbes.

348) † P. **arvense**. (*L. Sp.* 1027) . . . . . T. n° 1093.

① Juin-Juillet.

C. Cultivé en plein champ.

**127. Lathyrus**. (*L. Gen.* 872.) — Gesse. — Platterbse.

349) L. **Aphaca**. (*L. Sp.* 1029) . . . . . T. n° 1087.

① Mai-Août.

C. par place. Manque sur de grands espaces. Moissons du calcaire de la Moselle de Wasserbillig à Ehnen. AC. dans les moissons des marnes irisées.

350) L. **Nissolia**. (*L. Sp.* 1029) . . . . . T. n° 1085.

① Mai-Août.

R. Moissons entre Ehnen et Wormeldange. T. Eisembourg. BL.

351) † L. **sativus**. (*L. Sp.* 1030.) Lenzooren . . . T. n° 1086.

① Juin-Août.

Cultivé sur la Moselle entre Grevenmacher et Wormeldange, Mondorff; quelquefois subspontané dans les moissons.

352) L. **hirsutus**. (*L. Sp.* 1032) . . . . . T. n° 1088.

② Juin-Septembre.

AC Haies, buissons, moissons. Hollerich, Bettembourg. TMD. R. Ardennes.

353) *L. tuberosus*. (*L. Sp.* 1033.) Erdnoss. . . . T. n° 1089.  
 2 Juin-Août.

AC. Moissons des terres fortes et argileuses.

354) *L. pratensis*. (*L. Sp.* 1033) . . . . . T. n° 1090.  
 2 Juin-Août.

C. Prairies, haies, bois, buissons

Var.  $\beta$ . *velutinus*. (*DC. fl. Fr. suppl.* 575) . . . . T. n° 1090c.

R Haies près de Tandel.

355) *L. silvestris*. (*L. Sp.* 1033) . . . . . T. n° 1091.  
 2 Juin-Août.

AC. par place; manque sur de grands espaces. Bois de Dudelange, Langenberg, Mont St.-Jean, Schrassig, ceux de la Sûre et de la Moselle, etc.

356) † *L. odoratus*. (*L. Sp.* 1033) . . . . . EF. 101.

① Juillet-Septembre.

Cultivé en plusieurs variétés.

357) † *L. latifolius*. (*L. Sp.* 1033.)

2 Juillet-Août.

Anciennement cultivé pour ses fleurs.

**128. Orobus.** (*L. Gen.* 871.) — Orobe. — Walderbse.

358) *O. tuberosus*. (*L. Sp.* 1028) . . . . . T. n° 1094.  
 2 Avril-Juillet.

C. Bois, buissons secs.

Var.  $\beta$ . *tenuifolius*. (*Roth. tent.* 3. 171.)

AR. Avec le type. Canach.!

359) *O. niger*. (*L. Sp.* 1028) . . . . . T. n° 1095.

2 Mai-Juillet.

AR. Bois montueux au-dessus de Bettendorf, rochers près de Grevenmacher, au-dessus des forges de Colmar. T. entre Erpeldange et Michelau. EF. Kz.

360) † *O. vernus*. (*L. Sp.* 1028) . . . . . T. n° 1096.

2 Avril-Mai.

Anciennement cultivé. La plante de l'herbier de T. appartient au n° 358

Tribu III. — Euhedysarea. (*DC. Prod.* II. 313.)

**129. Coronilla.** (*L. Gen.* 883 *ex parte.*) — Coronille. — Kronenwicke.

361) † *C. Emerus*. (*L. Sp.* 1146). . . . . EF. 106.

‡ Mai-Juillet.

C. Rochers du Wurthsberg, Clausen, subspontané.?



- 362) *C. varia*. (*L. Sp.* 4048) . . . . . T. n° 1112.  
 2 Juin-Août.

AR. Coteaux herbeux, secs de la Moselle. T. ! C. Au pied du Stomberg, le long du chemin vers Schengen. A ! et entre Greiveldange et Stadtbredimus. !

- 130. *Ornithopus*.** (*L. Gen.* 884 *ex parte*.) — Ornithope. — Vogelfuss.

- 363) *O. perpusillus*. (*L. Sp.* 4049) . . . . . T. n° 1100.  
 ① Mai-Août.

C. par place. Lieux secs et sablonneux. Plankenhof, Fischbach, Pulvermühl. BL. ! Franzonegrund. EF.

- 364) *O. sativus*. (*Brot. fl. lus. II*, 160.) Serradella. EF. 107.  
 ① Juillet-Août.

Cultivé. Terres légères des bords de la Sûre dans les cantons de Dickirch et d'Echternach, notamment Beaufort. ! Subspontané à Obermarienthal. A. EF. Kz.

- 131. *Hippocrepis*.** (*L. Gen.* 885.) — Hippocrepide. — Pferdehuf.

- 365) *H. comosa*. (*L. Sp.* 4050) . . . . . T. n° 1111.  
 2 Mai-Juillet.

AC. Collines arides, lisières des bois, dans les marnes irisées.

- 132. *Onobrychis*.** (*Tournf. Inst.* 211.) — Sainfoin. — Esparsette.

- 366) † *O. viciæfolia*. (*Scop. Carn.* 2. p. 76.) Stecklë. (*O. sativa*.)  
 2 Mai-Juin. [T. n° 1113.]

C. Cultivé et naturalisé çà et là.

### XXX. LYTHRARIEAE.

(Juss dic. sci. nat. XXVII, 433.)

- 133. *Lythrum*.** (*L. Gen.* 604.) — Salicaire. — Weiderich. [XI, 1.]

- 367) *L. salicaria*. (*L. Sp.* 642.) Tausendknütod. . . . . T. n° 681.  
 2 Juillet-Septembre.

C. Bords des eaux et fossés, lieux humides. R. Ardennes.

- 368) *L. hyssopifolia*. (*L. Sp.* 642) . . . . . T. n° 683.  
 ① Juillet-Août.

R. Lieux humides et marécageux entre Mamer et Capellen. T.

- 134. *Peplis*.** (*L. Gen.* 446.) — Peplide. — Aferquendel. [VI, 1.]

- 369) *P. Portula*. (*L. Sp.* 474) . . . . . T. n° 552.  
 ① Juin-Septembre.

AR. Champs humides, fossés, bords des étangs et des mares des terrains sablonneux. Lieux inondés l'hiver.

## XXXI. PORTULACEAE.

(Juss. Gen. 312 ex parte.)

**135. Portulaca.** (*Tourn. Inst.* 118.) Pourpier. Portulak. [XI, 1.]370) † *P. oleracea.* (*L. Sp.* 638) . . . . . T. n° 680.

① Juin-Octobre.

C. Cultivé et naturalisé dans le voisinage des jardins des villes.

371) † *P. sativa.* (*Haw. syn. plant. succl. p.* 121.)

① Juin-Août.

Cultivé.

**136. Montia.** (*L. Gen.* 101.) — Montie. [VI, 1.]372) *M. minor.* (*Gmel. Fl. Bad. Als. I,* 301) . . . . . T. n° 222.

① Avril-Juin.

AC. Lieux humides, sablonneux, fossés et étangs asséchés de la région Ardennaise et de ses lisières.

373) *M. rivularis.* (*Gmel. l. c.* 302). . . . . T. n° 227.

‡ Mai-Septembre.

AC. Dans les mêmes localités, par exemple entre Erpeldange et le chemin de fer du Nord. BL.!

## XXXII. PARONYCHIEAE.

(A. de St-Hil. Mém. plac. lib. 56.)

**137. Corrigiola.** (*L. Gen.* 378.) Corrigiole. Hirschsprung. [V, 3.]374) *C. littoralis.* (*L. Sp.* 388) . . . . . T. n° 497.

① Juin-Septembre.

C. Rives de la Moselle. Gravier des bords de la Sûre à Erpeldange. Champs humides, schisteux des Ardennes. Rambrouch. T. Mersch, EF.!

**138. Herniaria.** (*Tourn. Inst.* 288.) — Herniaire. — Bruchkraut. [V, 3.]375) *H. glabra.* (*L. Sp.* 317). . . . . T. n° 423.

② ou † Mai-Octobre.

C. Lieux secs et sablonneux.

376) *H. hirsuta.* (*L. Sp.* 317) . . . . . T. n° 424.

① ou ② Mai-Septembre.

R. Lieux secs et sablonneux, manque sur de grands espaces. AC. entre Schengen et Wintrange.

**139. Scleranthus.** (*L. Gen.* 562.) Gnavelle. Knäulkraut. [X, 2.]377) *S. annuus.* (*L. Sp.* 580.) Leiskraut . . . . . T. n° 619.

① Mai-Octobre.

C. Moissons des terres sablonneuses.

Var.  $\beta$ . *divaricatus*. (*Dmtr. Prod. Fl. B.* 191.)

AC. avec le type.

Var.  $\gamma$ . *comosus*. (*Dmtr. l. c.* 193.)

AR. avec le type. Plankenhof. BL. ! Finsterthal. Kz.

378) *S. perennis*. (*L. Sp.* 580) . . . . . T. n° 618.

‡ Mai-Octobre.

C. Lieux sablonneux et schisteux, cultivés et en friches.

### XXXIII. CRASSULACEAE.

(DC. Bull. Soc. Phil. 1801. N° 49. 1.)

**140. Crassula.** (*L. Gen.* 392.) — Crassule. — Dickblatt. [V, 5.]

379) *C. rubens*. (*L. Sy. nat.* 2, 226) . . . . . T. n° 499.

① Mai-Juillet.

R. Collines arides au-dessus d'Ehnen. T.

**141. Sedum.** (*L. Gen.* 616.) — Orpin. — Fettkraut. [X, 5.]

380) *S. acre*. (*L. Sp.* 619.) Mauerkreitchen . . . . . T. n° 653.

‡ Juin-Juillet.

C. Lieux secs et pierreux, vieux murs, toits de chaumes, rochers. R. Ardennes.

381) *S. sexangulare*. (*L. Sp.* 310) . . . . . T. n° 656.

‡ Juin-Juillet.

R. Rochers calcaires près de Schengen. T. Fels. Ehnen. BB. !

382) *S. boloniense*. (*DC. Prod.* 3. 407.) *B. schistosum*. T. n° 658.

‡ Juillet-Août.

R. Rochers arénacés. Clausen. Bofferdange. BL. T. ! Ardennes (Biwels.) K.

383) *S. reflexum*. (*L. Sp.* 588.) Tripniadam . . . . . T. n° 657.

‡ Juillet-Août.

C. Vieux murs, rochers, coteaux arides, champs sablonneux, etc. R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *glaucescens*. (*S. rupestre. L. Sp.* 618.)

‡ Juillet-Août.

C. Rochers calcaires.

384) *S. aureum*. (*Wirtg. Fl. R. P.* 184) . . . . . BB. 383.

‡ Juin-Juillet.

AC. par place. Coteaux arides, champs sablonneux, rochers couverts d'herbes, etc. Luxembourg R. Pulvernühl, Beggen BB. Durensberg BL. ! etc.

385) *S. treviricum*. (*Rosbach in Wgt. T. Fl. RP.* 185.)

‡ Juin-Juillet.

AC. Coteaux calcaires en amont d'Echternach vers Weilerbach. R.

386) *S. album*. (*L. Sp.* 688.) — Judendrauw . . . . . T. n° 54.

‡ Juin-Août.

C. Vieux murs, rochers, toits en chaume, etc. R. Ardennes.

387) *S. maximum*. (*Suter. Fl. Helv.* 1. 270.) Schmeerwurzel.  
Brandkraut. (*S. Telephium*. Auct. non L.). . T. n° 631.  
‡ Juillet-Septembre.

AC. Buissons, lieux pierreux, vignes, lisière des bois, etc.

388) *S. purpurascens*. (*Koch. suppl. fl. germ. ined.*)  
‡ Juillet-Août.

AR. Rochers, bois montueux. Grundhof. EF. Kz.

**142. *Sempervivum***. (*L. Gen.* 612.) — Joubarbe. — Hauswurz.

389) *S. tectorum*. (*L. Sp.* 666.) Donnerkraut . . T. n° 700.  
‡ Juillet-Août.

C. Toits de chaume, vieux murs, souvent planté sur les chaumières.

#### XXXIV. AMYGDALAE.

(*Juss. Gen.* 340) [XII, 1.]

**143. *Persica***. (*Tournf. Inst.* 400.) — Pêcher. — Pfirsichbaum.

390) † *P. vulgaris*. (*Mill. dic.* 1400.) Pigebâm . . EF. 115.  
‡ Février-Mars. Fr. Août-Octobre.

AC. Cultivé en plusieurs variétés en espalier pour ses fruits Il ne réussit bien chez nous que greffé sur prunier ou myrobolan.

Var.  $\beta$ . † *laevis*. (*DC. Fl. Fr. IV*, 487.)

R. Cultivé.

**144. *Amygdalus***. (*L. Gen.* 619.) — Amandier. — Mandelbaum.

391) † *A. communis*. (*L. Sp.* 576.)  
‡ Février-Avril.

AR. Cultivé dans les parcs pour ses fleurs doubles et simples.

**145. † *Armeniaca***. (*Tournf. Inst.* 399.) Abricotier. Aprikosenbaum.

392) † *A. vulgaris*. (*Lmk. Ency. méth.* 1. 2.) Abrikosebâm.  
‡ Février-Mars. Fr. Juillet-Août. [EF. 114.]

AC. Cultivé en diverses variétés, presque toujours en espalier.

**146. *Prunus***. (*L. Gen.* 620.) — Prunier. — Pflaumenbaum.

393) *P. spinosa*. (*L. Sp.* 681.) Schlévendaar. . . T. n° 712.  
‡ Avril-Mai. Fr. Octobre-Décembre.

C. Haies, buissons, lisières des bois, bords des chemins, coteaux arides, notamment des terrains calcaires.

394) *P. fruticans*. (*Weih. Bot. Zeit.* 9. 2. 748.) Scheispraum.  
‡ Avril-Mai. Fr. Août.

AR. Haies des vergers, lieux cultivés, près des habitations.

Var.  $\beta$ . † *damascena*. Damaschtepraum.

Cultivé en plusieurs variétés.

395) † *P. institia*. (*L. Sp.* 680.) Praumebàm . . . T. n° 703.

‡ Mars-Avril. Fr. Juillet-Septembre.

C. Haies et voisinage des habitations. Cultivé dès la plus haute antiquité pour ses fruits variant de qualité, mais toujours alimentaires.

Var.  $\beta$ . *Catharinaea*. (*Ser. in DC. Prod.*) Perdrigon.

Var.  $\gamma$ . *Claudiana*. (*Pers. syn.*) Reine-Claude.

Var.  $\delta$ . *cerea*. (*L. Sp.* 680.) Mirabell.

396) † *P. domestica*. (*L. Sp.* 680.) Quetschebàm. T. n° 704.

‡ Mars-Avril. Fr. Juillet-Septembre.

C. Cultivé en plusieurs variétés pour ses fruits La variété ordinaire est spontanée dans les haies, vignes, etc.

397) † *P. cerasifera*. (*Ehrh. Rut.* 17.) Russesch Praum.

‡ Avril-Mai. Fr. Août.

C. Cultivé pour ses fruits et comme sujet pour la greffe du pêcher.

**147. Cerasus.** (*Juss. Gen.* 340.) — Cerisier. — Kirschbaum.

398) *C. avium*. (*Mönch, meth.* 672.) Weje Kischtebàm. T. n° 709.

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Juillet.

C. Bois, forêts, notamment sur l'oolite ferrugineuse.

† Var.  $\beta$ . *Juliana*. (*DC. Fl. F.* 3785.) Schockekîscht. T. n° 708.

† Var.  $\gamma$ . *Duracina*. (*DC. Fl. F.* 3787.) Bigarreau.

399) *C. vulgaris*. (*Mill. Dict.* 4.) Sauerkîscht. (*P. Caproniana.*)

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Juillet.

[T. n° 707.

AC. Bois, forêts, haies, etc.

† Var.  $\beta$ . *brevipes*. (*D.*) C. de Montmorency.

† Var.  $\gamma$ . *semperflorens*. (*Ehrh.*) C. de la Toussaint.

Cultivé comme arbre d'ornement pour sa floraison continue.

400) *C. Mahaleb*. (*Mill. Dict.* 4). . . . . T. n° 706.

‡ Mai-Juin. Fr. Juillet-Août.

AR. Rochers des côtes de la Moselle entre Ahn et Wormeldange. T. Cultivé comme sauvageon.

401) † *C. Padus*. (*DC. Fl. Fr. IV*, 580) . . . . . T. n° 705.

‡ Mai. Fr. Juillet-Août.

AC. Cultivé et quelquefois spontané dans les taillis rocheux des Ardennes. Bords de la Pall entre Niederpallen et Reichlange. DW.

## XXXV. ROSACEÆ.

(Juss. Gen. 334 ex parte.) [XII.]

Tribu I. — Spiracææ. (DC. Prod. 2. 541.)

**148. Spiræa.** (L. Gen. 702.) — Spirée. — Spierstaude402) **S. Filipendula.** (L. Sp. 436.) Schèfernoss. . . T. n° 726.

‡ Juin-Juillet.

AR. Lieux herbeux, clairières humides. Merl. EF. Useldange, Blaschette, Christnach. T. Beaufort. EF. Kz. etc.

403) **S. Ulmaria.** (L. Sp. 702.) Reine des prés . . . T. n° 727.

‡ Juin-Juillet.

C. Prés humides, bords des eaux, lisières des bois humides.

Var.  $\beta$ . *denudata.* (Hayne. Arz. Gew. 8. tab. 31.)

AC. avec le type.

404) † **S. salicifolia.** (L. Sp. 701) . . . . . T. n° 724.

‡ Juin-Août.

AC. Cultivé surtout en Ardennes, se retrouve sauvage dans les haies et au bord des eaux.

405) † **S. hypericifolia.** (L. Sp. 701) . . . . . EF. 116.

‡ Juin-Août.

AC. Cultivé et souvent subsponané.

406) † **S. prunifolia.** (Van Houtte. Fl. serres. 1842.)

‡ Printemps.

AC. Cultivé et souvent subsponané.

**149. Kerria.** (DC.) — Corète. — Karnunkelstrauch.407) † **K. Japonica.** (DC.) . . . . . EF. 117.

‡ Tout l'été.

C. Cultivé et sauvage dans les haies. Clausen, Bellevue, etc.

Tribu II. — Potentilleæ. (C. et Germain. Fl. Par. 206.)

**150. Rubus.** (L. Gen. 632.) — Ronce. — Brombeere. 1)

1) La division du genre *Rubus* que nous donnons est celle de la Flore de Tiuant. Les plantes de son herbier et de celui de M. Krombach qui servirent de base à celle-ci ont été vérifiées sur celles de l'Herb. rub. de Wirtgen, et sur Arrhen. Monog. Rubor. Pour ceux qui ne sont pas partisans de cette dismembration, adoptée par plus d'un floriste éminent, nous ramenons, à l'exemple de Arnott dans British Flora, les ronces des sections I et II aux types suivants :

1. *R. suberectus.* (Anders. Eng. bot. 1. 2714.)

Sect. I. — Batotypus. (*Dmtr. Prod.* 91.)A. Homalacanthi. (*Dmtr. Monog. des espèces du genre Rubus.* 4.)408) *R. fruticosus*. (*L. Fl. Suec. ed. 2.* 172.) Perdsbèr. T. n° 761.  
‡ Juin-Septembre.

C. Lieux incultes, bords des chemins, haies, buissons, bois, terrains calcaires et argileux.

409) *R. suberectus*. (*Anders. Eng. bot.* 1. 2714) . . . T. n° 755.  
‡ Juin-Juillet.

R. Bois, Grünenwald.

Var.  $\beta$ . *plicatus*. (*Weihe et Nees. Rubi. Germ. p.* 20. 1.) T. n° 755.

AC. Taillis, haies et broussailles.

Var.  $\gamma$ . *fastigiatus*. (*W. et N. l. c. p.* 16. 2) . . . T. n° 756.

R. Bois, lieux ombragés. C. Ardennes Wiltz. T.

Var.  $\delta$ . *nitidus*. (*W. et N. l. c. p.* 19. 4) . . . T. n° 758.

AR. Bords des bois, haies. Krichelheid. K.

410) *R. affinis*. (*W. et N. l. c. p.* 22. 3.) *R. corylifolius*. H.  
‡ Juin-Juillet. [T. n° 757.

AR. Lisière des bois.

411) *R. thyrsoideus*. (*Wim. fl. v. Sch.* 131.) *R. fruticosus*. (*W. et N. l. c.* 7.) *R. candicans*. (*Rech. fl. excurs.* 601.) T. n° 761.

‡ Juin-Juillet.

C. Calcaire jurassique.

Var.  $\beta$ . *ramnifolius*. (*W. et N. l. c. p.* 21. t. 6) . . . T. n° 760.

C. Bords des bois du calcaire jurassique.

II. *R. rhamnifolius*. (*W. et N. l. c. p.* 21. 6 emend.)*R. affinis*. (*W. et N.*) | *R. thyrsoideus*. (*Wim.*)III. *R. fruticosus*. (*L. Fl. suec. ed. 2.* 172 ex parte.)*R. discolor*. (*W. et N.*) | *R. vestitus*. (*W. et N.*)*R. tomentosus*. (*Willd.*) | *R. viscosus*. (*W.*)IV. *R. carpiniifolius*. (*W. et N. l. c. p.* 35. t. 13. emend.)*R. vulgaris*. (*W. et N.*) | *R. Sprengelii*. (*W.*)*R. silvaticus*. (*W. et N.*) | *R. Schlechtendalii*. (*W. et N.*)V. *R. glandulosus*. (*Bell. Append. ad. Fl. Ped. p.* 24. emend.)*R. Hystrix*. (*W. et N.*) | *R. Guntheri*. (*W. et N.*) | *R. infestus*. (*W. et N.*)*R. Radula*. (*W. et N.*) | *R. glandulosus*. (*Bell.*) | *R. hybridus*. (*Vill.*)*R. rudis*. (*W. et N.*) | *R. hirtus*. (*W. et N.*) | *R. pygmaeus*. (*W. et N.*)*R. fusco-ater*. (*W. et N.*) | *R. Schleicheri*. (*W. et N.*)VI. *R. corylifolius*. (*Smith. Eng. bot.* t. 827.)VII. *R. cersius*. (*L. Sp.* 706.)*R. nemorosus*. (*Hayne.*)

Var.  $\gamma$ . cordifolius. (*W. et N. l. c. p. 22. t. 7*) . . . T. n° 759.

C. Bords des bois.

412) *R. tomentosus*. (*Willd. Sp. II, 1083*) . . . T. n° 762.

‡ Juin-Juillet.

AC. Lieux secs et incultes, lisières des bois exposés au soleil. Md. C. Moselle et sart des Ardennes. (Courtois.)

413) *R. Sprengelii*. (*W. in Bot. Zeit. 1819. 17*). . . T. n° 764.

‡ Juin-Juillet.

AC. Bois humides. Ardennes: Folschette, Rambrouch T. — R. ailleurs; broussailles au-dessus de Dommeldange. T.

414) *R. vulgaris*. (*W. et N. l. c. 38. t. 14*) . . . T. n° 767

‡ Juin-Juillet.

C. Lieux secs et incultes.

Var.  $\beta$ . carpinifolius. (*W. et N. l. c. p. 33. t. 13.*) *R. leucostachys*.

(*Sm. Eng. bot. 1. 2631*) . . . . . T. n° 766.

AR. Lisière des bois.

Var.  $\gamma$ . umbrosus. (*God. Fl. L. 1. 210.*)

AC. Avec l'espèce.

415) *Schlechtendalii*. (*W. et N. l. c. 11*) . . . . . T. n° 763.

AC. Bois montueux des Ardennes. R. ailleurs.

416) *R. silvaticus*. (*W. et N. l. c. p. 412. 15*) . . . T. n° 768.

‡ Juin-Juillet.

C. Lisières des bois.

417) *R. discolor*. (*W. et N. l. c. p. 46. 20.*) *R. fruticosus*. (*DC.*

*Prod. 2. 561 non L. nec W. et N.*). . . . . T. n° 771.

‡ Juin-Juillet.

C. Bois, buissons, haies.

Var.  $\beta$ . villicaulis. (*W. et N. l. c. p. 43. t. 17*) . . . T. n° 769.

C. Bois, buissons, haies des terrains montueux.

Var.  $\gamma$ . argenteus. (*W. et N. l. c. 19*) . . . . . T. n° 770.

AC Bois.

#### B. Heteracanthi. (*Dmtr. Monog. l. c. 4.*)

418) *R. vestitus*. (*W. et N. l. c. p. 81. 33.*) *R. vinetorum*. (*Hol.*

*fl. Moselle. 267.*) *R. diversiflorus*. (*Lindley, syn. 99.*) T. n° 778.

C. Haies, vignes, bois des terrains secs et calcaires.

Var.  $\beta$ . hirsutus. (*Wirtg. Prod. p. 61.*)

R Avec l'espèce. Krichelheid.

419) *R. viscosus*. (*Weyhe. mon. ms. n° 23*) . . . L. et C. 931.

‡ Juin-Juillet.

R. Bois, buissons, broussailles, haies.



- 420) **R. Schleicheri.** (*W. et N. l. c. p. 68. 23*). **R. glandulosus.**  
 (*Schleich. pl. helv. exsica. non Bell.*) . . . . T. n° 773.  
 † Juin-Juillet.
- R. Bois aux environs de Rambrouch et Grünenwald. T.
- 421) **R. fusco-ater.** (*W. et N. l. c. 25*). . . . . T. n° 774.  
 † Juin-Juillet.
- AR. Haies, mardelles des bois à l'exposition du midi. C. Ardennes.
- 422) **R. Radula.** (*W. et N. l. c. p. 89. t. 38*). . . . T. n° 780.  
 † Juin-Juillet.
- AR. Bois, broussailles.
- 423) **R. rudis.** (*W. et N. l. c. p. 91. 40*) . . . . T. n° 781.  
 † Juin-Juillet.
- G. Collines calcaires et arides.
- 424) **R. infestus.** (*W. et N. l. c. 30*) . . . . . T. n° 776.  
 † Juin-Juillet.
- AC. Lieux arides, secs, bords des champs.
- 425) **R. hirtus.** (*W. et N. l. c. p. 95. t. 43*) . . . . T. n° 772.  
 † Juin-Juillet.
- AC. Bois, le long des chemins. Grünenwald. T.
- 426) **R. Guntheri.** (*W. et N. l. c. 63. t. 21*) . . . . T. n° 772.  
 † Juin-Juillet.
- R. avec le précédent
- 427) **R. hybridus.** (*Vill. fl. Delph. III, 559.*) **R. Lejeuni.** (*W. et  
 N. l. c. p. 79. t. 3. non Sond.*) . . . . . T. n° 777.  
 † Juin-Juillet.
- AR. Broussailles aux environs de Rambrouch et de Folschette. T.
- 428) **R. glandulosus.** (*Bell. Append. ad. Fl. Ped. p. 24.*) **R. Bel-  
 lardii.** (*W. et N. l. c. p. 27. 44.*) **R. villosus.** (*DC. Prod.  
 II, 963*) . . . . . T. n° 784.  
 † Juin-Juillet.
- AC. Lieux montueux, sablonneux et broussailles.
- Var.  $\beta$ . **rosaceus.** (*W. et N. l. c. p. 85*) . . . . . T. n° 779.
- R. Bois au-dessus de Dommeldange. T.
- 429) **R. pygmaeus.** (*W. et N. l. c. 19. t. 4*) . . . . T. n° 783.  
 † Juin-Juillet.
- R. Champs arides. Neunhausen. T.
- 430) **R. nemorosus.** (*Hayne, Arznei. 3. tab. 10.*) **R. pallidus.**  
 (*W. et N. l. c. p. 75. t. 29.*) **R. dumetorum** var. **silvestris.**  
 (*God. Fl. L. 1. 209*) . . . . . T. n° 775.

## ‡ Mai-Juin.

C. Bois et buissons.

Var. *β. tomentosus*. (*Arrhen. Rub. succ. p. 46.*)

R. Bois de Differdange, Esch-sur-l'Alzette. C. Ardennes.

Sect. II. — *Glaucobatos*. (*Dmtr. l. c.*)431) *R. cæsius*. (*L. Sp. 706.*) Brehm . . . . . T. n° 786.

## ‡ Juin-Août.

C. Haies et champs.

Var. *β. agrestis*. (*W. et N. l. c. p. 106.*) Brehm.

C Champs arides

Var. *γ. dumetorum*. (*W. et N. l. c. p. 98. t. 45. a et b.*) T. n° 786.

AC. Haies, broussailles.

Var. *δ. ferox*. (*Vent. in Tratt. Monog. Rosa. 3. p. 40.*) Vestitus.  
(*Wim.*)

AR. avec l'espèce.

Var. *ε. serpens*. (*God. et. Gren. Fl. Fr. t. 1. 538.*)

AC. Avec l'espèce dans les bois sablonneux.

Sect. III. — *Chamæbatos*. (*Dmtr. l. c.*)432) *R. saxatilis*. (*L. Sp. 708.*) Erdkrëschel. . . . . T. n° 763.

## ‡ Mai-Juin. Fr. Juillet.

AR. Rochers, bois montueux. Bellevue (Courtois.) Kiém (Grünenwald.) Pulfermühl. BL. ! Rodenhof. BB. Fels (Schengen ) Kz. etc.

Sect. IV. — *Batidæa*. (*Dmtr. Pr. l. c.*)433) *R. Idæus*. (*L. Sp. 706.*) Hambîer. . . . . T. n° 787.

## ‡ Juin-Juillet. Fr. Juillet-Août.

C. Bois et tourbières des Ardennes. AC. et R. ailleurs. Manque sur de grands espaces. Cultivé en diverses variétés — blanches, jaunes, roses, rouges, bifères.

434) *R. odoratus*. (*L. Spl. ed. I. 494.*) Amerikanesche  
Perdsbîer . . . . . EF. 117.

## ‡ Juin-Juillet.

C. Cultivé et échappé des bosquets.

**151. Geum.** (*L. Gen. 636.*) — Benoîte. — Nelkenwurz. [XII, 3.]435) *G. urbanum*. (*L. Sp. 716.*) Igelskraut. Gaffel. T. n° 741.

## ‡ Mai-Juillet.

C. Haies, buissons, bois, lieux pierreux, humides.

436) *G. rivale*. (*L. Sp. 717*) . . . . . T. n° 742.

‡ Mai-Juillet. Refl. à l'automne.

R. Bois humides, bords des ruisseaux. Grünenwald. Eisembourg, Blaschette, Kopstal. T. Mandelbach. Kz.

437) *G. rivali-urbanum*. (*Bell. Satter. Fl. B. 121.*) *G. intermedium*. (*Ehr. Rut. p. 143*) . . . . . T. n° 742b.

‡ Mai-Juillet.

R. Se produit parmi les pieds de *G. urbanum* et *rivale*. Bois de Blaschette. (Seitert, Beutelbüsch.) T.

438) *G. urbano-rivale*. (*G. Mey. Chl. Han.*)

‡ Mai-Juillet.

R. Se produit de la même manière. Parc de Schrassig. EF.

**152. *Fragaria*.** (*L. Gen. 633.*) — Fraisier. — Erdbeere.

439) *F. vesca*. (*L. Sp. 709 ex parte.*) Erdbièr . . . T. n° 728.

‡ Avril-Juin.

C. Clairières dans les bois taillis, broussailles, pelouses, haies, etc. Cultivé en nombreuses variétés pour ses fruits rouges et blancs.

† Var. *β. semperflorens*. (*Koch, Syn. 234.*) De tous mois.

† Var. *γ. efflagellis*. (*Duch. Lam. dict. 2. 531.*) Sans coulants ou de Gallion.

† Var. *δ. monophylla*. (*Duch. l. c. 532.*) A une foliole.

440) *F. moschata*. (*Duchesne 1766.*) *F. elatior*. (*Ehrh. Bot. VII, 23.*) . . . . . T. n° 729.

‡ Mai-Juin.

AR. Bois, haies des environs d'Ansembourg. T. Kz. Grünenwald. T. Schleid de Contern. Bosquet au-dessus du château de Dommeldange. Ruines d'Esch s./S. (Courtois.) Taillis au-dessus d'Erpeldange. EF. Kz. — Cultivé en plusieurs variétés dites Hautbois, Capronnier.

† Var. *β. communis*. (*Hort.*) Capron commun.

† Var. *γ. heterophylla*. (*Hort.*) A 3, 4 et 5 folioles.

441) *F. viridis*. (*Duchesne 1766.*) Huneknepp. *F. collina*. (*Ehrh. l. c. 26.*) . . . . . T. n° 730.

‡ Mai-Juin.

AR. Bois, coteaux arides, calcaires. Echternach, (Brimmeyr père.) Stromberg, Fels, Schengen. EB ! Hohfels, Machthum. BB. Manternach, Mertert. R. — C. près des forges de Berbourg. K. et les collines des marnes irisées.

Les nombreuses variétés cultivées n'appartenant pas aux espèces indigènes, se rapportent aux suivantes :

442) † *F. virginiana*. (*Ehr. l. c. 24.*) *F. pourpre*.

‡ Mai-Juin.

443) † *F. grandiflora*. (*Ehrh. l. c.* 25.) *F. ananas*.  
 2 Mai-Juin.

444) † *F. chilensis*. (*Ehrh. l. c.* 26.) *F. du Chili*.

**153. Comarum.** (*L. Gen.* 638.)—Commaret.—Blutauge. [XII, 3.]

445) *C. palustre*. (*L. Sp.* 718) . . . . . T. n° 738.  
 2 Mai-Juin.

Marais tourbeux, prairies marécageuses, bords des eaux. AC. Ardennes. R. Ailleurs. Fehnerholz (Hesperange.) BL.!

**154. Potentilla.** (*L. Gen.* 634.)—Potentille.—Fünffingerkraut.

446) *P. sterilis*. (*L. Sp.* 709.) *P. Fragaria*. Gke. . . T. n° 737.  
 2 Mars-Mai.

AC. Bois montueux, haies, bords des chemins herbeux C. Grund (Hesperange.) BL. ! AR. Ardennes.

447) *P. verna*. (*L. Sp.* 702.) Dragouner . . . . . T. n° 733.  
 2 Mars-Mai. Refl. quelquefois à l'automne.

C. Vieux murs, lieux secs et arides, rochers arborés, mardelles des bois.

448) *P. reptans*. (*L. Sp.* 714) . . . . . T. n° 734.  
 2 Juillet-Août.

C. Bords des chemins herbeux, fossés, lieux un peu humides.

449) *P. alpestris*. (*Haller fils. a. Sering. méth.* 53.) *P. aurea*.  
 2 Juin-Août. [T. n° 733bis.]

D'après Wirtgen Prod (N° 433), la plante de Tinant serait la var. « *firma*, Koch, Syn. 240. (*P. sabauda* DC fl. Fr. 4. 438.)

R. Rochers le long de la Sûre près d'Echternach. T.

450) *P. Anserina*. (*L. Sp.* 810.) Selverblât . . . T. n° 731.  
 2 Mai-Octobre.

C. Bords des chemins et des fossés.

451) *P. rupestris*. (*L. Sp.* 711) . . . . . T. n° 736.  
 2 Mai-Juillet.

R. Bois montueux, rochers schisteux sur la lisière des bois Château de Schuttbourg. T. Schnaufmühl en aval de Wiltz. Mardelle du canal de la Toutschenmühle. (Wiltz.) DW.

452) ? *P. supina*. (*L. Sp.* 711.) *Comarum supinum*. Alfd.  
 2 ou ① Juin-Octobre. [T. n° 732.]

R. Bords vaseux des rivières, villages, par place. Graviers de la Moselle aux environs de Remich et de Schengen. T.

453) *P. argentea*. (*L. Sp.* 712) . . . . . T. n° 735.  
 2 Juin-Juillet.

C. Lieux sablonneux, arides, vieux murs, etc.

454) † *P. recta*. (*L. Sp.* 711) . . . . . EF. 118.

‡ Juin-Juillet.

Çà et là subspontané.

**155. Tormentilla.** (*L. Gen.* 637.) — Tormentille. — Tormentille.

455) *T. procumbens*. (*Sibth. oxon.* 162.) reptans. T. n° 740.

‡ Juin-Juillet.

AC. Bois frais, tourbières, pâturages humides, bords des fossés. AC. Ardennes.

R. ailleurs.

456) *T. silvestris*. (*Necker, délic. I.* 222.) erecta. T. n° 741.

‡ Mai-Août.

C. Bois, bruyères, prairies fraîches, pâturages.

Tribu III. — Roseæ. (*DC. Prod.* 2. 596.)

**156. Rosa.** (*L. Gen.* 631.) — Rose. — Rose. [XII, 2.]

Sect. I. — Chamaerodon. (*Dmrt. Hulth.* p. 11.)

457) *R. pimpinellifolia*. (*Ser. in DC. Prod. II,* 608.) T. n° 747.

‡ Juin-Juillet. Fr. Août-Octobre.

R. Rochers, coteaux arides, taillis montueux. Côtes de la Sûre, Erpeldange, Bockholz, Esch s. S. T. Ruines de Bourseheid. K.

Var. *β. inermis*. (*DC. Fl. Fr. IV,* 439) . . . . . T. n° 7476.

R. Côtes de la Sûre au-dessus d'Erpeldange et carrières d'Alscheid. T.

Sect. II. — Cassiorhodon. (*Dmrt. Hulth.* p. 11.)

458) † *R. cinnamomea*. (*L. Sp.* 703) . . . . . T. n° 745.

‡ Mai-Juin. Fr. Août-Octobre.

Cultivé dans les jardins, subspontané dans les haies. Bellevue. T. Hesperange.

EF. Clausen. BB. Pétresse. EF. Sichenhof, etc. T. Weimershof. Kz.

Sect. III. — Erorhodon. (*Dmrt. Bul. BB. T. VI,* 1.)

459) † *R. gallica*. (*L. Sp.* 704) . . . . . EF. 121.

‡ Juin. Fr. Septembre-Octobre.

Très-anciennement cultivé, Naturalisé dans les haies. Bellevue. Kz. Weimershof. BL. Eisembourg. EF.

460) † *R. centifolia*. (*L. Sp.* 704) . . . . . T. n° 119.

‡ Juin.

Très-anciennement cultivé en grand nombre de variétés et souvent subspontané.

Var. *β. muscosa*.

Var. *γ. pomponica*.

Sect. IV. — *Cynorhodon*. (*Dmrt. Hulth. p. 11.*)A. *Spiniferæ*. (*Dmrt. l. c.*)§ 1. — *Tomentosæ*. (*Deség. Rev. p. 5.*)461) *R. pomifera*. (*Herrm. Diss. p. 17*) . . . . T. n° 753b.

‡ Mai-Juin. Fr. Septembre-Octobre.

R. Rochers aux environs de Luxembourg. Clausen. BB. Pétrusse. BL. ! Vallée de la Moselle. Gke.

462) *R. tomentosa*. (*Sm. fl. Brit. 539*). . . . . T. n° 751.

‡ Juin. Fr. Août-Novembre.

C. Bords des chemins, haies, bois, etc.

Var. *β. cinerascens*. (*Dmtr. Prod. 98*) . . . . . T. n° 753.

AC. Haies, bords des chemins. Tavion. Dm. ! Pétrusse. BL. ! etc. Rochers schisteux des côtes de la Sûre près d'Esch s. | S. T.

Var. *γ. subglobosa*. (*Sm. Engl. Fl. II, p. 384.*)

AR. avec l'espèce. Weimershof. Crépin. BB.

Var. *δ. cuspidatoides*. (*Crépin in litt.*)

Avec l'espèce. Pulvermühl. (Crépin.)

B. *Hamiferæ*. (*Dmtr. l. c.*)§ 2. — *Rubiginosæ*. (*Lindl. Ros. Monogr. 84.*)463) *R. lutea*. (*Mill. Dict. n° 11.*) *R. eglanteria*. . . T. n° 746.

‡ Mai-Juin.

R. Cultivé. Subspontané dans les haies. Doit être spontané dans la vallée de la Moselle. Wrtg.

464) *R. rubiginosa*. (*Lin. Mant. p. 564.*) Pettendîrchen.

‡ Juin. Fr. Août-Octobre.

[T. n° 750.

C. Coteaux arides, lieux incultes, haies, bois. AR. Ardennes.

Var. *β. umbellata*. (*Leers. fl. Herb. p. 117*) . . . . T. n° 750b.

Avec l'espèce.

Var. *γ. microphylla*. (*Wallr. Ros. Hist. 220*) . . . T. n° 750c.

AR. Vallée latérale de la Krischelheid. Bourscheid. BL.

465) *R. micrantha*. (*Sm. Eng. Bot. 1. 2490.*)

‡ Juin. Fr. Septembre.

AR. Coteaux arides, lieux incultes, bois, vallée de la Moselle. Crépin *in litt.*§ 3. — *Caninæ*. (*Deség. l. c. p. 3.*)466) *R. tomentella*. (*Lem. Bull. philom. 1818. vol. 86. p. 364.*)

‡ Juin. Fr. Septembre.

C. Coteaux arides, taillis, haies des terrains calcaires.

467) *R. campestris*. (*Dmtr. Prod.* 1127) . . . *Dmtr. Prod.* 93.  
 † Juin. Fr. Septembre-Octobre.

AR. Buissons, haies, mardelles des bois.

468) *R. canina*. (*L. Sp.* 704.) Hondsrös. Spakeldaar. Spakelter.  
 † Juin. Fr. (Spackel) Août-Novembre. [T. n° 749.

C. Bois, haies, buissons, etc.

Var.  $\beta$ . *luxemburgensis*. (*Crép. in litt.*) *R. rubrifolia*. T. n° 748.

R. avec l'espèce. Haies et bois au-dessus des forges de Dommeldange.

Var.  $\gamma$ . *malmundariensis*. (*Lej. Fl. Sp. I, 231. II, 314.*)

AR. avec l'espèce. Haies sur la hauteur sous l'Eicherbuseh vis-à-vis de Beggen.

BB.!

Var.  $\delta$ . *nitens*. (*Desv. in Mérat. fl. Par. éd. 1. 192.*) T. n° 749a.

AC. Avec l'espèce.

Var.  $\epsilon$ . *glaucescens*. (*Desv. l. c.*) . . . . . T. n° 749b.

AC. Avec l'espèce.

Var.  $\zeta$ . *dumetorum*. (*Thuil. Fl. par. 250*) . . . . . T. n° 749c.

AC. Avec l'espèce.

Var.  $\eta$ . *collina*. (*Lej. Fl. Spa. 1. p. 231*) . . . . . T. n° 752.

Avec l'espèce en Ardennes.

Sect. V. — *Stylorhodon*. (*Dmtr. Hulth. p. 11.*)

469) *R. arvensis*. (*Huds. Fl. Angl. p. 192*) . . . . . T. n° 743.

† Juin-Juillet. Fr. Octobre.

C. par place. Bois montueux, broussailles, lieux incultes, humides,

Var.  $\beta$ . *repens*. (*Scop. Car. I, p. 355.*)

AR. Avec l'espèce.

Var.  $\gamma$ . *bibracteata*. (*Bast. in DC. Fl. Fr. V, 537.*)

R. Avec l'espèce en Ardennes.

Tribu IV. — *Agrimoneæ*. (*C. et Germ. l. c. 207.*)

† 57. *Agrimonia*. (*L. Gen. 607.*) — Aigremoine. — Odermennig.

470) *A. Eupatoria*. (*L. Sp. 643.*) Lentes. . . . . T. n° 684.

‡ Juin-Septembre.

C. Lisère des bois, haies, bords des chemins, pâturages argileux. R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *canescens*. (*Dmtr. Prod. 1200*) . . . . . *Dmtr.* 1200.

‡ Juillet-Août.

R. Haies, taillis, coteaux boisés. Michel et T.

Var.  $\gamma$ . *acutifolia*. (*Dmtr. Prod. 1199*) . . . . . *Dmtr.* 1199.

‡ Juin-Juillet.

R. Ravins boisés, broussailles. T.

471) *A. odorata*. (*Mill. Dict. n° 7*) . . . . . T. n° 685.

‡ Juin-Août.

R. Bois, buissons, endroits ombragés des Ardennes. Alscheid. K. entre Pleitrange et Syren. BL.

### XXXVI. SANGUISORBEAE.

(Lindl. Syn. 102.) [IV, 1.]

**158. Alchemilla.** (*Tournf. Inst. 269*). — Alchemille. — Sinau.

472) *A. vulgaris*. (*L. Sp. 178.*) Dàmantel . . . . . T. n° 268.

‡ Mai-Juillet.

C. Bois, prairies, bords des champs, haies.

Var.  $\beta$ . *subsericea*. (*Koch, Syn. 256.*) *A. montana*. (*Wild. en. 170.*)  
[Dmtr. 223.]

R. Prés montueux et pâturages des Ardennes. Dmtr.

473) *A. arvensis*. (*Scop. Carn. 1. 115.*) Brochkraut. Aphanes  
*arvensis* . . . . . T. n° 270.

① ou ② Mai-Octobre.

C. Moissons maigres, lieux cultivés.

**159. Sanguisorba.** (*L. Gen. 146.*) — Sanguisorbe. — Wiesenknop. [IV, 1.]

474) *S. officinalis*. (*L. Sp. 169.*) Rothkäpgen. Kneepchen.

‡ Juin-Septembre. [T. n° 77.]

R. Prairies un peu humides en aval de Schengen, près d'Echternach. T (Brimmeyr père), Bech, Stolzembourg (Courtois). Quelquefois cultivé et alors échappé des jardins : au-dessus du château de Dommeldange. BL.

**160. Poterium.** (*L. Gen. 1064.*) — Pimpinelle. — Becherblume.

475) *P. dictyocarpum*. (*Sp. A. Sc. nat. 1846. p. 34.*) *P. sanguisorba*. (*L. Sp. 1411 ex parte*) . . . . . T. n° 1374.

‡ Mai-Août.

C. Prés, lieux herbeux, bois, bords des chemins, etc. R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *glaucescens*. (*Rehb. fl. exc. 610.*)

AC. Avec l'épée.

476) † *P. muricatum*. (*Spach. l. c.*) Pimpernelle.

‡ Juin-Juillet.

AR. Cultivé, notamment dans les talus des chemins de fer et souvent subspontané entre Mamer et Cap. Kz. Kleeberg (Remerschen.) BB. !

### XXXVII. POMACEAE.

(Juss. Gen. 334.) [XII, 2.]

**161. Mespilus.** (*L. Gen. 625.*) — Néflier. — Mispel.



477) *M. germanica*. (*L. Sp.* 684.) Aspern. Mespel. Hespel.  
 † Mai. Fr. (Hondsaa) Automne. [T. n° 716.

AC. Cultivé en plusieurs variétés, rarement subspontané. Spontané? dans les haies de Vianden. T. Föls — (Scheugen.) Kz.

**162. Cratægus.** (*L. Gen.* 622.) — Aubépine. — Weisdorn.

478) *C. Oxyacantha*. (*L. Sp.* 683.) Hoodaar. . . T. n° 713.  
 † Avril-Mai. Fr. (Millebierchen) Août-Septembre.

C. Haies, lisières et clairières des bois, coteaux secs. AR. Ardennes. Cultivé en plusieurs variétés, notamment à fleurs pourpres, pleines, à feuilles laciniées.

479) *C. monogyna*. (*Jacq. Fl. Aust. III*, 292) . . T. n° 713d.  
 † Mai-Juin. Fr. Août-Septembre.

AC. avec le précédent. Neudorf (Lechensberg). BL.!

480) † *C. Pyracantha*. (*Pers. syn. II*, 37.) Buisson-ardent.  
 † Mai. Fr. Automne-hiver.

C. Anciennement cultivé dans les jardins.

**163. Cotoneaster.** (*Medic. Lindl. trans. lin. soc.* 13. 401.)

481) *C. vulgaris*. (*Lindl. Eng. Bot.* 2713.) Millebitzen. Mespilus cotoneaster. (*L. Sp.* 136). . . . . T. n° 717.  
 † Avril-Mai. Fr. Septembre-Octobre.

AC. Rochers, coteaux calcaires : Würthberg (Clausen), Pétrusse, Pulvermühl. BL. ! Côtes de la Basse-Sûre. Echternach (Brimmeyr père), de la Moselle. BL.

**164. Amelanchier.** (*Mönch. meth.* 682.) — Amelanchier. — Felsenmispel.

482) *A. vulgaris*. (*Mönch. l. c.*) . . . . . T. n° 718.  
 † Avril-Mai.

R. Rochers de l'Eisch entre Reckingen et Marienthal. Rochers de la Sûre aux environs de Rosport. Echternach. T. Brimmeyr père. B. Krischelheid. Château de Vianden. (Courtois.)

**165. Cydonia.** (*Tournf. Inst.* 405.) — Coignassier. — Quittenbaum.

483) † *C. vulgaris*. (*Pers. syn. pl. II*, 405.) Quidebâm. EF. 124.  
 † Avril-Mai. Fr. (Quidebier) Septembre-Octobre.

C. Cultivé pour ses fruits. R. Subspontané dans les haies.

484) † *C. japonica*. (*Pers. l. c.*) Poirier du Japon.  
 † Mars-Juin.

Très-anciennement et généralement cultivé pour sa floraison précoce.

**166. Pirus.** (*Tournf. Inst.* 406.) — Poirier. — Birnbaum.

485) *P. communis*. (*L. Sp.* 686.) Birebàm . . . T. n° 722.

‡ Avril-Mai. Fr. (Weß Bier) Septembre-Octobre.

AC. par place. Bois montueux, manque sur de grands espaces, notamment en Ardennes.

Var. *β. tomentosa*. (*Koch, Sys. Fl. G.* 269.)

Avec l'espèce.

Var. *γ. sativa*. (*DC. Prod.* 2. 634) . . . . . T. n° 723.

Cultivé en nombreuses variétés pour ses fruits.

‡ Achras. (*Wallr. Sched.* 213.) Bezy.

‡ ‡ rufescens. (*Pers.*) Rousselet.

‡ ‡ ‡ Bergamotia. (*Ruellius.*) Marmotebier. Bergamotte.

‡ ‡ ‡ ‡ Falerna. (*Plinius.*) Beurré.

**167. Malus.** (*Tournf. Inst.* 406.) — Pommier. — Apfelbaum.

486) *M. acerba*. (*Mérot. fl. Par.* 187.) Eppelbàm. T. n° 720.

‡ Mai. Fr. (Holzâpel) Avril-Octobre.

AC. par place. Bois montueux, haies.

487) ‡ *M. communis*. (*Poir. Dict.* 5. t. 360) . . . T. n° 719.

‡ Avril-Mai. Fr. Août-Septembre.

AC. par place. Bois champs. Cultivé en nombreuses variétés.

‡ pardisiaca. (*Lin.*) Paradis.

‡ ‡ mitis. (*Wall.*) Doucin.

Cultivé comme sauvageon.

‡ ‡ ‡ Costata. (*Schübler et Mertens. Fl. W.* 191.) Calville.

‡ ‡ ‡ ‡ Megamilla. (*S. et M. l. c.*) Rambour.

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Platymela. (*M. l. c.*) Court-pendu.

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Prasmilla. (*Pers.*) Reinette.

Var. *β. dasyphylla*. (*Borkh. in. Prod. Fl. Rl.* 460.)

R. Rochers de la Moselle.

Var. *γ. luciliburgiensis*. (*Lucas H. der Pom. I.* 49.) Weiden-  
âpel. Reinette des vergers.

‡ Mai.

Variété à rameaux pendants, cultivée et se reproduisant de graines.

488) ‡ *M. baccata*. (*L.*) Russeschen Apfel.

‡ Avril-Mai. Fr. Octobre.

Cultivé dans les pares pour la beauté de ses fruits.

**168. Sorbus.** (*L. Gen.* 633.) — Sorbier. — Eberesche.

489) *S. domestica*. (*L. Sp.* 684.) Speerebàm. . . T. n° 715.

‡ Mai-Juin. Fr. (Speer.) Septembre-Octobre.

AR. Bois des terrains calcaires. Stadtbredimus. Kz. Rosport. T. Stegen. K. Quelquefois cultivé: Bricherhof, (Stadtbredimus), sujet de 3<sup>m</sup>10 de tour. Canach, Trintange, Glabach, Weyderterhof (Larochette.) Bentzert (Mersch.) etc.

490) *S. aucuparia*. (L. Sp. 683.) Bentzelter. Vullekîschbàm.

‡ Mai-Juin. Fr. (Vullekîschten.) Août-Septembre. [T. n° 714.

C. Bois montueux, rochers, terrains arides.

491) *S. torminalis*. (Crantz. Aust. 85.) Ellrecher. Wele Speere-

bàm . . . . . T. n° 711.

‡ Mai. Fr. Septembre-Octobre.

AC. par place. Dans les bois de la Moselle et des terrains calcaires. R. ailleurs.

492) *S. Aria*. (Crantz. Aust. 2. 2.) Hartholz. Schwerholz

Arlesbàm . . . . . T. n° 712.

‡ Mai. Fr. (Welspeeren.) Avril-Septembre.

AC. Bois montueux, rochers de la Moselle. R. ailleurs.

**XXXVII. PHILADELPHAE.**

(Don. in James Journ 1825. 133.)

**169. Philadelphus.** (L. Gen. 614.) — Séringat. — Pfeiffenstrauch. [XII, 2.] . . . . . EF. 125.

493) † *P. coronarius*. (L. Sp. 671.) Wele Jasmeng. Welen

Orangebàm . . . . . T. n° 701.

‡ Mai-Juin.

C. Cultivé. Quelquefois subspontané dans les haies, Bellevue, Bisserweg. K. ! Dudelage (Courtois).

**XXXIX. CALYCANTHEAE.**

**170. Calycanthus.** (Lindl. Bot. mag. 503.) Calycanthe. Gewürzstrauch.

494) † *C. floridus*. (Ldl. l. c.) Pompadour.

‡ Juin-Août.

C. Cultivé pour ses fleurs odorantes.

**XL. ONAGRARIEAE.**

(Juss. in Annal. mus. III. 315 ex parte.)

**171. Epilobium.** (L. Gen. 471.) Epilobe. Weidenröschchen. [VIII, 1.]

Sect. I. — Chamænerion. (Tauch. in DC. Prod. 3. 40.)

495) *E. angustifolium*. (L. Sp. 493.) Feierkraut. E. spicatum.

‡ Juin-Août.

[T. n° 571.

C. Bois montueux, buissons, haies, bords des eaux.

Sect. II. — *Lysimachion*. (*Tausch. Prod.* 3. 41.)A. *Turinifera*.

- 496) *E. hirsutum*. (*L. Sp.* 494) . . . . . T. n° 572.  
 24 Juin-Août.

AC. Bords des eaux, endroits humides, fossés. R. Ardennes.

B. *Stolonifera*.

- 497) *E. parviflorum*. (*Schreb. spic. fl. lips.* 146.) *E. pubescens* et  
 molle . . . . . T. n° 574.  
 24 Juin-Septembre.

C. Lieux humides, fossés, haies. R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *intermedium*. (*Mérot. Fl. Par.* 147.)

R. Bois humides, à droite de Stegen. K.

- 498) *E. lanceolatum*. (*Sebast. et Maur. Fl. rom. Prod. p.* 1. 387.  
 1. f. 2) . . . . . BB. 401.  
 24 Juin-Juillet.

R. Rochers, bords des chemins entre Machthum et Ahn. BB. !

- 499) *E. montanum*. (*L. Sp.* 494) . . . . . T. n° 580.  
 24 Juin-Août.

C. Bois, buissons, rochers, murs.

- Var.  $\beta$ . *nutans*. (*Lej. rev. Fl. de Spa.* 76) . . . . . T. n° 581.  
 24 Juin-Juillet.

R. Marais. Avec l'espèce en Ardennes.

- 500) *E. roseum*. (*Schreb. spic. fl. lips.* 147) . . . . . T. n° 578.  
 24 Juin-Septembre.

AC. Lieux humides, bords des fossés et des eaux.

C. *Flagellifera*.

- 501) *E. tetragonum*. (*L. Sp.* 494) . . . . . T. n° 577.  
 24 Juin-Août.

AR. Lieux humides, bords des fossés, des sources, etc. Au-dessus des forges de Dommeldange. T. Vallée entre Krichelheid et Friedbüsch. (Courtois.)

- 502) *E. obscurum*. (*Schreb. spic. fl. lips.* 147) . . . . . T. n° 579.  
 24 Juillet-Septembre.

R. Bois ombragés, haies des terrains marécageux; au-dessus des forges de Dommeldange. T. Plus commun en Ardennes

- 503) *E. palustre*. (*L. Sp.* 405) . . . . . T. n° 575.  
 24 Juin-Septembre.

AC. Marais, lieux humides, tourbeux. C. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *decumbens*. (*DC. Pr.* 1075). . . . . T. n° 576.  
 24 Juin-Juillet.

R. Marais spongieux aux environs de Rambrouch. T.

**172. Oenothera.** (*L. Gen.* 469.) — Onagre. — Nachtkerze.

504) *O. biennis*. (*L. Sp.* 492) . . . . . T. n° 582.  
 ② Juin-Septembre.

AC. par place. Lieux cultivés, bois ombragés, etc.

**173. Isnardia.** (*L. Gen.* 456.) [IV. 4.]

505) *I. palustris*. (*L. Sp.* 175) . . . . . T. n° 269.  
 24 Juillet-Août.

R. Lieux inondés, fossés, mares : entre Rambrouch et Folschette. T.

**XLI. CIRCEACEAE.**

(*Lindl. Syn. Brit. fl. ed.* 2. 109.)

**174. Circaea.** (*Tournef. Inst.* 155.) [II. 4.]

506) *C. lutetiana*. (*L. Sp.* 121) . . . . . T. n° 34.  
 24 Juin-Août.

C. Bois ombragés et humides. R. Ardennes.

507) *C. intermedia*. (*Ehrh. Beit.* IV. 42) . . . . . T. n° 35.  
 24 Juillet-Août.

R. Bois montueux, ombragés, humides : Rodenbüsch (Kopstal.) Grünenwald.  
 T. Krichelheid. Md.

508) ? *C. alpina*. (*L. Sp.* 121). . . . . T. n° 36.  
 24 Juin-Juillet.

R. Bois humides aux environs de Rambrouch et de Folschette. T. Krichelheid. Md.

**XLII. HALORAGAEAE.**

(*R. Br. Gen. rem.* 17.)

**175. Myriophyllum.** (*Vaill. in Act. acad.* 1719. 3.) Myriophile.  
 Tausendblatt. [XXI. 5.]

509) *M. verticillatum*. (*L. Sp.* 1410.) Wässergräs. T. n° 1372.  
 24 Juin-Septembre.

AR. Fossés, rivières, étangs, marais. Basse-Sûre, Kz. Moselle. T.

Var.  $\beta$ . *intermedium*. (*Koch. Syn. Fl. Ger.* 244.)

Var.  $\gamma$ . *pectinata*. (*Wall. Sched.* 419. *DC. Fl. Fr.* 3. 529.)

Avec l'espèce.

510) *M. spicatum*. (*L. Sp.* 1410) . . . . . T. n° 1371.  
 24 Juin-Août.

AR. Rivières, étangs, fossés. C. dans la Sûre et la Moselle. T.

511) *M. alternifolium*. (DC. *Fl. Fr. sup.* 529.)

‡ Juin-Août.

R. Dans les eaux stagnantes et claires des Ardennes.

### XLIII. UMBELLIFERAE.

(Juss. *Gen.* 218.) [V, 2.]

#### DIVISION I. — ORTHOSPERMÆ.

Tribu I. — Hydrocotylæ. (*Spreng. in Schreb. syst. veg.* 6. XXXII.)

**176. Hydrocotyle.** (*Tournf. Inst.* 173.) — Hydrocotyle. — Wassernabel.

512) *H. vulgaris*. (*L. Sp.* 338) . . . . . T. n° 489.

R. Prés marécageux, bords des étangs, des bois humides et des chemins, fossés, tourbières. C. Ardennes.

Tribu II. — Saniculæ. (*Koch. Umb.* 138.)

**177. Sanicula.** (*Tournf. Inst.* 173.) — Sanicle. — Sanikel.

513) *S. europæa*. (*L. Sp.* 339.) Sauneckel . . . . T. n° 487.

‡ Mai-Juin. Fr. Juillet-Août.

AC. par place. Bois humides, lieux herbeux, couverts.

**178. Astrantia.** (*L. Gen.* 327.) — Astrantie. — Strenze.

514) † *A. major*. (*L. Sp.* 330.)

‡ Mai-Juin.

C. Cultivé et quelquefois subspontané.

**179. Eryngium.** (*Tournf. Inst.* 173.) — Panicault. — Männertreu.

515) *E. campestre*. (*L. Sp.* 337.) Brochdeschtel. Ellend.

‡ Juillet-Septembre. [T. n° 488.]

C. Bords des chemins, lieux incultes, coteaux arides de la Moselle. R. ailleurs.

Tribu III. — Cicuteæ. (*Koch, l. c.*)

Sous-tribu I. — Ammineæ. (*Koch, l. c.* 114.)

**180. Bupleurum.** (*Tournf. Inst.* 163.) Buplèvre. Tauröschen.

516) *B. rotundifolium*. (*L. Sp.* 340.) Durchkraut. T. n° 484.

① Juin-Août.

AR. Champs, moissons des terrains calcaires et sablonneux. Herrenberg (Diekirch.) K. Helmsange. BL. ! AC. Moselle.

517) *B. falcatum*. (*L. Sp.* 341) . . . . . T. n° 485.

‡ Juillet-Septembre.

AC. Rochers, coteaux pierreux, vignes, bords des chemins, clairières des bois.

- 181. Falcaria.** (*Host. Fl. Aust.* 1. 381.) Falcaire. Sichelinöhre.  
518) *F. vulgaris.* (*Beruh.* 1800.) Falcaria Rivini. (*Host.*) Sium  
falcaria. (*L.*) . . . . . T. n° 453.

① Juillet-Septembre.

C. Champs, bords des chemins. Echternach (Brimmeyr père.) Rosport. T. Moselle : entre Grevenmacher et Elnen. T. BB. Wecker. Merttert. R. BB.

- 182. Aegopodium.** (*L. Gen.* 368.) — Egopode. — Ziegenfuss.  
519) *A. Podagraria.* (*L. Sp.* 379.) Giersch. Dreiföss. T. n° 428.

‡ Juin-Août.

C. Haies, bois, prairies ombragées. R. Ardennes.

- 183. Carum.** (*L. Gen.* 365.) — Carum. — Kümmel.

- 520) *C. Bulbocastanum.* (*Koch. Umb.* 121.) Erdknüdd. Bunium.  
‡ Juin-Juillet. [T. n° 466.

C. Clairières des bois sablonneux, champs et moissons maigres.

- 521) *C. Carvi.* (*L. Sp.* 378.) Wiesegemelchen. Seseli Carvi.

② Mai-Juin.

[T. n° 434.

C. Prairies, pelouses, surtout en Ardennes.

- 184. Petroselinum.** (*Hoff. Umb.* 1. 78. t. 1. f. 7.) — Persil.  
— Petersilie.

- 522) † *P. sativum.* (*H. l. c.*) Pëtersëleg . . . . . T. n° 480.

② Juin-Août.

C. Cultivé et quelquefois subspontané dans le voisinage des jardins.

- 185. Apium.** (*L. Gen.* 367 *excl. species.*) — Celéri. — Sellerie.

- 523) † *A. graveolens.* (*L. Sp.* 379.) Zellerë. . . . . T. n° 479.

② Juillet-Septembre.

C. Cultivé et quelquefois échappé des jardins.

- 186. Helosciadium.** (*Koch, Umb. p.* 125.) — Helosciade. —  
Scheiberich.

- 524) *H. nodiflorum.* (*Koch, Umb.* 126.) Sium nodiflorum.

‡ Juin-Juillet.

[T. n° 451.

AC. Buissons, mares, fossés, étangs.

- 525) *H. inundatum.* (*Koch, Umb.* 125.) Sium inundatum.

‡ Juin-Juillet.

[T. n° 454.

Mares, étangs, fossés. AC. Bords de la Moselle entre Remich et Wintrange.

- 187. Sium.** (*L. Gen.* 348 *ex parte.*) — Berle. — Merk.

- 526) *S. latifolium.* (*L. Sp.* 351). . . . . T. n° 449.

4 Juillet-Septembre.

R. Manque sur de larges espaces. Bords des eaux, fossés, près marécageux de la plaine, sur la Moselle et en Ardennes. Echternach (Brimmeyr père.)

527) *S. angustifolium*. (*L. Sp.* 1672) . . . . . T. n° 450.

4 Juillet-Septembre.

AC. Bords des eaux, fossés, fontaines, etc. Paraît manquer en Ardennes.

**188. Pimpinella.** (*L. Gen.* 366.) — Boucage. — Biebernelle.

528) *P. magna*. (*L. Mant.* 219) . . . . . T. n° 430.

4 Juin-Septembre.

C. Bois, prairies, lieux herbeux. R. Ardennes.

529) *P. Saxifraga*. (*L. Sp.* 378). . . . . T. n° 429.

4 Juillet-Septembre.

C. Coteaux arides, bords des chemins, prairies, bois.

Var.  $\beta$ . *dissectifolia*. (*Wallr. Sched.* 123) . . . . . T. n° 431.

Près secs. Avec l'espèce.

Var.  $\gamma$ . *poteriifolia*. (*Wallr. Sched.* 123.)

Avec l'espèce. Schönert (Bourglinster) Kz.

530) † *P. Anisum*. (*L. Sp.* 379.) Aneis.

① Juillet-Août.

Quelquefois cultivé et spontané dans le voisinage des cultures.

Sous-tribu II. — *Sesellinae*. (*Koch, Umb.* 102.)

**189. Acthusa.** (*L. Gen.* 351 *ex parte.*) — Êthuse. — Gleise.

531) *A. Cynapium*. (*L. Sp.* 367). . . . . T. n° 442.

① Juillet-Octobre.

C. Lieux cultivés, frais, bords des chemins, bois.

**190. Oenanthe.** (*L. Gen.* 352.) — Oenanthe. — Rebendolde.

532) *O. fistulosa*. (*L. Sp.* 365) . . . . . T. n° 445.

4 Juin-Juillet.

AC. Fossés, ruisseaux, mares: Filsdorf, Hunsdorff, Mersch, etc. T.

533) *O. peucedanifolia*. (*Pollich. Pal. I.* 289. *t.* 2.) T. n° 446.

4 Mai-Juillet.

AC. Prairies fraîches et marécageuses. Moselle. C. Erpeldange. Rambrouch. T.

534) *O. Phellandrium*. (*Lamk. fl. Fr. III.* 432) . . . T. n° 444.

① ou 4 Juillet-Septembre.

AR. Mares, fossés, étangs, lieux marécageux.

**191. Libanotis.** (*Crantz. Aust.* 222.) — Libanotide. — Heil-

wurz.



535) *L. montana*. (*Allion. ped.* 2. p. 30. t. 62.) Athamanta libanotis . . . . . T. n° 460.

② ou 4 Juillet-Septembre.

AR. Coteaux arides, bois montueux, rive gauche du ruisseau entre Wiltz et Toutschenmühle DW. Côtes de la Sûre entre Michelau et Erpeldange. T. Krischelheid. Ruines de l'ancien château de Stolzenbourg. T. Md.

**192. Seseli.** (*L. Gen.* 360.) — Seseli. — Sesel.

536) *S. annuum*. (*L. Sp.* 373) . . . . . T. n° 432.

① ou 4 Juillet-Août.

R. Collines sèches, bois montueux. Pulvermühl. T. BL. BB.!

537) *S. montanum*. (*L. Sp.* 372) . . . . . T. n° 433.

4 Juillet-Août.

R. Coteaux arides, bois secs des terrains calcaires. Pulvermühl. T. Dudelange. EF.

**193. Foeniculum.** (*Adans. Fam.* II. 101.) — Fenouil. — Fenchel.

538) † *F. officinale*. (*All. ped.* 2. 25.) Fenchel.

② ou 4 Juillet-Septembre.

Quelquefois cultivé comme condiment et çà et là naturalisé.

**194. Meum.** (*Tournf. Inst.* 165.) — Meon. — Bärwurz.

539) *M. athamanticum*. (*Jacques. Aust.* II. p. 2. 303.) Ligusticum meum . . . . . T. n° 457.

4 Mai-Juillet.

AC. Prairies fraîches et pâturages humides aux environs de Rambrouch et de Neunhausen. T. — C. Hoffelt. ! Hachiville.!

**195. Silaus.** (*Besser ap. Rœm. et Schult. Sys.* VI. 36.) Silaus. Silau.

540) *S. pratensis*. (*Bess. l. c.*) . . . . . T. n° 481.

4 Juillet-Septembre.

C. Prairies fraîches, lieux humides.

Tribu IV. — Silenææ. (*DC. Prod.* 4. 180.)

Sous-tribu I. — Angelliceæ. (*Koch, Umb.* 98.)

**196. Levisticum.** (*Koch, Umb.* p. 101. f. 141.) — Livèche. — Liebstockel.

541) † *L. officinale*. (*Koch. l. c.*) Lëfstack. Lëwfraawesch. Ligusticum levisticum . . . . . T. n° 456.

4 Juin-Juillet.

Cultivé surtout en Ardennes; çà et là spontané, aux environs d'Esch s/S. C. Cimetière de Dudelange. Kz.

**197. Selinum.** (*Hoff. Umb.* 1. 150.) — Selin. — Silge.542) *S. carvifolia.* (*L. Sp.* 350) . . . . . T. n° 464.

① ou ② Juillet-Septembre.

AC. Bois, prairies humides. Moselle. Wgt. Bois de Remerschen. BB.

**198. Angelica.** (*L. Gen.* 347 *ex parte.*) Angelique. Brustwurz.543) *A. silvestris.* (*L. Sp.* 361.) *Imperatoria silvestris.* T. n° 435.

① ou ② Juillet-Septembre.

C. Prairies, lieux ombragés, bords des eaux.

**199. Archangelica.** (*Hoff. Umb.* 1. p. 168. — Archangelique. — Engelwurz.544) † *A. officinalis.* (*H. l. c.*) . . . . . T. n° 455.

② Juillet-Août.

Cultivé çà et là et quelquefois subspontané autour des lieux habités. Vieux château d'Ansembourg, DW. !

Sous-tribu II. — **Peucedaneae.** (*DC. Prod.* 4. 170.)**200. Peucedanum.** (*Koch. Umb.* 92.)—Peucedan.—Haarstrang.545) *P. Chabræi.* (*Rehb. ap. Mont. hand. ed. 2.*) *Carvifolium.*

‡ Juin-Septembre.

[T. n° 464.

AC. Clairières des bois, pelouses, prairies du calcaire coquillier entre Wasserbillig et Wecker. R. Remieh, Remerschen, Wellenstein. A. EF Kz. Schengen. BB.

546) *P. Cervaria.* (*Lap. Abr.* 149.) *Sium Cervaria.* T. n° 461.

‡ Juillet-Septembre.

R. Coteaux calcaires le long des bois, clairières. Grevenmacher, T. Wecker, Mertert, Luxembourg. R. Herborn. Ilse, Wellenstein. A. Kz. EF. Wintrange, Remerschen, Schengen, Machthum. BB.

547) *P. palustre.* (*Mönch. meth.* 82.) *Selinum palustre.* T. n° 462.

‡ Juillet-Août.

B Bois tourbeux. Berbourg. Beyerholz. T.

548) *P. Oreoselinum.* (*Mönch. meth.* 82.) E. Math. Fl. B. 595.

‡ Juillet-Août.

R. Coteaux boisés, prés secs et montueux. L. et C. 522.

**201. Anethum.** (*Tournf. Inst.* 169.) — Aneth. — Dill.549) † *A. graveolens.* (*L. Sp.* 377.) Dell. Cornichonskraut.

① Juillet-Août.

[T. n° 482.

C. Cultivé et très-souvent subspontané aux environs des lieux habités.

**202. Pastinaca.** (*Tournf. Inst. t.* 170.) — Panais. — Pastinack.550) *P. silvestris.* (*Mill. Dic.* 1.) Petener . . . T. n° 483.

## ② Juillet-Août.

AC. Moissons, prairies, décombres des terres fortes et calcaires. Canach, entre Eseh-sur-l'Alzette et Mondereange, Cap et Bettingen. Kz. etc.

551) † *P. sativa*. (*L. Sp.* 376.)

## ② Juillet-Septembre.

Cultivé pour ses racines pyriformes ou rondes et pour ses feuilles.

**203. Heracleum.** (*L. Gen.* 345.) — Berse. — Bärenklau.

552) *H. Spondylium*. (*L. Sp.* 358.) Tüten . . . T. n° 459.

## ② Juin-Septembre.

C. Prés, lieux herbeux, bois.

Var.  $\beta$ . *elegans*. (*Jacq. Aust. 1. t.* 174.)

B. Avec l'espèce. Kièm (Grünwald). EF.

Var.  $\gamma$ . *sibiricum*. (*L. Sp.* 358.)

AC. Cultivé comme fourrage et plante d'ornement.

**204. Tordylium.** (*Tournf. Inst.* 170.) — Tordyle. — Zirmet.

553) *T. maximum*. (*L. Sp.* 345) . . . . . T. n° 478.

## ① Juin-Août.

R. Le long des haies, lieux incultes. Diekirch. K.

Tribu V. — *Laserpiticae*. (*DC. Prod. l. c.*)

Sous-tribu I. — *Thapsiaceae*. (*Koch, Umb.* 73.)

**205. Laserpitium.** (*L. Gen.* 344.) — Laser. — Lauskraut.

554) *L. latifolium*. (*L. Sp.* 356). . . . . T. n° 458.

## ‡ Juin-Août.

R. Rochers, broussailles. Pulvermühl, Wurthsberg, Clausen. T. Md. !

Sous-tribu II. — *Baurinea*. (*Koch, Umb.* 76.)

**206. Daucus.** (*Tournf. Inst.* 161.) — Carotte. — Möhre.

555) *D. Carota*. (*L. Sp.* 348.) Wurzel. Muhrt . . . T. n° 468.

## ② Juin-October.

C. Lieux cultivés, incultes, prairies, bords des chemins, lisières et elairières des bois. AR. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *sativa*. (*DC. Prod. t. 4. p.* 211.)

Cultivé en plusieurs variétés.

**207. Orlaya.** (*Hoff. Umb.* 1. 58.) — Orlaya. — Breitsame.

556) *O. grandiflora*. (*H. l. c.*) Ackerlaus. Canalis. T. n° 469.

## ① Juin-Août.

AC. Moissons, lieux cultivés de la Sûre. Echternach. Sch. (Brimmeyr père), de la Moselle. T. Vallée de la Syr : Mertert. R. BB. Rodt, Niederaanven. Entre Tuntingen et Sœul. Kz. Kahlseuer (Kopstal.) T.

DIVISION II. — **CAMPYLOSPERMEÆ.**Tribu I. — **Caucalineæ.** (*Koch, Sys. p. 343.*) [Juss. l. c.]**208. Turgentia.** (*Hoff. Umb. 59.*) — Turgénie. — Zwiesel.557) *T. latifolia.* (*Hoff. Umb. l. c.*) *Caucalis latifolia.* T. n° 470.

① Juin-Juillet.

AC. Moissons, lieux cultivés des terrains argileux. Echternach (Brimmeyr père.) Vallée de la Syr. R. Bous, Remich, Remerschen. BB. !

**209. Caucalis.** (*L. Gen. 334 ex parte.*)—Caucalide.—Haftdolde.558) *C. daucoides.* (*L. Mant. 351*) . . . . . T. n° 471.

① Mai-Juillet.

AC. Moissons, lieux cultivés, le long des chemins.

559) ? *C. Leptophylla.* (*L. Sp. 347.*) *C. parviflora.* T. n° 472.

① Juin-Juillet.

Moissons : Remich, Blaschette, Kahlscheuer. T. — Cette espèce de l'istérie est également indiquée par Koch (syn. 344) comme existant dans le pays.

**210. Torilis.** (*Adans. Fam. II. 99.*)—Torilide.—Klettenkerbel.560) *F. Anthriscus.* (*Gml. Fl. Bad. 1. 613.*) *Caucalis Anthriscus.*

② Juin-Septembre. [T. n° 474.

C. Lieux incultes, lisières des bois, haies, buissons, bords des fossés et des chemins.

561) *T. infesta.* (*Duby. Bot. Gall. I. 217.*) *Caucalis arvensis.*

② Juillet-Septembre. [T. n° 473.

AC. manque par place. Lieux cultivés, moissons.

562) ? *T. nodosa.* (*Gärt. Fruct. 1. 62. t. 20. f. 6.*) *Caucalis nodiflora* . . . . . T. n° 473.

① Mai-Août.

Introduit avec de la graine étrangère et très-fugace.

Tribu VI. — **Scandiciuæ.** (*Koch, Umb. 130.*)**211. Anthriscus.** (*Hoff. Umb. I. 38.*) — Anthrisque. — Kerbel.563) † *A. Cerefolium.* (*Hoff. Umb. 41.*) *Kiferwel.* T. n° 437.

① Mai-Août.

Condiment généralement cultivé et naturalisé dans le voisinage des habitations.

564) *A. silvestris.* (*Hoff. Umb. 40.*) . . . . . T. n° 436.

‡ Mai-Juin.

C. Haies, bois, prairies.

**212. Cherophyllum.** (*L. Gen. 358.*)—Cerfeuil.—Kälberkropf.

565) *C. temulum.* (*L. Sp.* 370.) Scharlach . . . T. n° 439.

② Juin-Juillet.

*C.* Haies, buissons, lisières des bois, lieux incultes, secs, décombres, etc.

566) † *Ch. bulbosum.* (*L. Sp.* 370.)

② Juillet-Août.

AR. Bois, haies humides et bords des eaux ombragés.

567) *Ch. hirsutum.* (*L. Sp.* 371). . . . . T. n° 438.

‡ Juillet-Août.

AR. Bords des cours d'eaux sous bois des Ardennes. C. Stolzenbourg. K.

**213. Myrrhis.** (*Scop. Carn. p.* 207.) — Myrrhide. — Süssdolde.

568) † *M. odorata.* (*Scop. l. c.*) Aneis-Kîrvel.

‡ Juin-Août.

Cultivé et parfois échappé des jardins. (T. mept. Prod.)

**214. Scandix.** (*Gærtner. Fruct. II.* 33.) Scandix. Nadelkerbel.

569) *P. Pecten-Veneris.* (*L. Sp.* 368) . . . . . T. n° 440.

① ou ② Mai-Juin.

*C.* Moissons, lieux cultivés, surtout dans les terres argileuses. R. Ardennes.

Tribu VII. — *Smyrnea.* (*Koch, Umb.* 133.)

**215. Conium.** (*L. Gen.* 336.) — Ciguë. — Schierling.

570) *C. maculatum.* (*L. Sp.* 469.) Schierling. Bonzenkraut.

*Cicuta major* . . . . . T. n° 465.

② Juin-Août.

*C.* mais manque dans diverses cantons, notamment les vallées de l'Attert, de l'Eisch. etc. Décombres, bords des chemins, voisinages des habitations. Ruines des vieux châteaux, surtout de l'Ardenne où la tige atteint 2 et 3 mètres de hauteur et sert à faire des cannes de lignes.

DIVISION III. — **CELOSPERMA.** (*Juss. l. c.*)

Tribu I. — *Coriandrae.* (*Koch, Umb.* 22.)

**216. Coriandrum.** (*L. Gen.* 350 *ex parte.*) Coriandre. Koriander.

571) *C. sativum.* (*L. Sp.* 367). . . . . EF. 136c.

① Juin-Juillet.

Cultivé çà et là et quelquefois spontané.

**XLIV. HEDERACEAE.**

(Aeb. Rich. Bot. Med. éd. 3. 552.)

**217. Hedera.** (*Tournef. Inst.* 384.) — Lierre. — Epheu. [V, 1.]

572) *H. Helix.* (*L. Sp.* 292.) Wantergréng . . . T. n° 389.

‡ Septembre-Octobre. Fr. (Jerschen) hiver.

C. Tronc des arbres, rochers, vieux murs, etc.

Var.  $\beta$ . humi-repens. (*Lej. fl. Spa.* 1, 122.)

C. Bois ombragés.

**218. Cornus.** (*Tourn. Inst.* 410.) Cornouiller. Hartriegel. [IV, 1.]

573) *C. sanguinea.* (*L. Sp.* 771.) Røde Faulbàm. Hartruth.

Lenneblut . . . . . T. n° 267.

‡ Mai-Juin. Fr. Septembre-Octobre.

C. Haies, taillis, bois de l'oolite ferrugineuse.

574) *C. mas.* (*L. Sp.* 171.) Kêrel . . . . . T. n° 266.

‡ Mars-Avril. Fr. Septembre-Octobre.

C. Bois calcaireux, montueux : frontière française, Moselle et Basse-Sûre, Syr.

#### XLV. LORANTHACEAE.

(Juss. et Rich. in *An. Mus.* XII. 292.) [XXII, 4.]

**219. Viscum.** (*Tournf. Inst.* 380.) — Gui. — Mistel.

575) *V. album.* (*L. Sp.* 1651.) Mestel . . . . . T. n° 1408.

‡ Mars-Avril. Fr. Août-Novembre.

AC. Parasite sur les vieux arbres : peupliers, poiriers, pommiers, etc.

#### XLVI. GROSSULARIEAE.

(DC. fl. Fr. IV. 40.)

**220. Ribes.** (*L. Gen.* 281.) — Grosseiller. — Stachelbeere. —  
Johannisbeere. [V, 1.]

576) *R. Grossularia.* (*L. Sp.* 291.) Krêschel. R. *Uva crispa.*

‡ Mars-Avril. Fr. Juin-Juillet. [T. n° 388.

C. Lieux incultes, rochers, murs, décombres, etc.

Var.  $\beta$ . *Uva crispa.* (*L. Sp.* 291) à fruits poilus.

Var.  $\gamma$ . *reclinatum.* (*L. Sp.* 291) à fruits glabres.

Avec l'espèce.

577) *R. rubrum.* (*L. Sp.* 290.) Gehàyskrêschel. Rôdkrêschel.

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Août. [T. n° 388.

AR. Bois, bords des eaux. Mandelbach. ! C. cultivé en plusieurs variétés.

578) *R. alpinum.* (*L. Sp.* 291) . . . . . T. n° 386.

‡ Avril-Mai. Fr. Juillet-Août.

AC. Manque sur de grands espaces. Rochers, bois montueux. Allmünster, EF. ! Bock (Clausen.) Kz. Pulvermühl. BB. Echternach (Brimmeyr père.) Fels Schengen. A. EF. Kz. etc. Cette dernière station prouve qu'il appartient à notre Flore.

Var.  $\alpha$ . sterile. (Wallr. Sched. crit. 109.)

Var.  $\beta$ . bacciferum. (Wallr. Sched. crit. 109.)

579) † R. nigrum. (L. Sp. 291.) Schwarzkreßchel. T. n° 387.

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Août.

C. Cultivé et quelquefois subspontané dans les haies : Miès. (Merseh.) Kz.

#### XLVII. SAXIFRAGEAE.

(Vent. tabl. 3. 277.)

**221. Saxifraga.** (L. Gen. 223.) Saxifrage. Steinbrech. [X, 2.]

580) S. tridactylites. (L. Sp. 578) . . . . . T. n° 623.

① Mars-Mai.

C. Lieux secs, arides, bords des chemins, vieux murs, toits de chaume.

581) S. granulata. (L. Sp. 576) . . . . . T. n° 622.

‡ Mai-Juin.

C. Prés, bois et haies. AR. Ardennes.

582) S. caespitosa. (L. Sp. 578.) <sup>1)</sup> . . . . . Dmtr. P. 993.

‡ Avril-Mai.

R. Fissures des rochers de l'Ardenne. (DC.)

Var.  $\beta$ . S. sponhemica. (Gmel. Fl. Bad. 2. 220. t. 9.) T. n° 624.

‡ Mai-Juin.

C. Rochers schisteux des côtes de la Sûre et de l'Our. Vieux murs, toits de chaume. Vianden. T. BL. !

Var.  $\gamma$ . condensata. (Gmel. Fl. Bad. 2. 226.) Confusa. — R. Sp. 89.

R. avec l'espèce. Rochers de l'Our et de la Sûre.

Var.  $\delta$ . uniflora. (Sternberg rev. p. 13 t. 9.)

R. avec condensata.

583) ? S. hypnoides. (L. Sp. 579) . . . . . Wrtg. F. R. 492.

‡ Juin.

B. Rochers schisteux des côtes de l'Our et près Vianden, de la Sûre près Diekirch. Wrtg. Koch fide Lejeune.

**222. Chrysosplenium.** (L. Gen. 558.) — Dorine. — Milzkraut. [XIII, 2.]

584) Ch. alternifolium. (L. Sp. 568.) Schmalzkraut. T. n° 620.

‡ Avril-Juin.

AC. par place. Lieux frais, humides, marécageux, haies, bois.

1) Ces variétés sont, paraît-il, dûes à la nature du sol, et à l'exposition S. caespitosa et sponhemica se trouvent sur les rochers ombragés à l'exposition Nord. En plein soleil, la plante reste plus trappue, les tiges stériles forment les rosettes bien fournies de S. condensata. (Groenlandica. L. ?)

- 585) *Ch. oppositifolium*. (*L. Sp.* 569) . . . . . T. n° 621.  
 † Avril-Juin.

AR. Ruisseaux, fontaines, rochers humides. Au-dessus de la Neuaühl (Mandelbach). Kz. Bouren au-dessus de Dommeldange. BL.!

SUBDIVISION II. — **Gamopétales ou Monopétales.**

CLASSE I. — **Gamopétales hypogynés.**

XLVIII. ERICINEAE.

(Desv. Journ. bot. 1813, p. 28.)

- 223. Erica.** (*L. Gen.* 192.)—Bruyère. —Glockenheide. [VIII, 1.]

- 586) *E. Tetralix*. (*L. Sp.* 502) . . . . . T. n° 588.  
 † Juin-Septembre.

C. par place dans les bruyères humides et tourbeuses des Ardennes.

- 224. Calluna.** (*Salisb. Lin. Trans.* IV. 317.) Callune. Haide. [VIII, 1.]

- 587) *C. vulgaris*. (*Salisb. l. c.*) Heed . . . . . T. n° 587.  
 † Juillet-Septembre.

C. Terrains siliceux et schisteux, bois, lieux incultes.

La culture des *Andromeda*, *Azalea*, *Rhododendron*, *Kalmia*, *Ledum* et de leurs variétés forme une spécialité très-importante de nos établissements horticoles.

XLIX. PRIMULACEAE.

(Vent. tabl. II, 285.)

Tribu I. — *Primuleae.* (*Dubois. Bot. Gall.* 283.)

- 225. Primula.** (*L. Gen.* 80.) Primevère. Himmelschlüssel. [V, 1.]

- 288) *P. officinalis*. (*Jacq. Misc.* I. 159.) Guckgucksblum.  
 † Mars-Mai. [T. n° 318.]

C. Lieux herbeux, bois.

- 589) *P. elatior*. (*Jacq. Misc.* I. 158.) Guckgucksblum. T. n° 319.  
 † Mars-Mai.

C. Bois frais et humides, prairies tourbeuses.

- 590) † *P. grandiflora*. (*Lam. Fl. Fr.* 248.) Schlesselblum.  
 † Mars-Mai.

C. Cultivé pour ses fleurs jaunes, pourpres, purpurines, roses, lilas, blanches, acanthes ou caulescentes. Souvent spontané. Wurthberg (Clausen.) Kz.

- 591) † *P. auricula*. (*L. Sp.* 205.) Orikelcher.  
 † Avril-Mai.

C. Cultivé et quelquefois échappé des jardins.



**226. *Lysimachia*.** (*L. Gen.* 83 *ex parte*.) — Lysimaque. — Friedlos. [V, 1.]

592) *L. Nummularia*. (*L. Sp.* 211.) Mondkraut. . . T. n° 326.

‡ Juin-Août.

C. Lieux humides, fossés, bords des mares, bois, etc.

593) *L. nemorum*. (*L. Sp.* 211) . . . . . T. n° 325.

‡ Juin-Juillet.

C. Bois humides, bords des ruisseaux ombragés.

594) ? *L. punctata*. (*L. Sp.* 210) . . . . . T. n° 324.

‡ Juillet-Août.

R. Bords des eaux, prés frais. Cultivé. — C. Cimetière d'Elmen. T. Md. ! et dans les baches de plantes de terres de bruyères, où elle doit avoir été introduite avec des plantes provenant de Gand.

595) *L. vulgaris*. (*L. Sp.* 209.) Weiderich . . . T. n° 323.

‡ Juin-Juillet.

C. Bords des eaux, lieux humides, arides, etc.

Tribu II. — Anagallideæ. (*Dubois. l. c.*)

**227. *Centunculus*.** (*L. Gen.* 58.) Centenille. Kleinling. [IV, 1.]

596) *C. minimus*. (*L. Sp.* 169). . . . . T. n° 87.

① Juin-Août.

AC. Champs humides, chemins ombragés, environs de Capellen. T. Diekirch. K.

**228. *Anagallis*.** (*Tournf. Inst.* 59.) Mouron. Gauchheil. [V, 1.]

597) *A. arvensis*. (*L. Sp.* 211.) Gänsekrütchen.

① Juin-October.

Var.  $\alpha$ . *phœnicea*. (*Lmk. Fl. Fr. II.* 215) . . . . T. n° 328.

Var.  $\beta$ . *cœrulea*. (*Schreb. spicil. fl. Lips.* 5. 1774) . . T. n° 327.

Var.  $\gamma$ . *carnea*. (*Schrank, baier. Fl.* 1. 441.)

C. Lieux cultivés, champs.

***Androsace maxima*** (*L. Sp.* 203), indiquée comme faisant partie de notre Flore (*Ed. Math.* 1192) provient d'une interprétation tronquée de Gmelin. Cette plante n'existe pas dans les moissons de la Haute-Moselle.

I. PLUMBAGINEAE.

(*Juss. Gen.* 92.)

**229. *Armeria*.** (*Willd. Hort. Berol.* 333.) — Armérie. — Stein-  
nelke. [V.]

598) † *A. elongata*. (*Hoff. Deutsch. Fl. ed. 2. v. 1.* 150.)

Spüonesch Gràs.

‡ Mai-September.

C. Cultivé et souvent spontané dans le voisinage des habitations.

## LI. PLANTAGINEAE.

(Juss. Gen. 81.)

- 230. Plantago.** (*L. Gen.* 142.) — Plantain. — Wegerich. [IV, 1.]  
 599) *P. major.* (*L. Sp.* 163.) Wèblât . . . . . T. n° 236.  
 ☿ Juin-Octobre.  
 C. Bords des chemins, lieux cultivés, prairies, etc.  
 Var. *β. intermedia.* (*Gilibert. Pl. Europ.* 1. p. 125.)  
 ☿ Juin-Octobre.  
 AC. Champs sablonneux, humides, etc.  
 Var. *γ. minima.* (*DC. fl. Fr.* 3. 418). . . . . T. n° 237.  
 ☿ Juin-Octobre.  
 AR. Lieux siliceux, arides. C. Felzertunnel. BL. !  
 600) *P. media.* (*L. Sp.* 163.) Kätzeschwanz . . . . . T. n° 238.  
 ☿ Mai-Août.  
 C. Prairies, lieux herbeux, bords des chemins,  
 601) *P. lanceolata.* (*L. Sp.* 164). . . . . T. n° 239.  
 ☿ Avril-Octobre.  
 C. Prairies, lieux herbeux, bords des chemins.  
 602) ? *P. arenaria.* (*Wald. et Kit. pl. rar. hung. p.* 51. t. 51.)  
 ① Juillet-Août. [EF. 440.  
 Cette plante des sables du Nord et du Sud a été trouvée en 1863 en grandes quantités près de la gare centrale de Luxembourg par MM. Bockholz, ingénieur à Trèves, et Fr. Fischer jun. de Luxembourg.

## LII. ILICINEAE.

(Brogn. in Ann. sc. nat. sér. 1. X. 329.) [IV, 4]

- 231. Ilex.** (*L. Gen.* 172.) -- Houx. — Stechpalme.  
 603) *I. aquifolium.* (*L. Sp.* 182.) Walddeschtel. . . . . T. n° 271.  
 ☿ Mai-Juin.  
 C. Bois montueux du grès luxembourgeois.  
 Var. *β. senescens.* (*Gaud. Helv.* 4. 462.)  
 AR, avec l'espèce. Bois de Fischbach, de Beaufort, etc.  
 Var. *γ. heterophylla.* (*Rehb. fl. ex.* 433.)  
 AC. avec l'espèce. Bois de Fischbach, Beaufort, Tuntingen, etc.

## LIII. OLEINEAE.

(Hoffm. in Linck. Fl. Port. 1. 385.) [II, 1.]

- 232. Ligustrum.** (*Tournef. Inst.* 367.) — Troëne. — Hartriegel.  
 604) *L. vulgare.* (*L. Sp.* 10.) Schwarze Paafeschengchen.  
 Schwarz Moutz. Kellerholz. . . . . T. n° 5.

‡ Juin-Juillet.

C. Haies, buissons, lisières des bois. R. Ardennes.

**233. Fraxinus.** (*Tournf. Inst.* 343.) — Frêne. — Esche.

605) † *F. excelsior.* (*L. Sp.* 1509.) Esch. . . . T. n° 37.

‡ Avril. Fr. Juillet.

C. Bois un peu humides; planté en avenues.

606) † *F. Ornus.* (*L. Sp.* 1510.)

‡ Avril-Mai.

AR. Cultivé, subsponané dans les environs d'Ansembourg.

**234. Syringa.** (*L. Gen.* 22.) — Lilas. — Flieder.

607) † *S. vulgaris.* (*L. Sp.* 11.) Nélchesblum. . . . T. n° 6.

‡ Mai-Juin.

C. Cultivé, subsponané dans les haies près des habitations. Bellevue, Pétrusse, Pulvermühl, etc. T. ! Ruines du Grewchesberg entre Greisch et Simmern. Kz.

608) † *S. persica.* (*L. Sp.* 12). . . . . EF. 142.

‡ Mai-Juin.

AC. Cultivé, quelquefois subsponané dans le voisinage des habitations.

**LIV. JASMINEAE.**

(Rob. Brown. Prod. fl. nov. holl. p. 520.) [II, 4.]

**235. Jasminum.** (*L. Gen.* 17.) — Jasmin. — Jasmin.

609) † *J. fruticans.* (*L. Sp.* 9) . . . . . EF. 143.

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Juillet.

AC. Cultivé, subsponané dans les rochers au-dessus de Clausen (Wurthsberg).

**LV. APOCYNÆAE.**

(Rob. Brown. Prod. 463.) [V, 4.]

**236. Vinca.** (*L. Gen.* 295.) — Pervenche. — Sinngrün.

610) *V. minor.* (*L. Sp.* 304.) Bierefang. Biereselchen. Bonzel.

‡ Mars-Juin.

C. par place. Bois, haies, broussailles, lieux pierreux. R. Ardennes.

611) † *V. major.* (*L. Sp.* 304). . . . . EF. 143bis.

‡ Mars-Mai.

C. Cultivé et subsponané çà et là dans les haies.

**LVI. ASCLEPIADEAE.**

(R. Brown, in Wern. soc. 1. p. 12.)

**237. Vincetoxicum.** (*Mönch. meth.* 317.) — Dompte-venin. —

Schwalbenwurz. [V, 2.]

612) *V. officinale*. (*M. l. c.*) Houdswièger. *A. vincetoxicum*.  
 5 Juin-Août. [T. n° 396.]

AC. Rochers, coteaux incultes, pierreux. Pulvermühl, Wurthsberg, Bellevue, Moselle, Schönfels, etc. C. Dans les taillis de la commune de Wiltz, Schuttbourg.!

**238. Asclepias.** (*L. Gen.* 120.) — Asclepiade. — Seidenpflanze. [V, 2.]

613) ? *A. syriaca*. (*L. Sp.* 313) . . . . . T. n° 397.  
 4 Juillet-Août.

AR. Cultivé pour ses fleurs. Subspontané à Clausen, Bellevue. (Courtois.) T. Md.!

## LVII. GENTIANEAE.

(*Juss. Gen.* 141.)

Tribu I. — Menyantheae. (*Juss. l. c.*)

**239. Menyanthes.** (*Tournf. Inst.* 15.) — Menyanthe. — Fieberklee. [V, 1.]

614) *M. trifoliata*. (*L. Sp.* 208.) Geesklè. . . . . T. n° 320.  
 4 Avril-Mai.

C. Prairies marécageuses, marais tourbeux, lieux vaseux, bords des eaux, eaux stagnantes, limoneuses.

**240. Limnanthemum.** (*Gmel. in Act. Petrop. an.* 1769. 527.)  
 — Limnanthème. — Seekanne. [V, 1.]

615) *L. nymphoides*. (*Link. Fl. Port.* 1. 344.) Villarsia nymphoides . . . . . T. n° 321.  
 4 Juillet-Septembre.

R. Rivières à courant peu rapide. Moselle (Green), vis-à-vis de Wintrange. EF. A. Kz. Moselle près de Stadtbredimus. EF. A. Entre Ehnen et Ahn. BB.!

Tribu II. — Eugentianeae. (*Juss. l. c.*)

**241. Gentiana.** (*Tournf. Inst.* 40.) Gentiane. Enzian. [V, 2.]

616) *G. cruciata*. (*L. Sp.* 334) . . . . . T. n° 398.  
 4 Juillet-Août.

AR. Prés secs et montueux, clairières et lisières des bois herbeux, coteaux pierreux. Fels (Schengen.)! Reif (Wellenstein). Friedbüsch, Diekirch (Courtois). Echternach (Brimmeyr père). Diekirch. Md. K. Dudelange. Bereldange. Kz. etc.

617) *G. Pneumonanthe*. (*L. Sp.* 330) . . . . . T. n° 399.  
 4 Juillet-October.

R. Tourbières, marais, bruyères humides, pâturages, prairies spongieuses, par place. T. et Wgt.

618) *G. campestris*. (*L. Sp.* 334) . . . . . T. n° 402.

① Août-Septembre.

R. Bois, pâturages, coleaux arides. Blaschette. T.

619) *G. germanica*. (*Wallr. Sp.* I. 1346) . . . . . T. n° 401

④ Août-Octobre.

AR. par place. Lieux arides, collines sèches, lisière des bois. Marienthal. A. EF. Kz. Föls. Mertert. R. Reif (Wellenstein.) Kz. Helperich. Kz. Dietzeberg. Kz.

620) ? *G. Amarølla*. (*L. Sp.* 334.)

④ Août-Octobre.

R. Pelouses, prairies, pâturages, lisières des bois. Fels. K.

621) *G. ciliata*. (*L. Sp.* 334) . . . . . T. n° 403.

② ou ④ Juillet-Septembre.

AR. Pelouses sèches, bois montueux, calcaireux. Ernster (Tuntingen.) DW. Zuschlag (Rumclange.) Kz. Marienthal. A. EF. Kz. Reif (Wellenstein.) Kz.

622) ? *G. acaulis*. (*L. Sp.* 330) . . . . . T. n° 400.

② ou ④ Juillet-Août.

A été trouvée en 1824 sur les côtes de la Sûre entre Echternach et Grundhof par Tinant. Cette belle plante n'existe plus à la station citée, ni à celles de la Basse-Moselle, où elle avait été trouvée par différents collecteurs.

**242. Cicendia.** (*Adans. Fam.* II. 503 *ex parte.*) — Cicendie. — Bitterblatt.

623) *C. filiformis*. (*Delarbre. Fl. Auvergne.* I. 29.) *Exacum filiforme*. . . . . T. n° 243.

① Juin-Octobre.

R. Lieux humides, siliceux, chemins des bois inondés l'hiver. Marienthal, Simmern. T. Gilsdorf. K.

**243. Erythraea.** (*Rehb. ap. Pers. Sys. pl.* I. 283.) — Erythrac. — Tausendguldenkraut. [V, 1.]

624) *E. Centaurium*. (*Pers. l. c.*) Dausendguldekraut. Chironia.

① ou ② Juillet-Septembre. [T. n° 349.

C. Bois, pâturages, bruyères, pelouses des terres argileuses.

625) *E. pulchella*. (*Fries. nov. Succ.* II. 31.) *Ch. pulchella*.

① ou ② Juillet-Septembre. [T. n° 350.

AC. Champs humides, lieux inondés l'hiver, prairies, etc.

Var. *β*. *Gerardii*. (*Schmidt. bot.* I. 131.) *Ramosissima*. T. n° 350b. Avec l'espèce.

**244. Polemonium.** (*L. Gen.* 217.) — Polemoine. — Himmelsleiter. [V, 1.]

626) † *P. cœruleum*. (*L. Sp.* 162.) Jacobsstäf.

‡ Juin-Juillet.

C. Cultivé et quelquefois naturalisé près des habitations.

### LVIII. CONVULVACEAE.

(*Juss. Gen.* p. 132 ex parte.)

**245. *Convolvulus*.** (*L. Gen.* 215.) — Liseron. — Winde. [V, 1.]

627) *C. arvensis*. (*L. Sp.* 218.) Wann. Frong . . . T. n° 330.

‡ Mars-Septembre.

C. Champs et moissons. AR. Ardennes.

628) *C. Sepium*. (*L. Sp.* 218.) Heckewann . . . T. n° 331.

② Juin-Septembre.

C. Haies, buissons, oseraies. AR. Ardennes.

### LVIV. CUSCUTEAE.

(*J. S. Presl. Fl. Cech.* 1. 247.)

**246. *Cuscuta*.** (*Tournf. Inst. t.* 422.) Cuscute. Seide. [V, 1.]

629) *C. suaveolens*. (*Seringe.*). . . . . EF. 145.

① Août-Septembre.

R. Parasite sur la luzerne. Talus du chemin de fer entre Bivange et Beltembourg, 1859. Kz. Luzernière à Rodenhof, EF., à Sæul, Kz. 1864. Geigeberg (Walferdange), 1870. BL. !

630) *C. Epilinum*. (*Weihe in Arch. Apoth. VIII.* 51.) T. n° 406.

① Juillet-Août.

R. Parasite sur le lin, au-dessus d'Ellange (Mondorf), 1872. A. EF. Kz.

631) *C. major*. (*C. Bauh. Pin.* 219). . . . . T. n° 404.

① Juin-Août.

AC. Parasite sur féverole, vesce, ortie, chanvre. Mersch, 1869. Kz. Hundhaus (Luxembourg), 1871. Reckingerhof. A. EF. Kz. 1872.

632) *C. Epithymum*. (*Murray in L. sys. veg. ed.* 13. 167.) *C. minor*.

① Juillet-Août.

[T. n° 405.]

C. Sur le *Thymus serpyllum*, *Calluna vulgaris*, *Trifolium pratense*, etc. Pfefferbüsch, 1871. BL.

Var.  $\beta$ . *Trifolii*. (*Babingt. et Gibs. in Phyt. I.* 467.)

AR. Champ de trèfle et de luzerne.

### LX. BORAGINEAE.

(*Juss. Gen.* 128 ex parte.) [V, 1.]

Tribu I. — *Anchusæ*. (*Juss. l. c.*)

**247. *Borago*.** (*Tournf. Inst.* 53.) — Bourache. — Boretsch.

633) † *B. officinalis*. (*L. Sp.* 197.) Bourage . . . T. n° 314.  
 ① Juin-Octobre.

C. Cultivé et très-souvent subspontané près des habitations.

**248. *Achusa*.** (*L. Gen.* 182 *ex parte*.)

634) *A. officinalis*. (*L. Sp.* 191) . . . . . T. n° 308.  
 ② ou 4 Juin.

R. Prés, bords des chemins, dans les vallées latérales de la Moselle. Wintrange. T.

**249. *Lycopsis*.** (*L. Gen.* 190.) — Lycopside. — Krumhals.

635) *L. arvensis*. (*L. Sp.* 100.) Kaatzenaa . . . T. n° 316.  
 ① Juin-Octobre.

C. Moissons, lieux incultes, sablonneux.

**250. *Symphytum*.** (*Tournf. Inst.* 56.) — Consoude. — Wallwurz.

636) *S. officinale*. (*L. Sp.* 195.) Heelwurz . . . T. n° 313.  
 4 Mai-Juin.

C. Prairies humides, bords des eaux, fossés.

Var.  $\beta$ . *patens*. (*Sibth. oxon. p.* 70) . . . . . T. n° 313b.

R. Prairies humides. Blesmühle. K.

**251. *Myosotis*.** (*L. Gen.* 180.) — Myosotis. — Vergissmeinnicht.

§ 1. — *Paludosæ*.

637) *M. palustris*. (*Withering, arrang. of Brit. II.* 225.) T. n° 303.  
 4 Mai-Août.

C. Bords des eaux, fossés, prairies humides.

Var.  $\beta$ . *repens*. (*Rehb. apud Sturm, Fl. D. t.* 42). . . T. n° 301.

Var.  $\gamma$ . *multiflore*. (*Mérat. in DC. Prod.* 10. 107.)

Var.  $\delta$ . *laxiflora*. (*Reich. l. c.*)

C. Avec l'espèce.

638) *M. strigulosa*. (*Rehb. Fl. Germ. excurs.* 342.) T. n° 302.

② Mai-Juillet.

C. Lieux desséchés, fossés.

639) *M. cæspitosa*. (*Schultz. Fl. Starg. supp.* 11) . T. n° 299.

② Mai-Août.

C. Lieux marécageux, marais tourbeux, bords des eaux.

§ 2. — *Silvaticæ*.

640) *M. silvatica*. (*Hoff. Deutsch. Fl. ed. 2. p.* 85.) T. n° 300.

② Mai-Juillet.

C. Bois humides, buissons, bords des eaux.

641) *M. intermedia*. (*Lnk. Enum. hort. Berol. I. 164.*) T. n° 295.

① ou ②. Mai-Septembre.

C. Champs, lieux incultes, bords des chemins, bois, haies, buissons.

642) *M. hispida*. (*Schlecht. in Mag. Naturf. Berl. VIII. 229.*)

*S. collina* . . . . . T. n° 296.

① ou ② Mai-Juin.

AC. Lieux incultes, arides, bords des chemins.

643) *M. versicolor*. (*Pers. Syn. I. 156*) . . . . . T. n° 297.

① ou ② Mai-Juin.

AC. Champs sablonneux, moissons, lieux secs, graviers des rivières, pelouses.

644) *M. stricta*. (*Lnk. Enum. hort. Berol. I. 164 ex parte.*)

*Arvensis* . . . . . T. n° 293.

① ou ② Mai-Juin.

C. Lieux sablonneux, pierreux, coteaux arides, bords des chemins.

645) ? *M. sparsiflora*. (*Pohl. in Hope Taschenb. 1807. 123.*)

① Mai-Juin. [T. n° 298.

R. Bois humides, ombragés. Haidgen (Helmsange). T.

**252. Lithospermum.** (*Tournef. Inst. 55.*) — Grémil. — Schminke.

646) *L. officinale*. (*L. Sp. 889.*) Steekraut . . . . . T. n° 305.

¼ Mai-Juillet.

AC. Ça et là. Endroits pierreux, calcaireux, bois, broussailles: Bellevue, Grünenwald, Helmdange, Schrassig, Ansembourg. T. Moselle. Wgt. Pr. 85.

647) *S. purpureo-cœruleum*. (*L. Sp. 190*) . . . . . T. n° 307.

¼ Mai-Août.

AR. Clairières des bois montueux de la Sûre et de la Moselle. Bettendorf. BL! Beaufort (Courtois). Echternach (Brimmeyr père). Berbourg. T. Wecker-Manternach. R. Fœls (Schengen). BB. EF. A. Kz.

648) *L. arvense*. (*L. Sp. 190*) . . . . . T. n° 306.

① ou ② Mai-Août.

C. Moissons, lieux cultivés, bords des chemins. R. Ardennes.

**253. Pulmonaria.** (*Tournef. Inst. 55.*) Pulmonaire. Schlüssel.

649) *P. officinalis*. (*L. Sp. 194.*) Longekraut . . . . . T. n° 310.

¼ Avril-Mai.

AC. Bois ombragés, bords des ruisseaux, par place, manque sur de larges espaces.

Var.  $\beta$ . *obscura*. (*Dmtr. in Bull. bot. Belg. IV. 341.*) BB. 393.

Avec l'espèce. Bois de Wintrange. BB.!



650) *P. angustifolia*. (*L. Sp.* 194 *ex parte.*) . . . T. n° 311.  
 4 Juin-Août.

AC. par place. Terrains boisés, humides. Calcaire de l'Attert.

651) *P. mollis*. (*Wolf. in Lehm. Asperifol.* 276) . . . T. n° 312.  
 4 Avril-Mai.

R. Bois frais de l'Ardenne. Wiltz, Esch s/S. F.

**254. *Echium*.** (*L. Gen.* 170.) — Viperine. — Natterkopf.

652) *E. vulgare*. (*L. Sp.* 200.) Schwengsschness. T. n° 317.  
 ② Juin-Septembre.

C. Décombres, vieux murs, bords des chemins, lieux incultes.

Trihu II. — *Cynoglossæ*. (*Juss. l. c.*)

**255. *Echinospermum*.** (*Swartz. in Lehm. Asperifol.* 113.) —  
 Echinosperme. — Igelsame.

653) *E. Lappula*. (*Lehm. Asper.* 121) . . . . . T. n° 304.  
 ① ou ② Juin-Juillet.

R. Murs, toits, lieux pierreux, bords des chemins.

**256. *Cynoglossum*,** (*L. Gen.* 183.)—Cynoglosse.—Hundsauge.

654) *C. officinale*. (*L. Sp.* 192.) Schöfszong . . . T. n° 309.  
 ② Mai-Juillet.

AC. par place. Lieux incultes, coteaux arides, bords des chemins.

**257. *Omphalodes*.** (*Tournf. Inst.* 58.) — Omphalode. —  
 Gedenkemein.

655) † *O. verna*. (*Mönch. meth.* 420) . . . . . EF. 149.  
 4 Avril-Mai.

C. Cultivé dans les jardins, souvent spontané dans leur voisinage, Limpertsberg, Bellevue, etc.

**258. *Asperugo*.** (*Tournf. Inst.* 54.) — Rapette. — Scharfkraut.

656) ? *A. procumbens*. (*L. Sp.* 193) . . . . . T. n° 315.  
 ① Mai-Juillet.

R. Lieux pierreux, décombres. Basse-Pétrusse. T. DW.

**259. *Heliotropium*.** (*L. Gen.* 179.) Hélio trope. Sonnenwende.

657) *H. europæum*. (*L. Sp.* 187) . . . . . T. n° 293.  
 ① Juin-Août.

AC. Champs pierreux, arides, vignes, décombres entre Schengen et Remich. Md. T. Föls. Kz.

## LXI. SOLANEAE.

(Juss. Gen. 124) [V, 1.]

Tribu I. — Eusolanæ.

**260. Solanum.** (*Tournf. Inst.* 62.) — Morelle. — Nachtschatten.

658) *S. Dulcamara.* (*L. Sp.* 264.) Noischett. Porgeerk. T. n° 344.  
 † Juin-Septembre.

C. Haies, bords des eaux, bois humides.

659) *S. nigrum.* (*L. Sp.* 266). . . . . T. n° 345.

① Juin-Octobre.

Var. *α. nigrum.* (*Sm. Engl. Bot.* I. 566.)

AR. Autre part qu'en Ardennes.

Var. *β. ochroleucum.* (*Bast. in Journ. bot.* 1814, III. 20.)

C. Lieux cultivés, haies, bords des chemins, décombres.

Var. *γ. humile.* (*C. Bernh. ap. Willd. Hort. Berol.* I. 256.)

C. Avec l'espèce.

Var. *δ. miniatum.* (*Bernh. l. c.* 256.)

AR. Avec l'espèce.

Var. *ε. villosum.* (*Lmk. Encycl. méth.* IV. 289) . . . T. n° 346.

C. Avec l'espèce. Moselle. T.

660) *S. tuberosum.* (*L. Sp.* 265.) Krombier . . . T. n° 347.

‡ Juin-Septembre.

C. Cultivé, souvent spontané.

**261. Capsicum.** (*L. Sp.* 269.) — Piment. — Beisbeere.

661) † *C. annum.* Spüonesche Pfeffer.

① Juin. Fr. Septembre.

Cultivé comme condiment.

**262. Lycopersicum.** (*Tournf. Inst.* 69.) Tomate. Liebesapfel.

662) † *L. esculentum.* Pomme d'amour.

① Juin. Fr. Septembre.

Cultivé comme condiment.

**263. Physalis.** (*L. Gen.* 250.) — Coqueret. — Judenkirsche.

663) *P. Alkekengi.* (*L. Sp.* 262) . . . . . T. n° 343.

‡ Juin-Septembre. Fr. Octobre-Novembre.

AC. Vignes, lieux cultivés, haies entre Remich et Stadtbredimus. F. Wtg. BB.!

**264. Atropa.** (*L. Gen.* 249 *ex parte.*) — Belladone. — Tollkirsche.

664) **A. Belladonna.** (*L. Sp.* 260.) Judekisch. . . . T. n° 342.  
 † Juin-Août.

C. par place. Bois montueux nouvellement exploités, carrières, rochers ombragés. R. Ardennes, entre la Toutschen- et la Merkolzermühle, Esch s/S.

**265. Lycium.** (*L. Gen.* 262.) — Lyciet. — Bocksdorn.

665) † **L. barbarum.** (*L. Sp.* 277) . . . . . T. n° 348.  
 † Juin-Septembre.

Cultivé, quelquefois naturalisé dans les haies. Eich. T. Limpertsberg. EF. Mersch. Kz. etc.

#### Tribu II. — Nicotianea.

**266. Nicotiana.** (*Tournf. Inst.* 41.) — Tabac. — Tabak.

666) † **N. rustica.** (*L. Sp.* 238.) Toubak . . . . . T. n° 334.  
 ① Juillet-Octobre.

Quelquefois cultivé. R. Subspontané dans le voisinage des habitations. Clausen (Jardin Mansfeld) Kz.

**267. Datura.** (*L. Gen.* 246.) — Datura. — Stechapfel.

667) **D. Stramonium.** (*L. Sp.* 255.) Daarâpel . . . . T. n° 332.  
 ① Juillet-Septembre.

C. par place. Lieux incultes, pierreux, aux environs des habitations, des vieux châteaux. Wiltz, Ansembourg, Schuttbourg, Kautenbach, Lintgen, Schreissig, etc.

**268. Hyoscyamus.** (*Tournf. Inst.* 42.) Jusquiame. Bilsenkraut.

668) **H. niger.** (*L. Sp.* 237.) Zennsémchen . . . . T. n° 333.  
 ① ou ② Mai-Juillet.

AC. par place. Lieux incultes et pierreux, décombres, voisinage des habitations et des vieux châteaux. Schuttbourg, Wiltz, Vianden, Mersch, Kz. Beaufort, EF. Kz. Ansembourg. DW. Fischbach, fossés devant la Porte-Neuve. BL.!

#### LXII. VERBASCEAE.

(Bartling. Ord. nat. p. 170.) [V, 1.]

**269. Verbascum.** (*Tournf. Inst.* 61.) — Molène. — Wollkraut.

Sect. I. — Thapsus. (*Dmir. Hulth. p.* 11.)

669) **V. Thapsus.** (*L. Sp.* 252.) Dausendblum. Wollkraut.  
 Tâkelblum. Wullich . . . . . T. n° 335.

② Juin-Août.

C. Lieux incultes, bords des chemins, champs en friche. R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . Schraderi. (*G. Meyer. Chlor. hanov.* 326.) Lühr. 880.

R. Avec l'espèce.

670) *V. thapsiforme*. (*Schrad. Monogr. I. 21*) . . . T. n° 336.

② Juin-Août.

C. Lieux incultes, pierreux, en friche, bords des chemins. R. Ardennes.

671) *V. phlomoides*. (*L. Sp. 253*) . . . . . T. n° 338.

② Juin-Août.

R. Lieux sablonneux, bords des chemins, manque sur de grands espaces. Au-dessus de Dommeldange. T.

672) *V. montanum*. (*Schrad. Hort. Gætt. Fasc. II. 18. t. 2.*)

*Crassifolium* . . . . . T. n° 337.

② Juin-Juillet.

R. Lieux sablonneux et secs aux environs de Greisch. T. Beaufort.

Sect. II. — *Lychnites*. (*Benth. DC. Prod. X. 230.*)

673) *V. pulverulentum*. (*Vill. Fl. Dauph. II. 490.*) T. n° 340.

② Juin-Août.

AC. Lieux secs, incultes, champs sablonneux ou pierreux sur la Moselle, entre autres aux environs de Remich, Elnen, BB. ! Grevenmacher. T.

674) *V. floccosum*. (*Wald. et Kit. pl. rar. hung. 1 p. 81. 71.*)

② Juillet-Août.

R. Collines arides, chemins. Schengen. BB.

675) *V. Lychnitis*. (*L. Sp. 253*). . . . . T. n° 339.

② Juin-Août.

C. Coteaux arides, lieux incultes, bords des routes et des chemins.

Var.  $\beta$ . *album*. (*Mönch. meth. p. 447.*)

R. Avec l'espèce.

676) *V. nigrum*. (*L. Sp. 253*). . . . . T. n° 341.

② Juin-Août.

C. Bois sablonneux, lieux incultes, pierreux, bords des chemins. AC. Ardennes.

677) *V. nigro-floccosum*. (*Schottianum. Schrad. l. c. 13.*)

② Juillet-Août.

R. Coteaux incultes en amont d'Echternach vers la Weilerbach. R.

### LXIII. SCROPHULARINEAE.

(R. Brown. Prod. 433)

**270. Veronica.** (*Tournf. Inst. 60.*) — Véronique. — Ehrenpreis. [II, 1.]

Sect. I. — *Chamaedrys*. (*Koch, syn. ed. 2. 603.*)

678) *V. scutellata*. (*L. Sp. 16*) . . . . . T. n° 11.

4 Mai-Septembre.

R. Lieux marécageux, humides : Blaschette, Kockelscheuer. T. Gasperich. BL. ! Bords des étangs. Pieitrange. BL.

679) *V. Anagallis*. (*L. Sp.* 16) . . . . . T. n° 10.  
 24 Mai-Septembre.

C. Fossés, ruisseaux, bords des eaux, lieux marécageux R. Ardennes.

680) *V. Beccabunga*. (*L. Sp.* 16.) Wele Burekascht. T. n° 9.  
 24 Mai-Septembre.

C. Ruisseaux, fossés, bords des eaux, lieux marécageux.

Var.  $\beta$ . *limosa*. (*Lej. R. Fl. Spa. p.* 2.) *V. limosa*.

AC. Avec l'espèce.

681) *V. Chamædryas*. (*L. Sp.* 17) . . . . . T. n° 15  
 24 Avril-Juin.

C. Bois, haies, bords des chemins, prairies.

682) *V. montana*. (*L. Sp.* 17) . . . . . T. n° 14.  
 24 Juin-Juillet.

AR. Bois frais, humides, Rodenbüsch (Kopstal). Grünenwald. Schönfels. Md.

T. Beaufort. (Courtois.) Ilse.

683) *V. officinalis*. (*L. Sp.* 14.) Ehrenpreis. . . . . T. n° 7.  
 24 Mai-Juillet.

C. Bois secs, pâturages, bords des chemins.

Var.  $\beta$ . *Spadana*. (*Lej. Fl. de Spa. I.* 22) . . . . . T. n° 8.  
 R. Grünenwald. T.

684) *V. prostrata*. (*L. Sp.* 17). . . . . T. n° 13.  
 24 Mai-Juillet.

R. Coteaux arides en plein soleil. Schengen. Stadtbredimus. T. Mertert. R.

685) *V. Teuerium*. (*L. Sp.* 16.) *V. latifolia* . . . . . T. n° 12.  
 24 Avril-Juillet.

AC. par place. Coteaux exposés au midi, pâturages, bords des bois, etc. Pulfermühl, Hollerich, Dommeldange T. Remich, Wintrange, BB. Machthum. EF. Kz.

Sect. II. — Veronicastrum. (*Koch, l. c.* 608.)

686) *V. serpyllifolia*. (*L. Sp.* 15). . . . . T. n° 16.  
 24 Avril-Septembre.

C. Pelouses humides, bords des allées et des bois humides.

687) ? *V. peregrina*. (*L. Sp.* 20.)

① Mai-Juin.

R. Lieux cultivés. Haies. 1872. EF. Kz.

688) *V. acinifolia*. (*L. Sp.* 19). . . . . T. n° 17.

① Avril-Mai.

AR. Champs cultivés, un peu humides.

689) *V. arvensis*. (*L. Sp.* 18) . . . . . T. n° 19.

① ou ② Mars-Octobre.

C. Champs sablonneux, lieux cultivés, bords des chemins. R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *polyanthos*. (*Thuill. Fl. Par.* 9) . . . . . T. n° 20.

AC. avec le précédent. Clausen, Dommeldange, Fischbach. T.

690) *V. verna*. (*J. Sp.* 19) . . . . . T. n° 23.

① ou ② Avril-Mai.

AC. par place. Champs sablonneux, bords des chemins Brouch. Kz Hauteur entre le moulin d'Eppeldorf et Beaufort. K. Plankenhof. Kz. Fischbach, Blaschette, Kopstal, Ansembourg. T.

691) *V. triphyllos*. (*L. Sp.* 19) . . . . . T. n° 22.

① ou ② Avril-Juin.

AR. Champs secs, sablonneux, manque sur de très-grands espaces.

692) *V. præcox*. (*Allioni. Auct.* 51. t. 1. f. 1) . . . . . T. n° 24.

① Avril-Mai.

R. Coteaux pierreux, champs sablonneux. Neudorf, Bellevue. T.

Sect. III. — *Alsinoïdes*. (*Koch, l. c.* 610.)

693) *V. agrestis*. (*L. Sp.* 18) . . . . . T. n° 18.

① ou ② Mars-Octobre.

C. Lieux cultivés, champs, vignes, haies. R. Ardennes.

694) *V. polita*. (*Fries. nov. succ. ed.* 2. p. 1) . . . . . T. n° 26.

① ou ② Mars-Mai.

AC. Lieux cultivés, sablonneux.

695) *V. opaca*. (*Fries. nov. succ. ed.* 2. p. 3) . . . . . Löhr. 933.

① ou ② Mars-Mai. Automne.

R. Lieux cultivés Grevenmacher, Echternach. L.

696) ? *V. Buxbaumii*. (*Ten. fl. Neap.* 1. p. 7.)

① Avril-Mai.

R. par place Moissons, environs de Luxembourg T. in litt.

697) *V. hederæfolia*. (*L. Sp.* 19) . . . . . T. n° 21.

① ou ② Mars-Juin et Automne.

C. Lieux cultivés, moissons, le long des haies. R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *Lappago*. (*Schrank. Baier. Fl.* 1. 218.)

AR. Avec l'espèce.

**271. *Limosella***. (*L. Gen.* 776.) Limoselle. Schlämpling. [XIV, 2.]

698) *L. aquatica*. (*L. Sp.* 881) . . . . . T. n° 941.

4 Juin-Septembre.

R. Bords sablonneux des eaux, lieux humides. Grünenwald. T. Capellen, Remerschen T. Remich. BB.

**272. Scrophularia.** (*Tournf. Inst.* 74.) — Scrofulaire. — Braunwurz. [XIV, 2.]

699) *S. nodosa.* (*L. Sp.* 863.) Gurgel . . . . . T. n° 942.

‡ Juin-Août.

C. Lieux frais, bords des fossés, bois humides.

Var.  $\beta$ . *umbrosa.* (*Dmtr. Prod.* 37.) *alata.* (*Acherson Fl. Brand.*)  
[T. n° 942b.]

AR. Haies humides près d'Eisembourg. T.

700) *S. Erharti.* (*C. A. Stefen. conf. Babington, Manual of Britsch bot.* 218.) *S. aquatica* (*Koch.*) . . . . . T. n° 944.

‡ Juin-Juillet.

AR. Bords des ruisseaux, fossés.

701) *S. Neesii.* (*Wrtg. Verhandlungen des naturhistorischen Vereins, p.* 29, 1844.)

‡ Juin-Septembre.

R. Bords des rivières et des ruisseaux avec la précédente. Cette espèce a été créée sur des exemplaires récoltés près d'Echternach.

702) *S. aquatica.* (*L. Sp.* 864.) *Balbisii.* (*Horn.*) *Betonicefolia.* (*DC.*)

‡ Juin-Août.

[T. n° 943.]

C. par place. Fossés aquatiques, bords des rivières et des eaux. Blaschette, Schengen. T. Entre Grevenmacher et Mertert R.

703) ? *S. vernalis.* (*L. Sp.* 864.) . . . . . T. n° 945.

① Mai-Juillet.

R. et très-fugace. Lieux incultes, ombragés, pierreux, buissons, vieilles murailles. Zolverknapp. T.

**273. Gratiola.** (*L. Gen.* 29.) — Gratiolle. — Gnadenkraut. [II, 1.]

704) *G. officinalis.* (*L. Sp.* 24) . . . . . T. n° 27.

‡ Juin-Septembre.

AR. Prairies humides, bords des ruisseaux, lieux marécageux, entre Mertert et Grevenmacher. R.

**274. Digitalis.** (*Tournf. Inst.* 73.) Digitale. Fingerhut. [XIV, 2.]

705) *D. purpurea.* (*L. Sp.* 866.) Fangerhutt . . . . . T. n° 946.

② ou ‡ Juin-Août.

C. Bois montueux, essarts, jachères, coteaux arides de l'Ardenne. R. ailleurs. Bois entre Kœrich et Septfontaines. (1867.) DW. Hollenfels (1839.) Kz.

1) *Paulownia imperialis.* (*Sieb. et Zucc.*) Introduit en 1842 dans nos cultures. Château de Berg, exempl. de 1,40 m de tour.

706) *D. lutea*. (*L. Sp.* 867.) *D. parviflora*. (*DC.*) . T. n° 949.  
 2 Juin-Juillet.

AR. Bois montueux, humides des Ardennes, de Wiltz à Clervaux, d'Esch s/S. à Heiderscheid, Stolzembourg, Aلسcheid, Neunhausen, Krischelheid, Folschette. etc.

707) *D. purpureo-lutea*. (*Mey. Chlor. Hanov.* 324.) *D. purpurascens*. (*Roth.*) *Libertiana*. (*Dmtr.*) . . . T. n° 947.

② ou 2 Juin-Août.

AC. Toujours au milieu des parents.

708) *D. ambigua*. (*Murr. Prod. fl. Gaët. p.* 62.) *Grandiflora*. (*Lmk.*) . . . . . T. n° 948.

2 Juin-Août.

R. Bois montueux, rochers, avec *D. lutea*.

709) *D. ambiguo-lutea*. (*Mey. Chlor. Hanov.* 325.)

2 Juin-Juillet.

R. Au milieu des parents.

**275. Anthirrhinum.** (*Juss. Gen.* 120.) — Muflier. — Löwenmaul. [XIV, 2.]

710) *A. Orontium*. (*L. Sp.* 860) . . . . . T. n° 940.

① Juin-Septembre.

C. Champs, moissons, bords des chemins. R. Ardennes.

711) † *A. majus*. (*L. Sp.* 859.) Lèwemaul . . . . T. n° 939.

2 Juin-Septembre.

C. Cultivé, quelquefois subspontané. Vieux murs, Clausen, Fort Olizy. Kz. Ansembourg. A. EF. Kz.

**276. Linaria.** (*Mill. Dic.* 17.) *Linaria*. *Frauenflachs*. [XIV, 2.]

712) *L. vulgaris*. (*Mönch. meth.* 524.) Taakekraut. T. n° 937.

2 Juillet-Septembre.

C. Lieux sablonneux, stériles, bords des chemins, haies.

713) *L. minor*. (*Desf. Atl.* 2. p. 46). . . . . T. n° 936.

① Juillet-Octobre.

C. Lieux cultivés, moissons. R. Ardennes.

714) *L. arvensis*. (*Desf. Atl.* 2. p. 45) . . . . . T. n° 934.

① Juin-Septembre.

AR. Champs, moissons. Stolzembourg, Diekirch, Erpeldange, Dudelange. T.

715) ? *L. simplex*. (*DC. Fl. Fr.* 3. 588). . . . . EF. 163.

① Juillet-Août.

R. Champs, moissons.

716) *L. striata*. (*DC. Fl. Fr.* 3. 586.) *L. repens*. (*Desf.*) T. n° 938.



2 Juillet-Août.

R. Lieux stériles, collines calcaires aux environs de Diekirch, Useldange, T.  
717) *L. Cymbalaria.* (*Mill. Dic.* 17). . . . . T. n° 931.

2 Juin-Septembre. Mauerséchen. Leiskrëttchen.

C. Vieux mars aux environs de Luxembourg. R. ailleurs.

718) *L. Elatine.* (*Desf. Atl.* 2. 37) . . . . . T. n° 932.

① Juillet-October.

C. Champs cultivés, argileux, calcaires.

719) *L. spuria.* (*Mill. Dic.* 15) . . . . . T. n° 933.

① Juillet-Août.

AG. Moissons, champs cultivés.

**277. Pedicularis.** (*Tournf. Inst.* 77.) — Pediculaire. —  
Moorkönig. [XIV, 2.]

720) *P. palustris.* (*L. Sp.* 845.) Leiskraut . . . . . T. n° 929.

② ou 2 Mai-Août.

AG. par place. Près marécageux, bois humides, tourbières. C. Ardennes.

721) *P. silvatica.* (*L. Sp.* 845) . . . . . T. n° 930.

① Juin-Août.

C. Bois, pelouses, prés montueux, humides de l'Ardenne. R. ailleurs.

**278. Rhinanthus.** (*L. Gen.* 740 *ex parte.*) — Rhinante. —  
Klappertopf. [XIV, 2.]

722) *R. major.* (*Ehrh. Beit.* VI. 144.) Kaasel. (*R. Crista-Galli.*  
*L. var. γ.*) . . . . . T. n° 923.

① Mai-Juillet.

AG. Prairies humides, lisières des bois.

723) *R. minor.* (*Ehrh. Beit.* VI. 144.) (*Crista-Galli. L. v. β.*)

① Mai-Juin. [T. n° 924.]

AG. Prairies, bois.

724) *R. Alectorolophus.* (*Pollich. palat.* 2. 177). . . . . T. n° 925.

① Mai-Juillet.

AR. Moissons, champs cultivés.

725) *R. angustifolius.* (*Gmel. Fl. Bad.* 2. 669) . . . . . L. 926.

① Juillet-Septembre.

R. Coteaux secs et pierreux en aval d'Echternach L.

**279. Melampyrum.** (*Tournf. Inst.* 78.) — Melampyre. —  
Wachtelweizen. [XIV, 2.]

726) *M. cristatum.* (*L. Sp.* 842) . . . . . T. n° 927.

## ① Juin-Août.

C. par place. Clairières des bois, coteaux incultes. Fentange. EF. Bivange. Røser. Kz. Grünenwald. T. Greiveldange, Machthum BB. Wasserbillig. R. Grevenmaecher. Kz.

727) *M. arvense*. (*L. Sp.* 842.) Kohwees . . . . T. n° 928.

## ① Juin-Août.

C. Moissons, champs en friche des terres fortes.

Var.  $\beta$ . *barbatum*. (*Waldst. et Kit. Pl. rar. Hung.* 80.)

R. avec l'espèce.

728) *M. pratense*. (*L. Sp.* 843) . . . . T. n° 928

## ① Juin-Août.

C. Bois, taillis, près tourbeux.

**280. Euphrasia.** (*L. Gen.* 741 *ex parte*.) — Euphrasie. — Augentrost. [XIV, 2.]

729) *E. officinalis*. (*L. Sp.* 241) . . . . T. n° 920.

## ① Juillet-October.

C. Prairies, pelouses, clairières herbeuses des bois.

730) *E. nemorosa*. (*Soy.-Will. Mém. de l'Acad. de Nancy.* 1833. 4. 27). . . . T. n° 921.

## ① Juillet-October.

C. Prés, pâturages, bords des bois, bruyères.

**281. Odontites.** (*Haller. Helv.* 304.) Odondité. Augentrost.

731) *O. rubra*. (*L. Sp.* 841.) *E. odontites*. . . . T. n° 922.

## ① Juin-Juillet.

C. Moissons, lieux cultivés, pelouses humides. R Ardennes.

732) *O. serotina*. (*Lmk. fl. F. éd. 2. 3.* 350). . . . T. n° 923.

## ① Juillet-October.

C. Moissons, lieux herbeux, bords des chemins R Ardennes.

733) *O. lutea*. (*L. Sp.* 842) . . . . Gke. Fl. D. n° 1326.

## ① Juillet.

R. Coteaux incultes, pelouses montueuses. Moselle. Gke.

## LXIV. LENTIBULARIEAE.

(Rich. in Poiteau et Turp. Flor. Par. 26.) [11, 1.]

**282. Utricularia.** (*L. Gen.* 31.) Utriculaire. Wasserschlauch.

734) *U. vulgaris*. (*L. Sp.* 26) . . . . T. n° 28.

## 4 Juin-Août.

R. Mares, fosses, étangs, flaques d'eaux des tourbières. Taillis d'Erpeldange, au-dessus de Bleesmühl, K. Fischbach, Kockelscheuer, Buret. T.



743) *O. minor*. (*Sutt. in Trans. Soc. Linn. IV. 178.*)

① Juin-Juillet.

R. Parasite sur *Trifolium pratense* et *Poterium Sanguisorba*. Lieux pierreux, coteaux arides, champs incultes. Weilerbach (Mersch). Kz.

**285. Lathraea.** (*L. Gen. 743.*) Lathree. Schuppenwurz. [XIV, 2.]

744) *L. squamaria*. (*L. Sp. 848*) . . . . . T. n° 919.

‡ Mars-Mai.

Parasite sur les racines de plusieurs espèces d'arbres et d'arbrisseaux, notamment sur celles de *Corylus Avellana*, *Fagus sylvatica*, *Quercus*, etc. R. Bois ombragés et humides entre Erpeldange et Michelau. Md. K. T.

## LXVI. LABIATAE.

(*Juss. Gen. 110.*) <sup>1)</sup>

Tribu I. — *Ocimoideæ*. (*Benth. lab. p. 1.*)

**286. Lavendula.** (*Tournef. Inst. 93.*) — Lavande. — Lavendel.

745) *L. vera*. (*DC. Fl. Fr. 5. 398.*)

‡ Juin-Septembre.

Anciennement cultivé dans les jardins et rarement naturalisé dans leur voisinage. Rochers près du vieux château d'Ausembourg. Kz.

**287. Ocimum.** (*L. Gen. 732.*) — Basilic. — Basilikenkraut.

746) *O. Basilicum*. (*L. Sp. 838.*) Basilic.

① Avril-October.

C. Cultivé pour son odeur pénétrante.

Tribu II. — *Menthoideæ*. (*Benth. lab. p. 152.*)

**288. Mentha.** (*L. Gen. n° 713.*) — Menthe. — Minze.

747) *M. silvestris*. (*L. Sp. 804*) . . . . . T. n° 857.

‡ Juillet-Septembre.

C. par place. Mardelle des eaux et des fossés, lieux frais et humides.

Var.  $\beta$ . *candicans*. (*Crantz. stirp. Aust. p. 330.*)

Avec le type.

Var.  $\gamma$ . *nemorosa*. (*Willd. Sp. 3. 75*) . . . . . T. n° 858.

AC. Bords des eaux.

Var.  $\delta$ . *velutina*. (*Lej. Revue. Fl. Spa. 115*) . . . . . T. n° 859.

R. Bords des eaux, lieux humides. Bellevue (Courtois), Sûre entre Bigelbach et Echternach. T. Moselle, Wtg. près Wasserbillig. BL. !

1) A l'exception de *Lycopus* et *Salvia* qui sont de la II<sup>e</sup> classe, 1<sup>er</sup> ordre de Linné, toutes les plantes de cette famille appartiennent à la XIV<sup>e</sup> classe, 1<sup>er</sup> ordre.

Var.  $\epsilon$ . *gratissima*. (*Willd. Sp.* 3. 75.)

AC. avec le type et *rotundifolia*. Moselle.

748) *M. rotundifolia*. (*L. Sp.* 825) . . . . . T. n° 860.

‡ Juillet-Septembre.

AC. Bords des eaux et des fossés, lieux frais dans les vallées des terrains calcaires. ! R. ailleurs, paraît manquer à l'Ardenne.

Var.  $\beta$ . *rugosa*. (*Roth. Ten. fl. Germ. I.* 309.)

AR. Avec l'espece. C. Moselle.

749) *M. viridis*. (*L. Sp.* 804) . . . . . T. n° 861.

‡ Juillet-Octobre.

AR. Bords des chemins humides et des eaux entre les deux ponts de la Bles et Longsdorff. T. Kæmpgen. Fohren (Courtois). Leesbech (Greisch.) Kz.

Var.  $\beta$ . *crispata*. (*Schrad. cat. hort. Gœtt.*) . . . . . T. n° 860.

AR. Bords des ruisseaux sous bois.

Var.  $\gamma$ . *cordifolia*. (*Opiz. ex Fresen. in Syll. pl. soc. Ratisb.* 2. 232) . . . . . T. n° 863.

R. Lieux humides près Vianden Dmtr. Pr. 514.

750) *M. gentilis*. (*L. Sp.* 205) . . . . . T. n° 870.

‡ Juin-Juillet.

AC. Lieux humides des terrains sablonneux. Leesbech sous Greisch.

Var.  $\beta$ . *acutifolia*. (*Smith. l. c.* 614) . . . . . T. n° 870bis.

R. Bords des ruisseaux entre Kopstal et le Maximeinerbüsch. T.

751) *M. pubescens*. (*Willd. enum. p.* 608.) Wgt. Fl. R. P. 926.

‡ Juillet-Septembre.

C. Ruisseaux, fossés de la vallée de la Moselle.

752) *M. piperita*. (*L. Sp.* 805.) Peffermanz . . . . . T. n° 864.

‡ Juillet-Septembre.

C. Cultivé et quelquefois subspontané au voisinage des habitations. Herrenberg (Dickrich.) Md. K. Kæmpgen. Fohren (Courtois). Vieux château d'Ansembourg. Kz.

Var.  $\beta$ . *crispa*. (*L. Sp.* 815.)

AC. Avec le type.

753) *M. aquatica*. (*L. Sp.* 805) . . . . . T. n° 865b.

‡ Juillet-Septembre.

C. Bords des eaux et des fossés aquatiques, lieux humides, marécageux. R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *hirsuta*. (*Lin. Mant. p.* 81) . . . . . T. n° 865.

Avec le type dans les habitations moins humides.

Var.  $\gamma$ . *nepetoides*. (*Lej. R. Spa.* 862) . . . . . T. n° 866.

AR. Bords des eaux, bois humides. Dommeldange, Eisembourg, Kahlscheuer. T. Echternach (Brimmeyr père).

754) *M. arvensis*. (*L. Sp.* 406) . . . . . T. n° 871.

‡ Juillet-Septembre.

C. par place. Champs humides, bords des eaux, fossés, etc.

Var. *β. sativa*. (*Smith. trans. soc. linn. Lond.* 5. 199.)

C. Avec l'espèce dans les terrains calcaires.

Var. *γ. Rothii*. (*Nees ab. Esenb. in Rehb. icon. bot.* 10. 974.)

[T. n° 869bis.

R. Lieux humides aux environs de Kahlscheuer. T.

Var. *δ. rubra*. (*Smith. l. c.* 5. 205) . . . . . T. n° 867.

R. Bords des eaux. Kahlscheuer. T.

Var. *ε. austriaca*. (*Jacq. Fl. Aust. t.* 430) . . . . . T. n° 869.

AR. Avec les précédentes.

Var. *ζ. parietariæfolia*. (*Becker. Fl. Francf.* 223.)

R. Lieux humides du Thalweg de la Moselle. W(g).

755) *M. Pulegium*. (*L. Sp.* 807). . . . . T. n° 872.

‡ Juillet-Octobre.

AG. Marécages, bords des eaux, fossés, lieux inondés l'hiver. Mertert. BL!

Var. *β. tomentella*. (*Opitz. non Hoff. et Linck. nec. Presl.*)

R. Avec le type.

**289. Lycopus.** (*L. Gen.* 15.) — Lycopé. — Wolfsfuss.

756) *L. europæus* . . . . . T. n° 30.

‡ Juillet-Août.

C. Bords des eaux, fossés aquatiques, lieux frais, marécages.

Tribu III. — Monardeæ. (*Benth. tab. p.* 190.)

**290. Rosmarinus.** (*L. Gen.* 38.) — Romarin. — Rosmarin.

757) † *R. officinalis*. (*L. Sp.* 33.) Rõsemarcin.

‡ Avril-Mai.

Anciennement cultivé pour son odeur aromatique.

**291. Salvia.** (*Townf. Inst.* 33.) — Sauge. — Salvei.

758) *S. pratensis*. (*L. Sp.* 35). . . . . T. n° 32.

‡ Mai-Novembre.

C. Prés, lieux herbeux, secs.

759) ? *S. Selarea*. (*L. Sp.* 38). . . . . T. n° 33.

‡ Juillet-Août.

R. Voisinage des ruines du vieux château de Brandenbourg. K. Vianden. Md.

760) † *S. officinalis*. (*L. Sp.* 34.) Salvei . . . . . EF. 168.

‡ Juin-Juillet.

Généralement cultivé dans les jardins et çà et là subspontané dans leur voisinage.

Tribu IV. — Thymoidea. (*Coss. et Germ. Fl. P.*)

**292. Origanum.** (*Tournf. Inst. 94.*) — Origan. — Dost.

761) *O. vulgare*. (*L. Sp. 824.*) Lëwfràbettstrë . . . T. n° 903.  
 2 Juillet-Septembre.

C. Lisières des bois, haies, coteaux, bords des chemins.

Var. *β. megastachyum*. (*Boreau, Fl. du Centre. Fr. 1967.*)  
 [T. n° 903g.]

R. Collines calcaires de la Moselle.

762) † *O. Majorana*. (*L. Sp. 825.*) Mairon.

① ou 2 Juillet-Août.

Généralement cultivé comme condiment dans les jardins et souvent subspontané. Jardin Mansfeld, Clausen Papierberg. Kz.

**293. Thymus.** (*L. Gen. 727 ex parte.*) — Thym. — Thymian.

763) *T. Serpyllum*. (*L. Sp. 825.*) Teymergenchen. Kundelkraut.  
 2 Juin-Octobre. [T. n° 905.]

C. Coteaux secs, pelouses, bords des champs, bruyères, bois, etc.

764) *T. Chamædryas*. (*Fries. nov. 197.*)

2 Juin-Octobre.

C. Lieux secs et incultes.

765) † *T. vulgaris*. (*L. Sp. 825.*) Treipekrëitgen.

5 Juin-Juillet.

Généralement cultivé comme condiment.

**294. Hyssopus.** (*L. Gen. 709.*) — Hysope. — Ysop.

766) *H. officinalis*. (*L. Sp. 796.*) . . . . . T. n° 854.  
 5 Juillet-Septembre.

Cultivé dans les jardins, quelquefois subspontané. Bellevue, Clausen, Pulvermühl. T. Vieux château d'Ansembourg. Kz.

**295. Calamintha.** (*Tournf. Inst. 92 ex parte.*)

767) *C. Acinos*. (*Clairev. in Gaud. Fl. Helv. IV. 84.*) *Thymus Acinos*. (*L.*) . . . . . T. n° 906.

① ou ② Juin-Août.

C. Champs pierreux, lieux arides, bords des chemins. R. Ardennes.

768) *C. officinalis*. (*Mönch. meth. 409.*) . . . . . T. n° 907.  
 2 Juillet-Août.

R. Broussailles, bois, montagnes de la Moselle. Schengen, Remich. T.

769) ? *C. grandiflora*. (*Mönch. meth. 408.*) . . . . . T. n° 908.  
 2 Juin-Septembre.

R. Broussailles aux environs de Remich. T.

**296. Clinopodium.** (*Tournf. Inst.* 92.) Clinopode. Wirbeldost.770) *C. vulgare.* (*L. Sp.* 821.) Bettfös. . . . . T. n° 904.

‡ Juillet-October.

C. Lisières et clairières des bois, haies, buissons, bords des chemins, lieux incultes. R Ardennes

**297. Melissa.** (*Tournf. Inst.* 91 *ex parte.*) — Mélisse.771) † *M. officinalis.* (*L. Sp.* 827) . . . . . T. n° 909.

‡ Juin-September.

AR. Cultivé dans les jardins et çà et là spontané au voisinage des habitations. Bofferdange. EF.

**298. Satureia.** (*L. Gen.* 707.) — Sarriette. — Pfefferkraut.772) † *S. hortensis.* (*Schk. Handb.* 1. 156.) Bönkrätchen.

① Juillet-September. [T. n° 856

Généralement cultivé dans les jardins comme condiment et très-souvent spontané.

Tribu V. — Lamioidæ. (*Coss. et Ger. l. c.*)**299. Nepeta.** (*L. Gen.* 710.) — Népéta. — Katzenminze.773) *N. Cataria.* (*L. Sp.* 796) . . . . . T. n° 851.

‡ Juin-September.

AR. Bords des chemins, décombres, haies, buissons, villages, ruines, etc. Vianden. (Courtois). Ansembourg.!

**300. Glechoma.** (*L. Gen.* 714.) — Glechome. — Gundelrebe.774) *G. hederacea.* (*L. Sp.* 807.) Ablatz. Gannelrêw. Hejrêw.

‡ Avril-Mai. [T. n° 873.

C. Lieux herbeux et ombragés, haies, buissons, bois, etc.

Var. *β. villosa.* (*Koch. Syn.* 647.) *G. hirsutum.* (*Rehb.*) T. n° 874.

C. Bois montueux.

**301. Lamium.** (*L. Gen.* 716 *emend.*) — Lamier. — Taubnessel.775) *L. amplexicaule.* (*L. Sp.* 809) . . . . . T. n° 881.

① Avril-October.

C. Moissons, lieux cultivés, bords des chemins. R Ardennes.

776) *L. incisum.* (*Willd. Sp.* III. 89) . . . . . T. n° 880.

① ou ② Avril-October.

R. Lieux cultivés, bords des chemins, Fischbach. T.!

777) *L. purpureum.* (*L. Sp.* 809.) Röd Brenndeschtel. T. n° 879.

① ou ② Mars-October.

C. Lieux cultivés, moissons, bords des chemins.



778) *L. album*. (*L. Sp.* 809.) Weiss (Zahn) Brenndeschtel.  
Hunnegsäck. . . . . T. n° 875.

☞ Avril-Octobre.

C. Lieux herbeux, bords des chemins, haies, buissons.

779) *L. maculatum*. (*L. Sp.* 809) . . . . . T. n° 877.

☞ Avril-Octobre.

AC. Buissons, haies, bords des chemins. Manque à l'Ardenne.

Var.  $\beta$ . *mutabile*. (*Dmtr. Pr.* 465.)

C. Avec l'espèce.

**302. Galeobdolon.** (*Hud. Fl. Angl.* 258.) — Galeobdolon. —  
Waldnessel.

780) *G. luteum*. (*Hud. l. c.*) Gîel Brenndeschtel. T. n° 887.

☞ Avril-Juin.

AC. Haies, buissons, bois, coteaux incultes.

**303. Galeopsis.** (*L. Gen.* 717 *ex parte.*) Galeopside. Holzah.n.

781) *G. Tetrahit*. (*L. Sp.* 810.) Dahndeschtel. Hemmelsplanken.

① Juillet-Août. [T. n° 886.

C. Lisières des bois, buissons, haies, lieux incultes.

Var.  $\beta$ . *bifida*. (*Bönnig. Fl. Monast.* 178) . . . Dmtr. 475.

AC. Champs des Ardennes.

Var.  $\gamma$ . *cannabina*. (*Roth. Germ.* 254). . . . . T. n° 886b.

AC. Avec l'espèce.

782) *G. speciosa*. (*Mill. Dict.*) Versicolor. (*Curt.*) T. n° 885.

① Juillet-Août.

R. Moissons aux environs de Kockelscheuer Schrassig T.

783) *G. ochroleuca*. (*Lam. Dic.* 2. p. 600.) Villosa. (*Hud.*)

① Juin-Septembre. [T. n° 882.

C. par place dans les terrains sablonneux. Champs cultivés, lieux incultes.

784) *G. intermedia*. (*Vill. fl. Daup.* 2. p. 387. t. 9.) T. n° 883.

① Juillet-Octobre.

AC. par place. Lieux incultes, champs sablonneux. Kopstal, Ansembourg, Fischbaech, Dommeldange. T.

785) *G. Ladanium*. (*L. Sp.* 810.) *angustifolia*. (*Ehrh.*) T. n° 884.

① Juillet-Octobre.

C. Lieux pierreux, bords des chemins champs cultivés, moissons maigres. R. Ardennes.

**304. Stachys.** (*L. Gen.* 719.) — Epiaire. — Ziert.

786) *S. germanica*. (*L. Sp.* 812). . . . . T. n° 892.

## ② ou 2 Juillet-Août.

AR. Lieux pierreux, bords des chemins. Coteaux arides. Côtes de la Sûre entre Diekirch et Wallendorf. EF. Kz.

787) *S. alpina*. (*L. Sp.* 812) . . . . . T. n° 891.

2 Juillet-Septembre.

R. Bois montueux, buissons. Esch s|S., Wiltz, Neunhausen, Rambrouch. T.

788) *S. silvatica*. (*L. Sp.* 811) . . . . . T. n° 890.

2 Juin-Août.

C. Bois, buissons, lieux couverts.

789) *S. ambigua*. (*Smith. Eng. bot. t.* 2089) . . . . . T. n° 894.

2 Juillet-Septembre.

R. Bords des eaux, lieux humides. Feulen (Courtois) Hunebour (Mersch) W. T.

790) *S. palustris*. (*L. Sp.* 811.) Wel Brenndeschtel. T. n° 893.

2 Juillet-Septembre.

C. Bords des eaux, lieux humides, champs frais, etc.

791) *S. arvensis*. (*L. Sp.* 814) . . . . . T. n° 895.

① Juillet-Octobre.

C. Champs un peu humides inondés l'hiver. R. Ardennes.

792) *S. annua*. (*L. Sp.* 813) . . . . . T. n° 896.

① ou ② Juillet-Octobre.

C. Champs secs, lieux pierreux, bords des chemins.

793) *S. recta*. (*L. Mant.* 82.) *S. sideritis*. (*Vill. Dauph.* 4. 375.)

2 Juin-Septembre. [T. n° 897.

AR. Coteaux arides, rochers, lisière des bois montueux. Moselle. Dmtr. 456. Palumberg, (Machthum) BB.! Pulvermühl (Courtois)! Clausen. BB.!

**305. *Betonica*.** (*L. Gen.* 718.) — Betoine. — Batunge.

794) *B. officinalis*. (*L. Sp.* 810.) Antonisthee. Bartuneeckel.

2 Juin-Septembre. [T. n° 888.

C. Lisières et clairières des bois frais, secs.

Var.  $\beta$ . *stricta*. (*Ait. Kew.* 1. 299) . . . . . T. n° 889.

AR. Avec l'espèce, dans les Ardennes surtout.

**306. *Marrubium*.** (*L. Gen.* 721 *ex parte*.) Marrube. Andorn.

795) *M. vulgare*. (*L. Sp.* 816.) Helfkraut. . . . . T. n° 898.

2 Juin-Octobre.

AC. par place. Haies, décombres, bords des chemins, coteaux arides au-dessous des ruines de Hesperange. BL.! Ansembourg, château et village. DW.

**307. *Ballota*.** (*Tournf. Inst.* 85.) — Ballote. — Schattenkraut.

796) *B. nigra*. (*L. Sp.* 810.) *B. foetida*. (*Lmk.*) Gottesvergess.  
 2 Juin-Septembre. [T. n° 899.

C. Lieux incultes, haies, buissons, bois.

Var. *β. ruderalis*. (*Koch. Syn.* 657.) *B. vulgaris*. (*Lmk.*) T. n° 900.  
 Avec l'espèce.

Var. *γ. sepium*. (*Lej. Fl. Spa. II.* 29). . . . . T. n° 899b.  
 Avec l'espèce.

**308. Leonurus.** (*L. Gen.* 722.) — Agripaume. — Herzgespann.

797) *L. Cardiaca*. (*L. Sp.* 817) . . . . . T. n° 901.  
 2 Juin-Septembre.

AR. par place. Haies, décombres, voisinage des habitations. Ruines du château de Bourscheid. EF. Ansembourg. DW.

798) ? *L. Marrubiastrum*. (*L. Sp.* 814) . . . . . T. n° 902.  
 ② ou 2 Juin-Août.

R. Lieux secs, incultes, environs du Zolverknapp. T.

Tribu VI. — Scutellarineæ. (*Benth. lab. p.* 416.)

**309. Brunella.** (*Tournf. Inst.* 84.) — Brunelle. — Brunelle.

799) *B. vulgaris*. (*L. Sp.* 837) . . . . . T. n° 910.  
 2 Juillet-Août.

C. Bords des chemins, près secs, pelouses, bois.

Var. *β. pennatifida*. (*Pers. syn.* 2. 137.)

AR. Avec l'espèce.

Var. *γ. surrecta*. (*Dmtr. P.* 442.)

AC. Avec l'espèce.

800) *B. grandiflora*. (*Jacq. Aust. IV.* 1. 377) . . . T. n° 911.  
 2 Juillet-Septembre.

R. Clairières des bois montueux, pelouses sèches du calcaire de la Moselle.

801) *B. alba*. (*Pallas. ap. M. Bub. Fl. Taur. cam.* 2. 67.) *laciniata*.  
 2 Juillet-Août. [T. n° 912.

AC. Coteaux secs, pelouses, bords des chemins du terrain calcaire. Canach. T. Schengen, Ehnem. T ! Mertert. R. BB. !

**310. Scutellaria.** (*L. Gen.* 734.) — Scutellaire. — Helmer.

802) *S. galericulata*. (*L. Sp.* 836.) Scheldkraut. . . T. n° 913.  
 2 Juin-Septembre.

C. Bords des eaux, étangs, déversoirs ombragés, lieux frais R. Ardennes.

803) *S. minor*. (*L. Sp.* 835) . . . . . T. n° 914.  
 2 Juillet-Septembre.

R. Lieux marécageux, tourbeux, bois humides, surtout en Ardennes.



812) *T. montanum*. (*L. Sp.* 791) . . . . . T. n° 850.  
 2 Juin-Septembre.

R. Coteaux arides, calcaires et sablonneux. Environs d'Ospem. Md.

Var. *β. supinum*. (*Jacq. a. t.* 417.)

R. Hauteur de Beltendorf à gauche de la Sûre. (Courtois).

### LXVII. VERBENACEÆ.

(Juss. in *Ann. Mus.* VII, 637)

**313. Verbena.** (*Tournf. Inst.* 94.) Verveine. Eisenbart. [XIV, 2.]

813) *V. officinalis*. (*L. Sp.* 295) . . . . . T. n° 844.

② ou 2 Juin-Octobre.

C. Bords des chemins, fossés, lieux incultes. R. Ardennes.

## CLASSE II. — Gamopétales périgynes.

### LXVIII. VACCINEÆ.

(DC. *Théor. élém.* éd. 1. 216.) [VIII, 1]

**314. Vaccinium.** (*L. Gen.* 483 *ex parte.*) Airelle. Heidelbeere.

814) *V. Vitis-idæa*. (*L. Sp.* 500) . . . . . T. n° 585.

‡ Mai-Juillet.

BL. Bruyères, pâturages, bois : environs de Troine. Kz. Echternach. (Brim.)

815) *V. Myrtillus*. (*L. Sp.* 498.) Mòlbîer . . . . . T. n° 583.

‡ Avril-Mai. Fr. Juin-Juillet.

C. Manque sur de grands espaces. Bois, bruyères des terrains sablonneux et schisteux.

**315. Oxycoccus.** (*Tournf. Inst.* 431.) Canneberge. Moosbeere.

816) *O. palustris*. (*Pers. syn. pl.* 1. 419) . . . . . T. n° 586.

‡ Avril-Juillet.

AR. Marais, tourbières, bruyères, taillis et bois fangeux des Ardennes.

### LXIX. CAMPANULACEÆ.

(Juss. *Gen.* 163 *ex parte.*) (V, 1.)

**316. Campanula.** (*Tournf. Inst.* 37.) — Campanule. —  
 Glockenblume.

817) *C. Rapunculus*. (*L. Sp.* 232.) Raponzel. Gartegrand.

2 Juin-Août.

[T. n° 358.

C. Pelouses, prairies, haies, bruyères, lisières des bois.

818) *C. persicæfolia*. (*L. Sp. ed.* 1. 164.) Klackebloom. T. n° 359.

2 Juin-Août.

AC. Clairières des bois, taillis, buissons herboux ; aussi en Ardennes.

819) † *C. pyramidalis*. (*L. Sp.* 232.)

② Juillet-Août.

C'est la plante *C.* cultivé sur les fenêtres pour former berceau.

820) *C. rotundifolia*. (*L. Sp.* 232) . . . . . T. n° 354.

‡ Juillet-Septembre.

*C.* Murs, bords des chemins et des champs, rochers, pâturages, pelouses, bruyères.

821) ? *C. rapunculoïdes*. (*L. Sp.* 234) . . . . . T. n° 363.

‡ Juillet-Septembre.

AR. Jardins incultes, lieux cultivés, voisinage des habitations.

822) *C. Trachelium*. (*L. Sp.* 235) . . . . . T. n° 362.

‡ Juillet-Septembre.

AC Bois montueux, buissons, lieux couverts, murs. AR. Ardennes. C. Moselle. Manque sur de grands espaces.

Var. *β. urticaefolia*. (*Schmidt. bot.* 173) . . . . . T. n° 361.

Avec l'espèce.

823) *C. Medium*. (*L. Sp.* 236) . . . . . EF. 173.

‡ Juillet-Septembre.

Cultivé et quelquefois échappé dans le voisinage des habitations.

824) *C. glomerata*. (*L. Sp.* 235.) Fangerhut. . . . . T. n° 364.

‡ Juin-Septembre.

*C.* Prairies, pelouses, pâturages secs, lieux incultes, herbeux, lisières des bois, etc. AR. Ardennes.

Var. *β. pumila*. (*C. et Germ. Fl. P.* 427.)

Var. *γ. elliptica*. (*Kit. ap. Schult. öst. Fl.* 1. 410.)

Var. *δ. salviifolia*. (*Wall. Sched.* 90.)

Var. *ε. aggregata*. (*Willd. in Hort. Berol. supp.* 10.)

Var. *ζ. speciosa*. (*Horn. Hufn.* 2. 957.)

Avec l'espèce.

825) ? *C. Cervicaria*. (*L. Sp.* 235) . . . . . T. n° 365.

② ou ‡ Juillet-Août.

R. Bois, collines arides. Reckingen, Blaschette. T.

826) *C. patula*. (*L. Sp.* 232) . . . . . T. n° 357.

② Mai-Juillet.

AR. Coteaux boisés, buissons Rambrouch, Neunhausen. T. Entre la Merkolzer- et la Toutschenmühle. (Wiltz.) DW.

**317. *Specularia*.** (*Heid. Syst. pl. Gen.* 8.) — Spéculaire. —  
Venusspiegel.

827) *S. speculum*. (*Alph. DC. Camp.* 346.) *Prismatocarpus speculum*. (*DC.*) . . . . . T. n° 366.

① Mai-Août.

AC. Moissons, lieux cultivés, champs en friche, bords des chemins, etc.

828) *S. hybrida*. (*Alph. DC. l. c.* 349) . . . . . T. n° 367.

① Juin-Juillet.

AR. Jachères et moissons des champs arides.

**318. *Phyteuma*.** (*L. Gen.* 89.) — Raiponce. — Teufelskrallen.

829) ? *P. orbiculare*. (*L. Sp.* 242) <sup>1)</sup> . . . . . T. n° 352.

‡ Juin-Août.

R. Clairières des bois, pelouses arides, pâturages des coteaux calcaires. Moselle, Grünenwald. T. Neumühl (Mandelbach). Schwanenthal (Hunsdorf). BL.

830) *P. spicatum*. (*L. Sp.* 242.) Rapunzel . . . . . T. n° 353.

‡ Mai-Juin.

C. Bois, pâturages, prairies.

Var. *β. nigrum*. (*Schmidt. bot.* 2. 189.) Perdsblum.

Cette variété est la plus commune dans le bon pays, tandis que le type à fleur blanche est surtout abondant en Ardennes.

**319. *Jasione*.** (*L. Gen.* 455.) — Jasione. — Monke.

831) *J. montana*. (*L. Sp.* 1317) . . . . . T. n° 390.

① ou ② Juin-Septembre.

C. Lieux secs et sablonneux, coteaux arides, bruyères, bords des chemins.

832) ? *J. perennis*. (*Lam. Dict.* 3. p. 216) . . . . . T. n° 391.

‡ Juin-Août.

R. Lisières des bois, lieux arides. Echternach, Rosport T. Ardennes T.

Var. *β. humilis*. (*Pers. syn.* 2. 215) . . . . . T. n° 392.

R. Champs secs et arides aux environs de Rambrouch. T.

**320. *Wahlenbergia*.** (*Schrad. Cat. Hort. Gætt. an.* 1814.) —

Wahlenbergie. — Klingel.

833) *W. hederacea*. (*L. Sp.* 240.)

‡ Juin-Juillet.

R. par place. Pâturages, près marécageux et tourbeux de l'Ardenne, entre Erpeldange et Kautenbach. (Bockholz.)

1) La plante de l'herbier de Tinant, ainsi que ce qui nous a été communiqué par d'autres sous ce nom n'est pas *β. orbiculare*. C'est une variété de *P. spicatum*, [*P. ovatum* (*Willd.*)] qui a été prise pour le n° 829. Celui-ci reste donc à rechercher.

## LXX. CUCURBITACEAE.

(Juss. Gen. 393.) [XXI, 9.]

**321. Bryonia.** (*L. Gen.* 508.) — Bryone. — Zaurrübe.834) *B. dioica.* (*Jacq. Aust. II.* 59. t. 499.) Schwengswurzel.

‡ Juin-Juillet.

[T. n° 1426.]

C. Haies, buissons, voisinage des habitations.

**322. Cucumis.** (*L. Gen.* 508.) — Concombre. — Gurke.835) † *C. sativus.* (*L. Sp.* 1437.) Cornischong.

① Mai-Juillet. Fr. Août-Septembre.

C. Cultivé en plusieurs variétés dans les jardins R Ardennes.

836) † *C. Melo.* (*L. Sp.* 1436.) Melon.

① Mai-Juillet. Fr. Juillet-Septembre.

AR. Cultivé.

**323. Cucurbita.** (*L. Gen.* 1091.) — Courge. — Kürbiss.837) † *C. maxima.* (*Duch. in Lmk. Ency. méth. II.* 151.) Calebàs.

① Juin-Août. Fr. Septembre-Novembre.

C. Cultivé.

838) *C. Pepo.* (*DC. Prod. III.* 316.) Calebàs.

① Juin-Août. Fr. Septembre-Octobre.

Cultivé dans les jardins.

## LXXI. CAPRIFOLIACEAE.

(A. Richd. in diet. class. III. 172.)

Tribu I. — Sambuceæ. (*H. B. et K. nov. gen. am.* 3. 487.)**324. Adoxa.** (*L. Gen.* 198.) — Adoxe. — Bisamkraut. [VIII, 4.]839) *A. Moschatellina.* (*L. Sp.* 527) . . . . . T. n° 689.

‡ Mars-Avril.

C. Lieux frais, haies, buissons, broussailles, taillis.

**325. Sambucus.** (*L. Gen.* 372.) — Sureau. — Hollunder. [V, 3.]840) *S. Ebulus.* (*L. Sp.* 385.) Rôden Hîelenter. . . . . T. n° 492.

‡ Juillet-Août.

C. Lieux cultivés ou pierreux, bords des chemins et des fossés des terrains gypseux et calcaires AR. Ardennes. Manque sur de grands espaces.

841) *S. nigra.* (*L. Sp.* 385.) Hîelenter. . . . . T. n° 493.

‡ Juin-Juillet.

AR. Haies, bois taillis. AC. Ardennes.

Var. *β. lacianata.* (*Rehb. Ic.* 1438) . . . . . T. n° 493b.

R. Dans les haies près d'Everlange. T. Eicherberg, Limpertsberg. M.



842) *S. racemosa*. (*L. Sp.* 386.) Weïen Hfelerter. T. n° 494.  
 † Avril-Mai.

A.C. Bois montueux.

**326. *Viburnum*.** (*L. Gen.* 143.) — Viorne. — Schwelch. [V, 3.]

843) *V. Lantana*. (*L. Sp.* 384.) Sametholz. Modersëichen.  
 Monzelter. Motler. . . . . T. n° 490.

† Mai. Fr. Août-Octobre.

C. Haies, taillis, bois montueux des terrains calcaires. AC. Ardennes.

844) *V. Opulus*. (*L. Sp.* 384.) Ierben. Weisse Faulbâm. T. n° 491.

† Mai-Juin.

A.C. Haies, taillis, endroits humides des bois.

Var.  $\beta$ . *sterilis*. (*Hort.*)

C. Cultivé sous le nom de Boule-de-neige.

Trihu II. — *Lonicereæ*. (*Brown, Char. et deser. p. 4.*)

**327. *Lonicera*.** (*L. Gen.* 93 *ex parte.*) — Chèvre-feuille. —  
 Geisblatt. [V, 1.]

845) *L. Xylostemum*. (*L. Sp.* 248.) Schlaufhölzchen. T. n° 369.  
 † Mai-Juin. Fr. Juillet-Septembre.

C. Haies, taillis, clairières des bois, etc.

846) *L. Periclymenum*. (*L. Sp.* 247.) Rankelter. Judesël.

† Juin-Septembre. Fr. Août-Octobre. [T. n° 368.]

C. Haies, buissons, bois.

847) † *L. caprifolium*. (*L. Sp.* 246.) Geesblät . . EF. 179.

† Mai-Juillet. Fr. Juillet-Septembre.

C. Cultivé et quelquefois naturalisé dans les haies et les bois. Fels-lez-Schengen. BB. !

**328. *Symphoria*.** (*Pursh.*) — Symphoricarpe. — Peterstrauch.

848) † *S. racemosa*. (*Michaux.*) Dödeblè . . . . EF. 180.

† Juillet-Septembre. Fr. Octobre-Novembre.

C. Planté dans les jardins et les bosquets ; souvent subspontané.

## LXXII. RUBIACEAE.

(*Juss. Gen.* 196 *ex parte.*) [IV, 1.]

**329. *Sherardia*.** (*L. Gen.* 50.) — Scherardie. — Schwarde.

849) *S. arvensis*. (*L. Sp.* 149) . . . . . T. n° 264.

① Mai-Octobre.

C. Moissons, lieux cultivés. R. Ardennes.

**330. Asperula.** (*L. Gen.* 50.) — Asperule. — Meister.850) † *A. arvensis.* (*L. Sp.* 150) . . . . . T. n° 261.

① Juin-Octobre.

Cultivé dans les jardins pour ses fleurs bleues.

851) *A. odorata.* (*L. Sp.* 150.) Waldmeschter. Meekraut.

‡ Mai-Juin. [T. n° 262.

AC. Bois humides. AR. Ardennes.

852) *A. Cynanchica.* (*L. Sp.* 151) . . . . . T. n° 263.

‡ Juin-Septembre.

C. Coteaux arides, pelouses, bords des chemins sablonneux et pierreux.

853) *A. galioides.* (*M. Bieberst. fl. Taur. cauc. I.* 101.) T. n° 247.

‡ Juillet.

R. Prairies aux environs de Simmern. T. Jachères argilo-calcaires au-dessous le Boelholzhof. (Flaxweiler.) EF. Kz.

**331. Galium.** (*L. Gen.* 52.) — Gaillet. — Labkraut. [IV, 4.]854) *G. Cruciata.* (*Scop. Fl. Carn. I.* 100) . . . . . T. n° 260.

‡ Avril-Juin.

C. Haies, buissons, bois, endroits découverts des bois.

855) *G. verum.* (*L. Sp.* 155) . . . . . T. n° 245.

‡ Juin-Septembre.

C. Pelouses sèches, prairies, bords des chemins, lisières des bois.

856) *G. silvaticum.* (*L. Sp.* 155) . . . . . T. n° 246.

‡ Juin-Août.

AR. Bois montueux de l'Ardenne. Esch s/S. (Courtois). Schimpach. EF. Kz.  
R. ailleurs. Mandelbach. Kz. Grünenwald, Moselle. T.857) *G. Mollugo.* (*L. Sp.* 155.) *G. elatum.* (*Thuil.*) T. n° 249.

‡ Mai-Juin.

C. Bords des chemins, haies, buissons, lisières des bois, pâturages, prairies.

858) *G. erectum.* (*Huds. fl. Angl.* 68.) *G. lucidum.* (*Al.*)

‡ Mai-Juin. [T. n° 250.

R. Pâturages, prairies. Ardennes. Rambrouch. T. C. et L. 298.

859) *G. silvestre.* (*Poll. Palat. I.* 151.) *G. læve.* (*Thuil.*) T. n° 251.

‡ Juin-Juillet.

C. Lisières des bois, bords des chemins, coteaux arides, rochers, bruyères.

Var. *β. supinum.* (*DC. Fl. Fr. I.* 789) . . . . . T. n° 253.

AC. Avec l'espèce.

860) *G. saxatile.* (*L. Fl. suec. ed. 2.* 463.) *Hercynicum.* (*DC.*)

‡ Juillet-Août. [T. n° 254, 255.

R. Manque sur de grands espaces. Bois montueux, bruyères, rochers humides, tourbières des terrains arenacés, au-dessus d'Erpeldange. T. C. Ardennes.

861) *G. palustre*. (*L. Sp.* 153) . . . . . T. n° 248.  
 † Mai-Juillet.

AC. Prés marécageux, pelouses humides, fossés, marais, bords des étangs.

862) *G. uliginosum*. (*L. Sp.* 153) . . . . . T. n° 252.  
 † Juin-Septembre.

AC. Prairies marécageuses et tourbeuses, fossés, bords des eaux.

863) *G. Aparine*. (*L. Sp.* 157.) Klieid . . . . . T. n° 258.  
 ① ou ② Juin-Septembre.

C. Lieux cultivés, moissons, haies, buissons, bois.

Var. *β. Vaillantii*. (*DC. Fl. Fr. IV.* 263) . . . . . T. n° 259.

AC. Moissons.

Var. *γ. spurium*. (*L. Sp.* 154) . . . . . T. n° 256.

R. Avec l'espèce dans les champs de lin.

864) *G. tricorné*. (*With. Brit. ed.* 2. 153). . . . . T. n° 257.  
 ① Juillet-Septembre.

AC. Jachères et moissons maigres, lieux cultivés.

### LXXIII. VALERIANEAE.

(*DC. Fl. Fr. IV.* 232.) [IV, 1.]

**332. † Centranthus.** (*Neck. Elem. I.* 123.) — Centranthe. —  
 Spornblume.

865) *C. ruber*. (*DC. fl. Fr. IV.* 239.) Barbe de Jupiter. EF. 183.  
 † Juin-Août.

C Cultivé, quelquefois subspontané sur les vieux murs et les décombres.

**333. Valeriana.** (*L. Gen.* 22.) — Valériane. — Baldrian.

866) *V. officinalis*. (*L. Sp.* 45.) Baltes . . . . . T. n° 38.  
 † Juillet-Septembre.

AC. Manque sur de grands espaces. Bords des eaux, lieux frais, prairies, bois.

Var. *β. exaltata*. (*Mikan, ap. Pohl. tentam fl. boëm. I. p.* 41.)

R. Avec le type L et C.

867) † *V. Phu*. (*L. Sp.* 45). . . . . T. n° 39.  
 † Mai-Juin.

Cultivé et quelquefois subspontané aux bords des eaux.

868) *V. dioica*. (*L. Sp.* 44). . . . . T. n° 40.  
 † Avril-Juin.

C. Bois humides, prairies marécageuses et tourbeuses.

**334. Valerianella.** (*Tournf. Inst.* 32.) Valérianelle. Nissel.

869) *V. olitoria*. (*Poll. Palat. I. 30.*) Cabiset. Meissëerchen.

① Avril-Juin. [T. n° 41.

C. Lieux cultivés, champs, vignes, vieux murs. Cultivé pour salade dite Doucette.

870) *V. carinata*. (*Lois. Not. 149*) . . . . . T. n° 42.

① Avril-Juin.

AR. Moissons, lieux cultivés, décombres, etc.

871) *V. auricula*. (*DC. Fl. Fr. supp. 492*) . . . . . T. n° 47.

① Juin-Août.

AC. Lieux cultivés, jachères et moissons.

872) *V. Morisonii*. (*DC. Prod. IV. 627.*) *V. dentata*. T. n° 43.

① Juin-Septembre.

AC. Lieux cultivés, moissons, etc.

873) ? *V. eriocarpa*. (*Desv. Journ. Bot. II. 314*) . . . T. n° 48.

① Mai-Juin.

R. Moissons. Kahlscheuer (Kopstal) T.

874) *V. coronata*. (*DC. Fl. Fr. IV. 241.*) *hamata*. (*Lj.*) T. n° 45, 46.

① Juillet-Août.

R. Jachères et moissons des terrains sablonneux. Blaschette. T. Kahlscheuer. T.

875) *V. vesicaria*. (*Mönch. meth. 493*) . . . . . T. n° 44.

① Juin-Juillet.

R. Lieux cultivés. Blaschette. T.

#### LXXIV. DIPSACEAE.

(*DC. Fl. Fr. 221.*) [IV, 1.]

**335. Scabiosa.** (*L. Gen. 48 ex parte.*) — Scabieuse. — Scabiose.

876) *S. Columbaria*. (*L. Sp. 143.*) Grandkraut . . . T. n° 234.

‡ Juillet-October.

C. Lieux herbeux, lisières des bois, bords des chemins, rochers, etc.

Var.  $\beta$ . *pratensis*. (*Jordan. Pug. 91*) . . . . . T. n° 234d.

Avec l'espèce.

Var.  $\gamma$ . *patens*. (*Jordan. l. c. 94*) . . . . . T. n° 234c.

Avec l'espèce.

877) *S. Succisa*. (*L. Sp. 142.*) . . . . . T. n° 230.

‡ Juillet-October.

C. Pâturages, prés, clairières des bois.

878) † *S. atropurpurea*. (*L. Sp. 144.*)

① Juillet-October.

C. Cultivé sous le nom de *Fleur des Veuves*.

**336. Knautia.** (*Coult. Dips.* 28.) — Knautie.

879) *K. arvensis.* (*Coult. l. c.* 29.) *Scabiosa arvensis.* T. n° 232.  
 4 Juin-Août.

C. Prairies, champs herbeux, lisières des bois, bords des chemins.

880) ? *K. silvatica.* (*Dub. bot. gall.* 1. 257) . . . T. n° 233.  
 4 Juin-Juillet.

AR. Bois montueux.

**337. Dipsacus.** (*L. Gen.* 114.) — Cardon. — Karde.

881) *D. silvestris.* (*Mill. Dict.* n° 2) . . . T. n° 226.  
 ② Juillet-Septembre.

C. Lieux incultes, bords des chemins, manque par place.

882) ? *D. Fullonum.* (*Mill. Dict.* 1). . . T. n° 227.  
 ② Juillet-Août.

R. Autrefois cultivé, souvent subspontané. Echternach. T. Geigeberg. BL.!

883) *D. pilosus.* (*L. Sp.* 141). . . T. n° 229.  
 ② Juin-Août.

AC. Bords des ruisseaux, haies, buissons, bords des chemins.

## LXXV. COMPOSITAE.

(Adans. Fam. II. 103.) *Synanthera.* (Rich. in Marth. Cat. jard. med.  
 Par. 1801. 85.) [XIX.]

Sous-ordre I. — Tubulifloræ. (*Endl. gen.* 356.)

Tribu I. — Cynarocephalæ. (*Juss. gen.* 171.)

Sous-tribu I. — *Carduineæ.* (*Lessing. syn.* 8.)

**338. Onopordon.** (*L. Gen.* 409 *ex parte.*) Onoporde. Eselsdistel.

884) *O. Acanthium.* (*L. Sp.* 1158). . . T. n° 1175.  
 ② Juin-Septembre.

AR. Bords des chemins, décombres, lieux incultes, manque sur de très-grands espaces. C. Aux environs de Luxembourg du côté de l'ancienne Porte-Neuve.

**339. Carlina.** (*Tournef. Inst.* 285.) - Carline. — Eberwurz.

885) *C. vulgaris.* (*L. Sp.* 1161.) Drâmdeschtel. T. n° 1197.  
 ② Juillet-Septembre.

C. Coteaux secs arénacés, pâturages, bois, bords des chemins. AR. Ardennes.

**340. Cynara.** (*Vaill. Act. acad. Par.* 1718. 155.) — Artichaut. — Artichoke.

886) † *C. Scolymus.* (*L. Sp.* 1159.) Artichò.  
 4 Août-Septembre.

AR. Cultivé dans les jardins potagers.

**341. Cirsium.** (*Tournf. Inst.* 255.) — Cirse. — Kratzdistel.887) *C. lanceolatum.* (*Scop. Carn. fl. II.* 130.) Deschtel.

② Juin-Septembre. [T. n° 1190.

C. Bords des chemins, villages, décombres, lieux incultes, bois.

Var. *β. nemorale.* (*Rchb. fl. ex. p.* 286) . . . . T. n° 1191.

R. Grünenwald au-dessus des forges de Dommeldange. T.

888) *C. eriophorum.* (*Scop. fl. Carn. II.* 130) . . T. n° 1189.

② Juillet-Août.

R. Coteaux pierreux, bords des chemins, décombres, lieux incultes des terrains calcaires. Bellevue, Glacis du Limpertsberg. T.!

889) *C. palustre.* (*Scop. fl. Carn. II.* 130) . . . T. n° 1195.

② Juin-Août.

C. Prairies humides, endroits marécageux, tourbières, etc.

890) *C. acaule.* (*All. Ped. I.* 153.) Hondsdeschtel. Pläut.

‡ Juillet-Septembre. [T. n° 1188.

C. Collines sèches, lieux herbeux, pâturages, bords des chemins, lisières des bois.

Var. *β. caulescens.* (*C. dubium. Willd.*) . . . . T. n° 1188b.

R. Avec l'espèce.

Var. *γ. decoloratum.* (*Koch, syn. ed.* 2. 398.)

R. Bords des chemins et prés humides.

891) *C. arvense.* (*Lmk. Fl. Fr. II.* 26.) Deschtel. T. n° 1193.

① ou ‡ Juin-Septembre.

C. Bords des chemins, décombres, champs cultivés ou en friche.

Var. *β. setosum.* (*M. Bieb. fl. Tauric. cauc.* 3. 560.) T. n° 1194.

AR. Avec l'espèce dans les lieux ombragés.

892) *C. oleraceum.* (*All. Ped. I.* 149.) Wiesendeschtel.

‡ Juillet-Août. [T. n° 1196.

AC. Prairies humides, marécageuses, bords des eaux; manque sur de grands espaces.

**342. Carduus.** (*L. Gen.* 925 *ex parte.*) — Chardon. — Distel.893) *C. tenuiflorus.* (*Sm. Brit.* 849) . . . . T. n° 1182.

② Juin-Août.

R. Très-fugace; bords des chemins, lieux incultes: Mersch. T.

894) ? *C. multiflorus.* (*Gaud. helv.* 5. 166.) *C. polyanthemus.*

② Juin-Juillet. [T. n° 1183.

R. Lieux incultes, humides; au-dessus de Dommeldange. T.

895) *C. crispus.* (*L. Sp.* 1150) . . . . T. n° 1186.

② Juillet-Septembre.

C. Prairies, bords des eaux, broussailles et bois humides.

896) *C. nutans*. (*L. Sp.* 1150) . . . . . T. n° 1185.

② Juin-Août.

C. Bords des chemins, champs en friche, lieux incultes.

897) *C. acanthoides*. (*L. Sp.* 1150) . . . . . T. n° 1187.

② Juin-Juillet.

AR. Bords des chemins, lieux incultes, bois. Bords de la Sûre aux environs d'Echternach. T. Bellevue. Kz.

**343. Silybum.** (*Vaill. Act. acad. Par.* 1718. 172.) — Silybe. — Mariendistel.

898) † *S. marianum*. (*Gärtn. Fruct.* II. 377.)

① Juin-Août.

R. Autrefois cultivé, souvent subsponané dans le voisinage des habitations. Tuntingen DW. Stierchen. (Grund.) Clausen, Bofferdange. Kz.

Sous-tribu II. — *Centaureæ*. (*DC. Diss.* p. 23)

**344. Lappa.** (*Tournf. Inst.* 256.) — Bardane. — Klette.

899) *L. officinalis*. (*All. ped.* 1. p. 145.) Klèed. Wolfskraut.

*Lappa major* . . . . . T. n° 1180.

② Juillet-Août.

C. Lieux incultes un peu humides, bords des chemins. R. Ardennes.

900) *L. glabra*. (*Lmk. Dic.* 1. p. 377 *pro parte.*) *L. minor*.

② Juillet-Septembre. [T. n° 1179.

C. Bois, bords des chemins, lieux incultes.

901) *L. nemorosa*. (*Körninke.*) *L. macrosperma*. (*Wallr.*)

② Juillet-Août.

R. Bois des terrains gypseux. Herborn (Ilse).

902) *L. tomentosa*. (*Lmk. Dic.* 1. 377.) A. Bardana. T. n° 1178.

② Juillet-Août.

R. Bords des chemins, lieux incultes. AR. Sur la Moselle.

**345. Serratula.** (*L. Gen.* 924 *ex parte.*) — Sarète. — Scharte.

903) *S. tinctoria*. (*L. Sp.* 1144) . . . . . T. n° 1181.

‡ Juillet-Septembre.

AC. par place. Bois taillis, prairies, pâturages. Echternach. (Brimmeyr père). Diekirch. C. et L. 1426. Cessingen. Md. EF. ! Christnach, Blaschette, Everlange, etc. T. Herborn, (Ilse). Wintrange. BB ! R. Ardennes.

**346. Centaurea.** (*L. Gen.* 984 *ex parte.*) Centaurée. Flockenblume.

904) *C. Calcitrapa*. (*L. Sp.* 1297) . . . . . T. n° 1262.

## ② Juillet-Septembre.

C. Lieux secs, pierreux, bords des chemins de la vallée de la Moselle. T. !  
Glacis entre la route du Limpertsberg et du Rollingergrund. BL. ! Mondorf. EF.  
Manque sur de grands espaces.

905) *C. solstitialis*. (*L. Sp.* 1297) . . . . . EF. 192.

## ① ou ② Juillet-Septembre.

R. Prairies artificielles. Talus du chemin de fer au Wackeberg, entre Gaspe-  
rich, Hollerich et Bonnevoie. (Gœrens ) EF. Bissen, (Mersch-Faber.) !

906) *C. Cyanus*. (*L. Sp.* 1289.) Blc Kuõrblum. . . T. n° 1260.

## ① ou ② Juin-Août. Refl. quelquefois à l'automne.

C. Champs, moissons, prairies artificielles.

907) *C. montana*. (*L. Sp.* 1289) . . . . . T. n° 1261.

## ‡ Juillet-Août.

AR. Bois montueux, lieux ombragés de l'Ardenne entre Wiltz et Kautenbach.  
Feschertunnel (Kautenbach ) BL. ! Stolzenbourg. EF.

908) *C. Scabiosa*. (*L. Sp.* 1291) . . . . . T. n° 1259.

## ‡ Juin-Août.

C. Coteaux calcaires, arides, bords des chemins, pâturages.

909) *C. maculosa*. (*Lam. Ency.* 1. 669) . . . . . Wtg. p. 692.

## ‡ Juillet-Septembre.

R. Lieux incultes, exposés au soleil, ravins, murs de la vallée de la Moselle  
de Schengen à Wasserbillig. Wtg.

910) *C. Jacea*. (*L. Sp.* 1293.) Hartknep. . . . . T. n° 1255.

## ‡ Juillet-October.

C. Prés secs, pelouses, coteaux herbeux, lisjères des bois.

Var. *β. pratensis*. (*Thuill. Fl. Par.* 441.)

C. Prairies et bois de la Moselle.

Var. *γ. serotina*. (*Boreau. Fl. Cent. Fr.* 1330). . . T. n° 1255*d*.

## ‡ Juillet-October.

AR. Lieux secs, pelouses montagneuses. Mondorf, Moselle. A. EF. Kz.

Var. *δ. angustifolia*. (*Rehb.*) *Duboisii*. (*Boreau. l. c.* 1328.)

[T. n° 1255*c*.

R. Lieux secs, bords des chemins.

Var. *ε. decipiens*. (*Thuill. fl. par. ed.* 2. 445.)

AR. Avec le type dans les prairies.

911) *C. nigrescens*. (*Willd. Sp.* 3. 2288) . . . . . T. n° 1256.

## ‡ Juillet-Août.

AC. Prés secs, pelouses des coteaux de la Moselle où on le confond avec *C. Jacea*,

Var. *β*.



912) ? *C. phrygia*. (*L. Sp.* 1287) . . . . . T. n° 1258.  
 24 Juillet-Août.

R. Prés montagneux, bois, par place. Angelsberg. T.

913) *C. nigra*. (*L. Sp.* 1288) . . . . . T. n° 1257.  
 24 Juillet-Août.

AR. Lieux montueux de l'Ardenne. R. ailleurs.

**347. Echinops.** (*L. Gen.* 453.) — Echinops. — Kugeldistel.

914) † *E. spærocephalus*. (*L. Sp.* 1314) . . . . . EF. n° 194.  
 24 Juillet-Août.

AC. Cultivé et subspontané dans le voisinage des habitations. Bellevue. (Courtois).

Trihu H. — *Corymbifera*. (*Vaill. Juss. Gen.* 177.)

*Sous-tribu I. — Helianthea.* (*Lessing, syn.* 205)

**348. Bidens.** (*L. Gen.* 412.) — Bident. — Wasserdost.

915) *B. tripartita*. (*L. Sp.* 1165.) Strèpatsch . . . T. n° 1215.  
 ① Juillet-Septembre.

C. Bords des eaux, étangs, fossés, marais.

916) *B. cernua*. (*L. Sp.* 1165) . . . . . T. n° 1216.  
 ① Août-Septembre.

C. Lieux humides, marécageux, fossés, bords des étangs et des rivières.

Var.  $\beta$ . *radiata*. (*DC. Coreopsis bidens. L. Sp.* 1281.) T. n° 1216b.

AR. Avec l'espèce.

Var.  $\gamma$  *minimus*. (*L. Sp.* 1281) . . . . . T. n° 1216c.

R. Avec l'espèce.

**349. Helianthus.** (*L. Gen.* 978 *ex parte.*) Hélianthe. Sonnenblume.

917) † *H. annuus*. (*L. Sp.* 1276.) Sonneblum. . . . . EF. 195.  
 ① Juillet-Septembre.

C. Cultivé dans les jardins, quelquefois subspontané.

918) † *H. tuberosus*. (*L. Sp.* 1277.) Russesch Kromper. T. n° 1263.  
 24 Septembre-Octobre.

Quelquefois cultivé dans les terrains sablonneux et alors aussi subspontané.

919) † *H. rigidus*. (*Desf. Cat. éd. 3.* 184.)

24 Septembre-Octobre.

Cultivé pour l'ornementation. Subspontané en 1871 dans les anciens remparts depuis le Breitenweg jusqu'au Pfaffenthal. BL.!

**350. Madia.** (*Mol. chil. ed. germ.* 113.) — Madie.

920) † *M. sativa*. (*Mol. l. c.*) . . . . . EF. 197.

① Juillet-Août.

Autrefois cultivé en grand comme oléagineux.

- 351. Achillea.** (*L. Gen.* 435.) — Achillée. — Tausendgarbe.  
 921) *A. Millefolium.* (*L. Sp.* 1267.) Kätzekraut. Tausend-  
 schäärchen. . . . . T. n° 1253.  
 2 Juin-Octobre.  
 C. Lieux incultes, bords des chemins, champs cultivés, moissons.  
 Var.  $\beta$ . *setacea.* (*Wald. et Kitt. pl. rar. hung.* 1. 80.)  
 R. Collines arides en plein soleil.  
 922) *A. Ptarmica.* (*L. Sp.* 1266) . . . . . T. n° 1254.  
 2 Juillet-Septembre.  
 AC. Bords des eaux, prairies humides, fossés.
- 352. Ormenis.** (*J. Gay. in Fl. Par. éd. 1. 397.*) — Ormenide.  
 — Edelkamille.  
 923) † *O. nobilis.* (*J. Gay. l. c. p.* 398.) Kamëleblum.  
 2 Juillet-Août.  
 AC. Cultivé dans les jardins et quelquefois subspontané. Oseraie à Clausen. Kz.
- 353. Anthemis.** (*L. Gen.* 434 *ex parte.*) Anthémide. Hundskamille.  
 924) *A. arvensis.* (*L. Sp.* 1261) . . . . . T. n° 1250.  
 ① ou ② Juin-Septembre.  
 C. Jachères, moissons. R. Ardennes.  
 925) *A. Cotula.* (*L. Sp.* 1261.) Hondskamëleblum. T. n° 1251.  
 ① Juin-Septembre.  
 C. Jachères, moissons, bords des chemins.  
 926) *A. tinctoria.* (*L. Sp.* 1263) . . . . . T. n° 1252.  
 2 Juillet-Septembre.  
 AC. Coteaux secs, bords des chemins, vieux terrys sur l'oolite ferrugineuse depuis Dudelange jusqu'à Belvaux. Kz.
- Sous-tribu II. — Anthemideæ.** (*Koch, syn.* 401.)
- 354. Matricaria.** (*L. Gen.* 432.) — Matricaire. — Kamille.  
 927) *M. Chamomilla.* (*L. Sp.* 1256.) Kamëleblum. T. n° 1218.  
 ① Mai-Juillet.  
 C. Moissons, lieux cultivés, etc.  
 Var.  $\beta$ . *suaveolens.* (*DC. Pr. t.* 521) . . . . . T. n° 1219.  
 AR. Champs entre Dommeldange et Walferdange.  
 928) *M. inodora.* (*L. fl. Suec.* 297.) Méderchesblum. *M. pyre-*  
*thrum* . . . . . T. n° 1220.  
 ① ou ② Juin-Septembre.  
 AC. par place Lieux pierreux, bords des chemins, jachères, moissons. R. Ar-  
 dennes, Esch s/S. T. Manque aux environs de Wiltz.

**355. Pyrethrum.** (*Gærtn. Fruct. II. 430. t. 169. f. 1.*) — Pyrèthre. — Winterblume.

929) *P. Leucanthemum.* (*C. et G. Fl. Par. 1. 401.*) Gehânesblum.  
 2 Mai-Août.

C. Lieux herbeux, prairies naturelles et artificielles, pâturages, bois.

Var. *β. canescens.* (*Lej. R. Fl. Spa.*)

AR. Avec l'espèce près du Friedbüsch, Diekirch (Courtois).

930) *P. Parthenium.* (*Smth. Brit. II. 900.*) Mutterkraut.

2 Juin-Août. [T. n° 1221.

C. par place. Ardennes. Décombres, bords des chemins et des eaux, bois, lieux cultivés. R. ailleurs.

931) ? *P. corymbosum.* (*Willd. Sp. III. 2155.*) Wtg. Prod. 683.

2 Juin-Août.

R. Coteaux et montagnes calcaires de la Sûre. Rosport. T.

932) † *P. sinense.* (*Sabin, trans. hort. soc. 4. 330. t. 14.*) Chrysanthèm.

2 Octobre-Novembre.

C. Cultivé dans les jardins et les cimetières, assez souvent subspontané.

**356. Chrysanthemum.** (*DC. Prod. VI. 63.*) — Chrysanthème.  
 — Wucherblume.

933) *Ch. segetum.* (*L. Sp. 1254.*) Veitgesblum. Rengelblum.

① Juin-Septembre. [T. n° 1223.

AC. Lieux cultivés et moissons des Ardennes. C. Rambrouch, Bildsorf. R. ailleurs. Gare de Rumelange (1871.) Kz.

**357. Bellis.** (*L. Gen. 429.*) — Paquerette. — Maasliebchen.

934) *B. perennis.* (*L. Sp. 1248.*) Mâgrêthen. . T. n° 1217.

2 Toute l'année, hors le temps des grands froids et des fortes chaleurs.

C. Bords des chemins, pelouses, pâturages, prairies, bois, etc.

Var. *β. caulescens.* (*Lej. R. Spa. 1251.*) Silvestris. (*Cyroll.*)

AR. Bois montueux de la Sûre. [T. n° 1217c.

**358. Artemisia.** (*L. Gen. 418.*) — Armoise. — Beifuss.

935) † *A. Dracunculus.* (*L. Sp. 1189.*) Estragon. EF. 206.

2 Mai-Juin.

C. Cultivé dans les jardins, quelquefois subspontané. Pulvermühl. Kz.

936) *A. vulgaris.* (*L. Sp. 1188.*) Wesch. Beiföss. Wele

Batter Alzem . . . . . T. n° 1200.

2 Juillet-October.

C. Lieux incultes, décombres, bords des chemins, haies, buissons, bois.

937) **A. Absinthium.** (*L. Sp.* 1188.) Batter Alzem. T. n° 1198.  
 4 Juillet-Septembre.

AC. par place. Rochers, coteaux arides, bords des chemins. Bellevue. (Courtois). Bock. BL. ! Ruines du château d'Eschs/S. (Courtois). Schuttbourg A. EF. Kz.

938) **A. campestris.** (*L. Sp.* 1185). . . . . T. n° 1199.  
 4 Juillet-Octobre.

R. Bords des chemins, murs, coteaux arides, secs : Moselle, Remerschen. T.

939) ? **A. pontica.** (*L. Sp.* 1187) . . . . . T. n° 1201.  
 4 Juillet-Août.

R. Coteaux arides, bords des chemins, subspontané. Beaufort. T.

**359. Tanacetum.** (*L. Gen.* 944 *ex parte.*) Tanaïsie. Rainfarn.

930) **T. vulgare.** (*L. Sp.* 1148.) Wurmkraut . . . T. n° 1202.  
 4 Juillet-Septembre.

C. Bords des eaux et des chemins, lieux incultes, etc.

941) † **T. Balsamita.** (*L. Sp.* 1148) . . . . . EF. 203.  
 4 Juillet-Septembre.

C. Cultivé dans les jardins comme remède populaire et souvent subspontané sur les murs.

**360. Tajetes.** (*Tournf. Inst.* 488.) — Tajetes. — Sammtblume.

942) **T. patula.** (*L. Sp.* 1249.) Stenkigen Höfert.

② Juillet-Septembre.

C. Cultivé de tout temps en plusieurs variétés.

**361. Calendula.** (*L. Gen.* 446 *ex parte.*) Souci. Ringelblume.

943) **C. arvensis.** (*L. Sp.* 1303) . . . . . T. n° 1264.

① Juin-Septembre.

R. sporadique. Champs et vignes, lieux cultivés. Bissen, Ospern, Simmern. T. Vallée de la Haute-Moselle. T. Wtg.

944) † **C. officinalis.** (*L. Sp.* 1304.) Krêrfechsblum. T. n° 1265.

① Juillet-Octobre.

C. Cultivé sur les cimetières et souvent subspontané dans leur voisinage.

**362. Micropus.** (*L. Gen.* 451.) — Micrope.

945) ? **M. erectus.** (*L. Sp.* 1313). . . . . T. n° 1214.

① Juin-Août.

R. Coteaux arides, champs maigres et pierreux. Greisch. T.

**sous-tribu III. — Gnaphalleæ.** (*Lessing. syn.* p. 269.)

**363. Helichrysum.** (*Gærtn. Fruc.* 2. 404.) — Immortelle. — Immerschön.

946) *H. arenarium*. (DC. *fl. Fr.* 4. 130.) Eweg Bliemchen.

‡ Juillet-Octobre.

[T. n° 1204.

AR. Bords des chemins, coteaux stériles. Echternach. (Brimmeyr père). Grünwald. T. Bellevue, Diekirch, (Courtois).

**364. Gnaphalium.** (*L. Gen.* 946 *ex parte.*) Gnaphale. Ruhrkraut.

947) *G. silvaticum*. (*L. Sp.* 1200) . . . . . T. n° 1205.

‡ Juillet-Septembre.

C. Bois secs, pâturages, bords des chemins.

948) *G. luteo-album*. (*L. Sp.* 1196.) Goldblum. T. n° 1207.

① Juillet-Septembre.

AC. par place. Champs sablonneux un peu humides, bords des fossés. Eisenbourg. BL. Stenigerberg. (Altwies.) Kz.

949) *G. uliginosum*. (*L. Sp.* 1200) . . . . . T. n° 1206.

① Juillet-Octobre.

C. Champs et chemins humides, lieux inondés l'hiver, fossés, bords des eaux.

Var. *β. nudum*. (*Hoff.*) . . . . . T. n° 1206b.

Avec l'espèce.

**365. Antennaria.** (*R. Br. in Lin. trans.* VII. 122.) Antennaire.

Katzenpfötgen.

950) *A. dioica*. (*Gærtn. Fruct.* II. 410. t. 167. f. 3.) Engelsbliemchen . . . . . T. n° 1208.

‡ Mai-Juin.

C. Coteaux arides, bruyères, pâturages des terrains sablonneux.

**366. Filago.** (*Tournf. Inst.* 259 *ex parte.*) — Cotonnière. — Pfötgen.

951) *F. germanica*. (*L. Sp.* 1311) . . . . . T. n° 1209.

① Juillet-Septembre.

C. Champs secs, lieux incultes, arides, vignes.

Var. *β. pyramidata*. (*Gaud. auct. Germ. non L.*) . . . . . T. n° 1210.

Avec l'espèce.

952) ? *F. gallica*. (*L. Sp.* 1312) . . . . . T. n° 1212.

① Juillet-Août.

R. Vignes, champs secs et sablonneux après la moisson. Plante fugace indiquée par T. et introduite avec des graines étrangères (à rechercher).

953) *F. minima*. (*Fries. novit. ed.* 2. p. 268.) *F. montana*. (DC. *Pr.* 6. 248) . . . . . T. n° 1213.

① Juillet-Septembre.

AC. Lieux sablonneux, champs en friche, bruyères, bords des chemins, etc. Manque sur de grands espaces.

- 954) *F. arvensis*. (*L. Sp.* 4342) . . . . . T. n° 1214.  
 ① Juillet-Septembre.  
 C. Champs secs, sablonneux, arénacés, lieux arides, aussi en Ardennes.
- 367. Pulicaria.** (*Gærtn. Fruct. II.* 461.) Pulicaire. Flöhkraut.  
 955) *P. dysenterica*. (*Gærtn. Fruct. II.* 462.) Inula. Domerian.  
 ② Juillet-Septembre. [T. n° 1228.  
 C. Fossés, lieux frais et humides, bords des eaux.  
 956) *P. vulgaris*. (*Gærtn. Fruct. II.* 461) . . . . . T. n° 1229.  
 ① Juillet-Septembre.  
 AR. Lieux inondés l'hiver, berges des rivières, bords des fossés et des chemins humides. Ardennes.
- 368. Inula.** (*L. Gen.* 426 *emend.*) — Inule. — Alant.  
 957) *I. Conyza*. (*DC. Prod. V.* 464.) *Conyza squarrosa*. (*L.*)  
 ② Juillet-Septembre. [T. n° 1203.  
 C. Bords des chemins, coteaux arides, lisière des bois.  
 958) *I. salicina*. (*L. Sp.* 1238) . . . . . T. n° 1230.  
 ② Juin-Août.  
 AC. Clairières des bois secs, pâturages montueux de la Moselle, de la Sûre. (*Sch.*) T. ! R. ailleurs.  
 959) *I. britanica*. (*L. Sp.* 1237) . . . . . T. n° 1226.  
 ② Juillet-Septembre.  
 AC. Bords des eaux, prairies humides, fossés de la Moselle, surtout vers Mertert. BL. !
- 369. Solidago.** (*L. Gen.* 423 *ex parte.*) Solidage. Goldrute.  
 960) *S. Virga-aurea*. (*L. Sp.* 1235.) Pëterstâf . . . . . T. n° 1233.  
 ② Juillet-Septembre.  
 C. Lisières et clairières des bois, taillis, buissons, pâturages.  
 Var. *β. alpestris*. (*Wald. et Kit. pl. rar. h.* 208). . . . . T. n° 1234.  
 R. Bois montueux des Ardennes. Rambrouch. T.  
 961) † *S. canadensis*. (*L. Sp.* 1233). . . . . EF. 211.  
 ② Août-Septembre.  
 Cultivé et quelquefois subspontané près des habitations et des cours d'eau.
- 370. Erigeron.** (*L. Gen.* 422 *ex parte.*) Vergerette. Dürrewurz.  
 962) *E. acre*. (*L. Sp.* 1211.) Greiskraut . . . . . T. n° 1234.  
 ② Juillet-Septembre.  
 C. Vieux murs, coteaux arides, pelouses sèches, bois sablonneux.  
 Var. *β. serotinum*. (*Weihe. Rechb. fl. exc.* 239.)  
 C. Avec l'espèce.

963) *E. canadense*. (*L. Sp.* 1209). . . . . T. n° 1232.

① Juillet-October.

C. Manque sur de grands espaces. Décombres, vieux murs, bords des chemins, champs en friche des environs de Luxembourg. R. En Ardennes.

**371. *Stenactis*.** (*Nees, ast.* 273) — Stenactide. — Feinchen.

964) ? *S. annua*. (*L. Sp.* 1249). . . . . T. n° 1247.

② ou 4 Juillet-Août.

R. Bords des chemins, haies, pelouses, lisières des bois. Remich. T. près Schengen. (Hollandre).

**372. *Aster*.** (*L. Gen.* 424.) — Aster. — Aster.

965) *A. Amellus*. (*L. Sp.* 1226) . . . . . T. n° 1246.

4 Juillet-September.

AC. Clairières des bois pierreux, bords des chemins. Manternach. R. Echternach, Rosport. T. Fels. (Schengen.) BB. !

966) *A. dumosus*. (*L. Sp.* 1227). . . . . T. in Wrtg. Prod. 636.

② Septembre-October.

R. Bords de la Moselle près Grevenmacher. (Wtg. T. Fl. R. p. 240 n° 11).

967) ? *A. leucanthemus*. (*Desf. Cat. hort. par. ed.* 3. 401.)

4 Août-September.

R. Bords des eaux : Sûre Diekirch. Md. Moselle. (Günther.) fide Lej.

968) † *A. floribundus*. (*Willd. Sp.* 3. p. 2048) . . . EF. 213.

4 Septembre-Novembre.

C. Cultivé dans les cimetières, les jardins et souvent spontané dans les haies et près des habitations.

969) † *A. sinensis*. (*L. Sp.*) Reine-Marguerite. Aster.

① Août-September.

C. Cultivé en nombreuses variétés et souvent spontané dans le voisinage des habitations.

**373. *Linomyris*.** (*DC. Prod.* V. 351.) — Linomyris. — Goldhaar.

970) *P. vulgaris*. (*DC. l. c.*) Chrysocoma. L. . . . T. n° 1177.

4 Août-September.

R. Rochers, coteaux arides, pâturages, bois taillis. Moselle. Sch. T.

**374. *Arnica*.** (*L. Gen.* 427 *ex parte.*) — Arnica. — Wohlverleih.

971) *A. montana*. (*L. Sp.* 1245.) Feierblum.

4 Juin-Juillet.

AC. par place. Prairies, pâturages, bruyères, clairières des bois. Ardennes. Rambrouch. T. Bochlholz. DW. Echternach (Brimmeyr père). Beaufort. Kz.

**375. Cineraria.** (*L. Gen. 426 ex parte.*) — Cinéraire. — Blutze.

972) *C. spatulæfolia.* (*Gmel. bad. 3. 454.*) Cinerair. T. n° 1235.

‡ Avril-Mai.

AR. Rochers ombragés des côtes de la Haute-Sûre et de la Wiltz. T. Entre Erpeldange et Michelau. EF. Kz.

**376. Senecio.** (*L. Gen. 424.*) — Seneçon. — Baldgreis.

973) *S. vulgaris.* (*L. Sp. 1216.*) Huneknepp. Kreizkrêtgen.

① Fleurit presque toute l'année. [T. n° 1236.

C. Lieux cultivés, jardins, décombres, villages, etc.

974) *S. viscosus.* (*L. Sp. 1217*) . . . . . T. n° 1237.

① Juin-Août.

AR. Lieux incultes, bords des chemins et des rivières, berges des chemins de fer, bois. Wasserbillig. BL! Bettembourg. A. EF. Kz.

975) † *S. silvaticus.* (*L. Sp. 1217*) . . . . . T. n° 1238.

① Juillet-Août.

AC. Bois sablonneux, pâturages secs, bords des chemins. Ardennes.

976) *S. erucæfolius.* (*L. Sp. 1218*) . . . . . T. n° 1241.

‡ Août-Septembre.

AC. Haies, lisières des bois, pâturages montueux des terres fortes.

977) *S. Jacobæa.* (*L. Sp. 1219*) . . . . . T. n° 1239.

② ou ‡ Juillet-Septembre.

C. Pâturages, prairies, bois, bords des champs et des eaux.

978) *S. aquaticus.* (*Huds. fl. Ang. 366*) . . . . . T. n° 1240.

‡ Juin-Août.

AR. Lieux marécageux, prairies, bois humides, bords des eaux.

979) *S. nemorensis.* (*L. Sp. 1221*) . . . . . T. n° 1243.

‡ Juillet-Août.

R. Bois et prés montueux de l'Ardenne.

980) *S. Sarracenicus.* (*L. Sp. 1221*) . . . . . T. n° 1245.

‡ Juillet-Août.

R. Oseraies de la Moselle. T.

981) *S. Fuchsii.* (*Gmel. Fl. Bad. Als. III. 444.*)

‡ Juillet-Août.

AC. Bois humides, cours d'eaux sous bois.

982) *S. ovatus.* (*Willd. Sp. 3. 2004*) . . . . . T. n° 1244.

‡ Juillet-Août.

R. Bois ombrageux. Dommeldange. T.

**377. Dahlia.** (*Cav. icon. v. 1. p. 57. t. 80.*) Dahlia. Georgine.



983) † *D. variabilis*. (*Desf. cat. h. par. ed. 3. 182.*)

‡ Août-Octobre.

C. Cultivé en nombreuses variétés. Introduit dans les jardins. 1840.

**378. Eupatorium.** (*Tournef. Inst. 259.*) — Eupatoire. — Künigundenkraut.

984) *E. cannabinum*. (*L. Sp. 1173.*) Abkraut . . . T. n° 1176.

‡ Juillet-Septembre.

C. Fossés, bords des eaux, lieux humides et marécageux.

**379. Tussilago.** (*L. Gen. 952 ex parte.*) Tussilage. Huflattig.

985) *T. Farfara*. (*L. Sp. 1214.*) Ieselsföss. Lehmlât. T. n° 1248.

‡ Février-Avril.

C. Fossés, champs humides, bords des chemins des terrains calcaires. R. Ardennes.

**380. Petasites.** (*Tournef. Inst. 258.*) — Petasite. — Pestwurz.

986) *P. officinalis*. (*Mönch. meth. 568.*) Tussilago. T. n° 1249.

‡ Mars-Avril.

AC. Bords des eaux, prairies humides. R. Ardennes.

Sous-ordre II. — Ligulifloræ. (*Endl. gen. 493.*)

Tribu I. — Lampsanæ. (*Lessing. syn. 128.*)

**381. Lampsana.** (*L. Gen. 919 ex parte.*) — Lampsane. — Milche.

987) *L. communis*. (*L. Sp. 1141.*) Huðsemös . . . T. n° 1122.

① Juin-Août.

C. Bois, lieux cultivés.

**382. Arnoseris.** (*Gærtn. Fruct. II. 355.*) Arnoséris. Lammkraut.

988) *A. minima*. (*Koch, syn. fl. Germ. ed. 1. 416.*) Hyoseris m.

① Juin-Août. [T. n° 1123.

AC. Champs sablonneux, mais manque sur de grands espaces. C. en Ardennes.

**383. Cichorium.** (*L. Gen. 921.*) — Chicorée. — Wegwarte.

989) *C. Intybus*. (*L. Sp. 1142.*) Weĵe Chikorč. . . T. n° 1173.

‡ Juillet-Août.

C. Bords des chemins, pâturages secs, coteaux arides.

990) *C. Endivia*. (*L. Sp. 1142.*) Andiv . . . T. n° 1174.

② Juillet-Octobre.

C. Cultivé.

Tribu II. — Leontodontæ. (*C. II. Schultz. in Koch. syn. 479.*)

**384. Hypochaeris.** (*L. Gen. 918.*) — Porcelle. — Ferkelkraut.

991) *H. glabra*. (*L. Sp.* 1140) . . . . . T. n° 1172.

① Juillet-Août.

AR. Lieux sablonneux, champs après la moisson, coteaux arides. Waldhof. BL.!

992) *H. radicata*. (*L. Sp.* 1140) . . . . . T. n° 1171.

② ou ¼ Juillet-Septembre.

C. Bords des chemins, prairies, lisières des bois.

993) *H. maculata*. (*L. Sp.* 1140) . . . . . T. n° 1170.

¼ Juin-Juillet.

R. Prairies, pâturages des Ardennes.

**385. *Thrinicia*.** (*Roth. Cat. bot. I.* 97.) — Trincie. — Zinnensaat.

994) *T. hirta*. (*Roth. Cat. bot. I.* 98) . . . . . T. n° 1158.

② ou ¼ Juillet-Septembre.

C. Champs en friche, jaellères, bords des chemins, pelouses, etc.

**386. *Leontodon*.** (*L. Gen.* 912 *ex parte.*) Lion-dent. Löwenzahn

995) *L. hispidus*. (*L. Sp.* 1124) . . . . . T. n° 1156.

¼ Juin-Septembre.

C. Bois, pâturages, prairies, lieux incultes, etc.

996) *L. hastilis*. (*L. Sp.* 1123) . . . . . T. n° 1155.

¼ Juin-Juillet.

AC. Lisières et clairières des bois, prairies. Longsdorf, Diekirch. L. et C. 1397.

997) *L. autumnalis*. (*L. Sp.* 1123) . . . . . T. n° 1157.

¼ Juillet-October.

C. Lieux cultivés, prairies.

**387. *Picris*.** (*Juss. Gen.* 170.) — Picride. — Bitterich.

998) *O. hieracioides*. (*L. Sp.* 1115) . . . . . T. n° 1159.

② Juillet-Septembre.

AR. Bords des chemins, champs en friche, moissons des terres fortes, calcaires. Rodenhof (Kopstal.) BL.!

**388. *Helminthia*.** (*Juss. Gen.* 170.) Helminthe. Wurmkrant.

999) *H. echioides*. (*Gærtn. Fr. II.* 159) . . . . . T. n° 1160.

① Juillet-October.

R. Champs en friche, bords des chemins et des fossés. Remich. T. Luxemb. EF.

**389. *Tragopogon*.** (*L. Gen.* 905.) — Salsifis. — Haferwurz.

1000) † *T. porrifolius*. (*L. Sp.* 1110.) Salsifis. Weisswurz.

② Juin-Juillet. [T. n° 1163.

AC. Cultivé pour ses racines blanches.

1001) *T. major*. (*Jacq. Aust. l. c.* 29). . . . . T. n° 1162.

## ② Juin-Juillet.

R. Coteaux pierreux, prés secs, bords des chemins, environs de Lintgen. T.  
1002) *T. orientalis*. (*L. Sp.* 1169) . . . . . L. 742.

## ② Mai-Juillet.

AC. Prairies fertiles de la vallée de la Moselle. BB. ! Pulvermühl, ! etc.

1003) *T. pratensis*. (*L. Sp.* 1109.) Bocksbart. Bärtel. T. n° 1161.

## ② Mai-Septembre.

C. Bords des chemins et des fossés, lisières des bois, pâturages, prairies humides. R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *minor*. (*Fries. Novit. fl. succ. ed. 2. p. 241.*)

R. Prairies de la Moselle.

Var.  $\gamma$ . *angustissimus*. (*Dmtr. Prod.* 724) . . . . . T. n° 1161c.

R. Environs de Luxembourg. Md. Dommeldange. T.

Var.  $\delta$ . *undulatum*. (*Jacq. Aust. l. c. 36*) . . . . . T. n° 1161d.

R. avec le type.

**390. Scorzonera.** (*L. Gen.* 906 *ex parte.*)  $\rightarrow$  Scorsonère. —  
Schwarzwurzw.

1004) *S. humilis*. (*L. Sp.* 1112) . . . . . T. n° 1165.

## ‡ Mai-Juin.

AR. Prairies humides, clairières des bois marécageux. Ardennes, Rambrouch.  
T. — R. ailleurs.

Var.  $\beta$ . *angustifolia*. (*L. Sp.* 1113). . . . . T. n° 1166.

AR. Prés humides entre les forges de Fischbach et Kœdange. T. Eisembg. Kz.

Var.  $\beta$ . *Plantaginea*. (*Schleich. ex. Rechb. fl. exc.* 275) T. n° 1165b.

R. avec le type.

1005) *S. hispanica*. (*L. Sp.* 1112.) Scorzoner. Schwarzwurzel.

② Juin-Juillet. [T. n° 1164.

C. Cultivé pour ses racines noires alimentaires. Quelquefois subspontané.  
Bellevue. Kz.

**391. Podospermum.** (*DC. Fl. Fr. IV.* 61.) — Podosperme. —  
Stielsame.

1006) *P. laciniatum*. (*DC. l. c.* 62) . . . . . T. n° 1167.

## ② Juin-Août.

AR. Décombres, vieux murs, coteaux arides, lieux incultes et pierreux. Echternach, (Brimmeyr père.) R. (Schäfer) Clausen. T. Wintringen. L. BB. !  
Beggen, Moselle. T. Nachthum, Ebnen BB Mertert, Wecker. R. Kleeberg entre Remerschen et Schengen. Grevenmacher. BB !

1007) *P. calcitrapifolium*. (*DC. Fl. V. p.* 455.) *P. resedifolium*.

② Mai-Juillet. [T. n° 1168.

R. Coteaux calcaires de la Sûre et de la Moselle. Grevenmacher. T.

1008) *P. muricatum*. (DC. *Fl. Fr.* IV. 411). . . T. n° 1169.

② Juin-Août.

R. Coteaux calcaires de la Moselle. Fels, Wintrange. T.

Tribu III. — Crepoideæ. (*Gren. et God. fl. Fr.* 2. 314.)

**392. Taraxacum.** (*Juss. Gen.* 169.) — Pissenlit. — Kuhlblume.

1009) *T. officinale*. (*Wigg. Prim. fl. Hols.* 56.) Bettséchesch.

Éerblum. Ketteblum. Leontodon *Taraxacum*. T. n° 1153.

‡ Avril-Octobre.

C. Prairies, pelouses, lieux cultivés, bois, bords des chemins, voisinage des habitations.

Var. *β. levigatum*. (DC. *prod.* 7. 146.)

R. Prés et collines sèches.

Var. *γ. udum*. (*Jord. Pug.* 114.)

AR. Prairies humides, avec le type.

Var. *δ. arcuatum*. (*Tausch. fl.* 1821. 2. 567) . . T. n° 1153b.

C. Pelouses montueuses.

1010) *T. paludosum*. (*Scop. Fl. Carn.* 2. 100) . . T. n° 1154.

‡ Mai-Septembre.

AR. Manque sur de grands espaces. Prairies humides, bois marécageux.

**393. Chondrilla.** (*L. Gen.* 910.) — Chondrille. — Krümling.

1011) *C. juncea*. (*L. Sp.* 1120). . . . . T. n° 1151.

② Juin-Août.

R. Champs arides, lieux pierreux, bords des chemins. Environs du cimetière de Clausen. T. Côtes de la Moselle. T. Lej. et C. 1338.

**394. Prenanthes.** (*L. Gen.* 911.) — Prenanthe. — Hasenlattich.

1012) *P. purpurea*. (*L. Sp.* 1121) . . . . . T. n° 1125.

‡ Juillet-Août.

R. Bois montueux, ombragés. Müllerthal, (Beaufort). (Courtois.) T. Dmtr. P. 686.

**395. Lactuca.** (*L. Gen.* 909.) — Laitue. — Lattich.

1013) *L. muralis*. (*L. Sp.* 1121.) *Prenanthes muralis*. T. n° 1152.

① Juin-Septembre.

C. Bois montueux, chemins creux, rochers, vieux murs. R. Ardennes.

1014) *L. perennis*. (*L. Sp.* 1120) . . . . . T. n° 1150.

‡ Juin-Juillet.

AR. Champs calcaires, coteaux arides, taillis montueux, rochers, terry de minières. Côtes de la Sûre, Echternach (Brinmeyr, père), de la Moselle, Stromberg. BL.! Dudelage. T. Johannisberg. BL.! Wasserfall (Schiffange.) Kz.

- 1015) *L. saligna*. (*L. Sp.* 1119) . . . . . T. n° 1149.  
 4 Juin-Juillet.

AC. par place. Moissons, jachères, lieux incultes le long des chemins. Wintrauge, entre Stadtbredimus et Ehnen. BB.! Moselle. T. Entre Ettelbruck et Mersch. T. Reckingen et Finsterthal. BL.!

- 1016) *L. Scariola*. (*L. Sp.* 1119.) *L. silvestre*. . . T. n° 1147.

② Juin-Août.

AC. Manque sur de grands espaces. Bords des chemins, lieux incultes, terres remuées de la partie sud du pays. C. A l'ouest et au midi de l'ancienne forteresse de Luxembourg. BL.!

- 1017) † *L. sativa*. (*L. Sp.* 1118.) Blföderzalôt. . . T. n° 1146.

② Juin-Septembre.

Var.  $\beta$ . *capitata*. (*Bauhin. pin.* 123.) Héderzalôt.

Var.  $\gamma$ . *Romana*. (*Bauhin. trist.* 2. 998.) Chicon.

Var.  $\delta$ . *crispa*. (*Bauhin. trist.* 2. 998.) Wantererep.

C. Cultivé et souvent subspontané au voisinage des habitations.

- 1018) *L. virosa*. (*L. Sp.* 1119) . . . . . T. n° 1148.

② Juillet-Août.

R. Bords des chemins, bois montueux. Schuttbourg. DW. Esch s/S. (Courtois). Neudorf. T. Mont St-Jean. Kz.

**396. Sonchus.** (*L. Gen.* 908.) — Laiteron. — Saudistel.

- 1019) *S. oleraceus*. (*L. Sp.* 1116.) Saudeschtel . . T. n° 1126.

① Juin-Septembre.

C. Lieux cultivés, moissons, friches, bords des chemins, vieux murs.

Var.  $\beta$ . *lacerus*. (*Wall. Sched. crit.* 432.)

C. avec l'espèce.

- 1020) *S. asper*. (*Vill. Fl. Dauph. III.* 158) . . . T. n° 1127.

① Juillet-Septembre.

C. Bords des chemins, friches, lieux cultivés, moissons.

- 1021) *S. arvensis*. (*L. Sp.* 1116) . . . . . T. n° 1128.

4 Juillet-Septembre.

AC. Moissons, lieux cultivés, vignes, endroits pierreux, bords des chemins et des eaux.

**397. Barkhausia.** (*Mönch. meth.* 539.) — Barkhausie.

- 1022) *B. foetida*. (*DC. Fl. Fr. IV.* 42) . . . . . T. n° 1143.

① Juin-Août.

C. Bords des chemins, vieux murs, lieux arides, décombres, champs en friche, vignes. R Ardennes.

Var.  $\beta$ . *prostrata*. (*Dmtr. Pr. Fl. B.* 671). . . . T. n° 1144.

AR. Avec l'espèce dans les champs secs.

Var.  $\gamma$ . *gracilis*. (*Lej. Rev. fl. Spa.* 249) . . . . T. n° 1145.

AR. Lieux arides aux environs de Dudelange. C'est sur des échantillons de cette localité que l'espèce fut créée.

1023) *B. taraxacifolia*. (*Thuil. fl. par.* 2. 1. p. 409.)

② Avril-Juillet.

R. Prés secs, lieux arides des terres calcaires.

**398. Crepis.** (*L. Gen.* 914 *ex parte.*) — Crépide. — Grundfeste.

1024) *C. præmorsa*. (*Tausch. bot. Zeit.* II. 1.) Hieracium.

‡ Mai-Juin.

[T. n° 1129.

R. Bois, prairies. Fels (Schengen.) T. Greiveldange. Md. Schrassig, Bereldange. T.

1025) *C. pulchra*. (*L. Sp.* 1134.) *Prenanthes hieracifolia*.

① Mai-Juin.

[T. n° 1124.

R. Champs sablonneux, bords des chemins, vignes. Machthum. BB ! Ehnen, Wiltz, Esch s/S. T. Grevenmacher, Merttert. R. Mandelbach. DW.

1026) *C. paludosa*. (*Mönch. meth.* 535.) Hieracium p. T. n° 1137.

‡ Juin-Août.

C. Prairies humides, marécageuses, ravins des bois, bords des eaux en Ardennes. R. Ailleurs, entre Marienthal et Ansembourg. DW. !

1027) *C. biennis*. (*L. Sp.* 1136) . . . . T. n° 1138.

② Juin-Juillet.

C. Bords des chemins, pâturages, prairies. AR. Ardennes.

1028) *C. tectorum*. (*L. Sp.* 1135) . . . . T. n° 1139.

① Mai-Juin.

C. Champs sablonneux, lieux cultivés, moissons, murs.

1029) *C. virens*. (*Vill. Fl. Dauph.* III. 142) . . . T. n° 1140.

① Juin-October.

C. Bords des chemins, champs, pelouses, prairies, pâturages, lisières des bois.

Var.  $\beta$ . *pinnatifida*. (*Willd. Sp.* 1604.) *stricta*. (DC.) T. n° 1141.

Avec l'espèce.

Var.  $\gamma$ . *diffusa*. (DC. *Cat. hort. Mons.* 98) . . . T. n° 1142.

Avec l'espèce.

**399. Hieracium.** (*Tournf. Inst.* 267.) — Épervière. — Habichtkraut.

1030) *H. pilosella*. (*L. Sp.* 1125.) Kätzelföss . . T. n° 1130.

‡ Mai-October.

C. Bords des chemins, pelouses, pâturages, bois.

Var.  $\beta$ . *Pelleterianum*. (*Mérot. fl. Par.* 305.)

R. Bois secs, lieux sablonneux.

1031) *H. Auricula*. (*L. Sp.* 1126) . . . . . T. n° 1131.

‡ Juin-Septembre.

AC. Lieux incultes un peu humides, bords des mares et des fossés.

1032) *H. præaltum*. (*Vill. Voy.* 62. t. 2. f. 1) . . . T. n° 1227.

‡ Juin-Juillet.

AC. par place. Vieux murs, bois montueux, coteaux, prairies, vignes.

1033) *H. cæspitosum*. (*D. Pr.* 689.) *H. collinum*. T. n° 1132.

‡ Juin-Juillet.

R. Lieux herbeux, pelouses, lisières des bois de la Moselle. *Stadtbredimus*. T.

1034) *H. murorum*. (*L. Sp.* 1128) . . . . . T. n° 1136.

‡ Juin-Août.

C. Vieux murs, rochers, bois, lieux pierreux, incultes.

Var.  $\beta$ . *petiolare*. (*Jord. in Cat. Gren.* 1849. p. 20.)

Avec l'espèce, entre Hachiville et Clervaux. (Van Bastelaar).

Var.  $\gamma$ . *oblongum*. (*Jord. l. c.*)

Avec l'espèce, bois montueux entre Hachiville et Clervaux. (Van Bastelaar).

Var.  $\delta$ . *petrogenes*. (*Jord. l. c.*)

Avec l'espèce, rochers des bois montueux entre Hachiville et Clervaux (Van Bastelaar).

1035) *H. vulgatum*. (*Fries. novit. fl. suec. ed.* 2. 258.) *H. silvaticum*. (*L.*) . . . . . T. n° 1135.

‡ Juin-Juillet.

C. Bois, taillis.

1036) *H. tridentatum*. (*Fries. Nov. ed.* 2. p. 161.)

‡ Juin-Juillet.

R. Bois du calcaire oolitique. Differdange.!

1037) *H. sabaudum*. (*L. Sp.* 1131) . . . . . T. n° 1133.

‡ Août-Octobre.

AC. Bois, buissons, lieux incultes.

1038) *H. boreale*. (*Fries. Nov. ed.* 2. p. 161). . . . L. 783.

‡ Juillet-Octobre.

C. Bois, buissons, prairies arborées.

1039) *H. umbellatum*. (*L. Sp.* 1131). . . . . T. n° 1130.

‡ Juillet-Août. Refl. Automne.

C. Lisières et clairières des bois, prairies, pâturages, bords des chemins.

LXXXVI. AMBROSIACEAE.

(*Link. Handb.* I. 816.) [XXI, 5.]

400. *Xanthium*. (*Tournf. Inst.* 252.) Lampourde. Spitzklette.

1040) *X. strumarium*. (*L. Sp.* 1400) . . . . . T. n° 1368.

① Juillet-October.

AR. Décombres, lieux incultes, bords des chemins, berges des rivières. Wasserbillig, Moselle. BL.!

### SUBDIVISION III. — Apétales.

#### CLASSE. I. — Apétales non amentacées.

#### LXXVII. AMARANTACEAE.

(*R. Brown. Prod. Nov. Holl. I.* 413.)

**401. *Amarantus*.** (*L. Gen.* 1060.) — Amarante. [XXI, 5.]

1041) *A. Blitum*. (*L. Sp.* 1405) . . . . . T. n° 1367.

① Juillet-Septembre.

R. Villages, lieux cultivés, chemins, pieds des murs, décombres. Wintrange, Echternach. T. (Brimmeyr père).

1042) ? *A. retroflexus*. (*L. Sp.* 1407). . . . . R. Fl. Spa. 1381.

① Juillet-Septembre.

R. Décombres, villages, berges des rivières, champs en friche. Plante très-fugace.

1043) † *A. caudatus*. (*L. Sp.* 1406.) Focksschwanz. EF. 222.

① Juillet-Septembre.

AC. Cultivé et se resème souvent d'elle-même.

1044) † *A. paniculatus*. (*L. Sp.* 1408) . . . . . EF. 223.

① Juillet-Septembre.

C. Cultivé et se resème d'elle-même.

† Var. *β. sanguinosus*. (*L. Sp.* 1408.)

AC. Cultivé et naturalisé aux environs des habitations.

**402. *Polycnemum*.** (*L. Gen.* 53.) — Polycnème. — Knörpeltkraut. [III, 1.]

1045) *P. arvense*. (*L. Sp.* 50) . . . . . T. n° 52.

① Juin-Août.

AR. Champs arides, pierreux, bords des chemins, lieux incultes. Stadtbredimus, environs d'Echternach. T. Vallée de l'Our. Wrgt.

#### LXXVIII. SALSOLACEAE.

(*L. Class. pl.* 507 ex parte)

**403. *Atriplex*.** (*Tournf. Inst.* 286.) — Arroche. — Melde. [V, 2.]

1046) † *A. hortense*. (*L. Sp.* 1493.) Peinetsch . . . EF. 224.

① Juillet-Septembre.

C. Cultivé et souvent subspontané au voisinage des jardins potagers.



Var.  $\beta$ . *rubra*. (*Lej. Rev. Spa.* 1452.)

AC. Cultivé et souvent spontané.

1047) ? *A. nitens*. (*Schk. t.* 348) . . . Dmtr. P. f. B. 149.

① Juillet-Août.

AR. Murs, chemins, décombres, vignes de la Moselle. Dmtr. L. et C. 4911.  
Très-disséminé.

1048) *A. tataricum*. (*L. Sp.* 1493.) *A. oblongifolium*. (*W. et K.*)

① Juillet-Août.

R. Décombres, ruines du château de Vianden. (Courtois).

1049) *A. hastatum*. (*L. Sp.* 1494.) *A. latifolium*. (*Whlbg.*) T. n° 419.

① Juillet-Août.

C. Lieux incultes et cultivés, bords des chemins, décombres.

1050) *A. patulum*. (*L. Sp.* 1494) . . . . . T. n° 420, 421.

① Juillet-October.

C. Villages, voisinage des habitations, bords des chemins, fossés, lieux cultivés et incultes, jachères, décombres, etc.

Var.  $\beta$ . *erectum*. (*Sm. brit.* 1093.)

AC. avec le type.

Var.  $\gamma$ . *oppositifolia*. (*DC. Fl. F. V.* 371). . . . Lj. et C. 492.

R. Bords de la Moselle.

**404. Spinacia.** (*Tournf. Inst.* 308.) Épinard. Spinat. [XXII, 4.]

1051) † *S. glabra*. (*Mill. Dict.* n° 2.) Peinetsch. *S. inermis*. (*M.*)

① ou ② Juin-Septembre. [T. n° 1412.

C. Cultivé dans les jardins et quelquef. spontané au voisinage des habitations.

1052) † *S. oleracea*. (*L. Sp.* 1456 *pro parte.*) Peinetsch. *S. spinosa*. (*M.*) . . . . . T. n° 1411.

① ou ② Juin-Septembre.

C. Cultivé dans les jardins et souvent spontané au voisinage des habitations.

**405. Beta.** (*Tournf. Inst.* 286.) Betterave. Runkelrübe. [V, 2.]

1053) † *B. vulgaris*. (*L. Sp.* 322 *pro parte.*) Rommel. T. n° 422.

② Juillet-Septembre.

Cultivé en diverses variétés.

**406. Chenopodium.** (*Tourn. Inst.* 258 *ex parte.*) — Anserine. Gänsefuss. [V, 2.]

1054) *Ch. polyspermum*. (*L. Sp.* 321.) Scheiskraut. T. n° 417.

① Juin-Septembre.

C. Lieux cultivés, vignes, voisinage des habitations, bords des chemins et des eaux. R. Ardennes.

- Var.  $\beta$ . acutifolium.** (*Kit. apud. Schult. Oestr. Fl. 1. 458. St. h. 75*). . . . . T. n° 418.  
 R. Lieux incultes et rochers près des forges de Berbourg. T.
- 1055) **Ch. Vulvaria.** (*L. Sp. 321*) . . . . . T. n° 415.  
 ① Juillet-October.
- AR. Villages, pied des murs, bords des chemins, lieux cultivés. Manque sur de grands espaces.
- 1056) **Ch. album.** (*L. Sp. 319.*) Scheismfel . . . . . T. n° 411.  
 ① Juillet-October.
- C. Villages, décombres, places à fumier, lieux cultivés, bords des rivières.
- Var.  $\beta$ . viride.** (*L. Sp. 319.*)
- C. Avec l'espèce.
- Var.  $\gamma$ . lanceolatum.** (*Mérat. Fl. Par. éd. 2.*)
- C. avec l'espèce.
- 1057) **Ch. hybridum.** (*L. Sp. 319*) . . . . . T. n° 413.  
 ① Juillet-September.
- AR. Voisinage des habitations, décombres, mardelles des rivières, bords des chemins.
- 1058) **Ch. glaucum.** (*L. Sp. 320*) . . . . . T. n° 414.  
 ① Juillet-September.
- R. Voisinage des habitations, décombres, graviers de la Moselle. Environs de Remich. BB. !
- 1059) **Ch. urbicum.** (*L. Sp. 318*). . . . . T. n° 408.  
 ① Juillet-September.
- AR. Villages, pied des murs, lieux cultivés, décombres, fossés, manque sur de grands espaces.
- Var.  $\beta$ . intermedium.** (*Mert. et Koch. Deutschl. Fl. II. 297.*) L. 1070.  
 R. Avec l'espèce.
- 1060) **Ch. murale.** (*L. Sp. 318*) . . . . . T. n° 410.  
 ① Juillet-September.
- AR. Villages, pied des murs, basses-cours, bords des chemins, décombres.
- 1061) **Ch. opulifolium.** (*Schrad ap. Koch et Ziz. cat. fl. pl. palat. p. 6*) . . . . . T. n° 416.  
 ① Juillet-September.
- R. Pied des murs, décombres, bords des rivières, des chemins. Environs de Remich. T. Château de Vianden. (Courlois) T. Abweiler. EF. Kz.
- 1062) ? **Ch. ficifolium.** (*Sm. Eng. bot. 1. 1724*). . . . . T. n° 412.  
 ① Juillet-September.
- R. Décombres, bords des chemins, lieux cultivés.
- 1063) † **Ch. Scoparium.** (*L. Sp. 321.*) *Kochia Scoparia.* (*Schrad.*)

## ① Juillet-Septembre.

Autrefois cultivé dans les jardins, pour fabriquer des balais.

**407. Blitum.** (*Tournf. Inst.* 288 *emend.*) — Blite. — Erdbeer-spinat. [V, 2.]1064) **B. Bonus-Henricus.** (*Rech. Fl. excurs.* 582.) *Chenopodium.*

① Juillet-Septembre. [T. n° 407.]

AC. par place. Villages, voisinage des habitations, pied des murs, basses-cours, bords des chemins.

1065) **B. rubrum.** (*Rech. fl. excurs.* 582) . . . . T. n° 409.

① Juillet-Septembre.

AR. Villages, pieds des murs, décombres, mardelles des rivières et des étangs.  
R. Château de Vianden. (Courtois.) AC. Environs de Luxembourg.!

## LXXIX. POLYONEAE.

(Juss. Gen. 82.)

**408. Rumex.** (*L. Gen.* 451 *ex parte.*) Rumex. Ampfer. [VI, 3.]Sect. I. — *Acetosa.* (*Tourn. Inst.* 502.)1066) **R. scutatus.** (*L. Sp.* 480). . . . . T. n° 561.

‡ Mai-Août.

AC. Vieux murs, coteaux pierreux, rocailles, rochers, etc. R. Ardennes.

1067) † **R. Acetosa.** (*L. Sp.* 481.) Saueramper. . T. n° 562.

‡ Mai-Juin. Refleurit quelquefois à l'Automne.

C. Lieux herbeux, prairies, lisières et clairières des bois humides. Cultivé dans les jardins.

1068) **R. Acetosella.** (*L. Sp.* 481.) Wele Saueramper. T. n° 563.

‡ Mai-Août.

C. Champs sablonneux, arides, moissons, pâturages, bois, etc.

Sect. II. — *Lapathum.* (*Tourn. Inst.* 504.)1069) **R. obtusifolius.** (*L. Sp.* 478.) Mokesaueramper. T. n° 558.

‡ Juin-Août.

C. Prairies, bords des eaux, lieux frais et ombragés, pied des murs, etc.

Var.  $\beta$ . *purpureus.* (*Poiret. dict.* 5. 163) . . . . T. n° 558b.

R. avec le type.

Var.  $\gamma$ . *silvestris.* (*Wallr. Sched.* 161.) R. microcarpa.

AC. avec le type.

Var.  $\delta$ . *Friesii.* (*Gren. et God. Fl. F. III.* 36.) R. macrocarpa.

R. avec le type.

1070) *R. maritimus*. (*L. Sp.* 478) . . . . . T. n° 559.

① ou ② Juillet-Septembre.

AR. Bords des étangs, fossés, mares, lieux marécageux et humides. Hollerich, Kockelseheuer. T.

1071) *R. palustris*. (*Sm. Fl. Brit. I.* 394). . . . . T. n° 560.

① ou ② Juillet-Septembre.

R. Bords des rivières et des étangs. T. Wrgt.

1072) *R. conglomeratus*. (*Murr. Prod. Gästt.* 52.) *Nemolapathum*.

‡ Juillet-Septembre.

[T. n° 556, 557.

AC. Bois humides, bords des eaux, fossés.

1073) *R. sanguineus*. (*L. Sp.* 476) . . . . . L. 1090.

‡ Juin-Août.

AR. Bois humides, lieux ombragés, bords des eaux, de la Sûre. L.

Var.  $\beta$ . *nemorosus*. (*Schrad. ap. Willd. in h. berol.* 4. 397.) T. n° 554.

Avec l'espèce.

1074) *R. crispus*. (*L. Sp.* 476.) Botterblât . . . . . T. n° 555.

‡ Juin-Août.

C. Bords des chemins, lieux cultivés, moissons, prairies.

1075) † *R. Patientia*. (*L. Sp.* 476.) Èwege Peinetsch. EF. 230.

‡ Juin-Août.

AC. Cultivé dans les jardins pour remplacer les épinards et subspontané au voisinage des habitations.

1076) *R. Hydrolapathum*. (*Huds. Fl. Angl.* 154.) *H. aquaticum*.

(*Auct.*) . . . . . T. n° 553.

‡ Juillet-Août.

C. Bords de la Moselle. AR. Ailleurs, bords des eaux.

1077) *R. maximus*. (*Schreb. in Schweigg. et Kört. Fl. Erlang. I.*

152). . . . . L. 1093.

‡ Juillet-Août.

R. Bords des fossés aquatiques des prairies du calcaire coquillier.

**409. Polygonum.** (*L. Gen.* 495 *ex parte.*) — Renouée. — Knöterich. [VIII, 1.]

1078) † *P. cuspidatum*. (*Sieb. Cat. rais. pl. du Jap.* 1850.) *P.*

*sieboldi*. (*Host.*) . . . . . EF. 232b.

‡ Avril-Septembre.

AC. Cultivé dans les jardins et quelquefois subspontané en leur voisinage.

1079) *P. Bistorta*. (*L. Sp.* 516) . . . . . T. n° 595.

‡ Juin-Juillet.

AR. Prairies humides, bois montueux, tourbeux, en amont du pont de Roodt (Simmern.) DW. C. à partir des prairies de Feulen jusque et y compris les Ardennes.

- 1080) *P. amphibium*. (*L. Sp.* 517) . . . . . T. n° 597.  
 4 Juin-Septembre.  
 AC. Fossés, mares, étangs, lieux marécageux. R. Ardennes.
- 1081) *P. lapathifolium*. (*L. Sp.* 517) . . . . . T. n° 601.  
 ① Juin-Septembre.  
 C. Lieux humides, bords des eaux, lieux humides ou inondés l'hiver.  
 Var. *β. nodosum*. (*Pers. syn. pl. I.* 440) . . . . . T. n° 602.  
 R. Avec l'espèce. Moselle Forges dites des Roehiers près Grevenmacher T.  
 Var. *γ. incanum*. (*Schmidt. bot.* 391) . . . . . T. n° 601c.  
 AC. Avec l'espèce.
- 1082) *P. Persicaria*. (*L. Sp.* 518) . . . . . T. n° 600.  
 ① Juillet-October.  
 C. Lieux humides, bords des eaux, fossés.
- 1083) *P. mite*. (*Schrank. Baier. Fl. I.* 668). . . . . L. 1106.  
 ① Juillet-October.  
 AR. Fossés, lieux humides. Moselle. L.
- 1084) *P. minus*. (*Huds. fl. Angl. I.* 148.) *P. pusillum*. T. n° 599.  
 ① Juillet-October.  
 R. Lieux humides, fossés.
- 1085) *P. Hydropiper*. (*L. Sp.* 517) . . . . . T. n° 598.  
 ① Juillet-September.  
 C. Fossés, lieux humides, marécageux, berges des rivières.
- 1086) *P. aviculare*. (*L. Sp.* 519.) Tenegràs. Weegràs. Tau-  
 sendknütöd . . . . . T. n° 603.  
 ① Juin-October.  
 C. Villages, jardins, bords des chemins, rues peu fréquentées, basses-cours,  
 lieux incultes et cultivés.
- 1087) *P. Bellardi*. (*All. Fl. Ped. I.* 90. f. 2). . . . . T. n° 604.  
 ① Juin-Juillet.  
 R. Champs arides des Ardennes. M<sup>re</sup> Libert. Lj.
- 1088) *P. Convolvulus*. (*L. Sp.* 522). . . . . T. n° 607.  
 ① Juillet-September.  
 C. Champs, lieux cultivés ou en friche, buissons, etc.
- 1089) *P. dumetorum*. (*L. Sp.* 522.) Wel Heedekaar. T. n° 608.  
 ① Juillet-September.  
 C. Haies, buissons, bois. A rechercher en Ardennes.
- 410. Fagopyrum.** (*Tournf. Inst.* 290 *ex parte.*) — Sarrasin. —  
 Buchweizen. [VIII, 1.]

1090) † *F. esculentum*. (*Mönch. meth.* 290.) Welkûor. Heedekaar . . . . . T. n° 605.

① Juin-Août.

AC. Cultivé dans les terres arénacées et souvent spontané.

1091) † *F. tataricum*. (*Gærtn. Fruct. II.* 182.) Greng Heedekaar . . . . . T. n° 606.

① Juin-Septembre.

AC. Cultivé et souvent spontané.

### LXXX. MOREAE.

(*Endl. Prodr. fl. Norf.* 40.) [XXI, 4.]

**411. Morus.** (*Tournf. Inst.* 362.) — Mûrier. — Maulbeere.

1092) † *M. alba*. (*L. Sp.* 1398). . . . . T. n° 1358bis.  
‡ Fl. Mai. Fr. Juillet-Août.

R. Cultivé. Haies aux environs de Rudlich (Schengen.) T. Jardin Thys. (Clausen).

1093) † *M. nigra*. (*L. Sp.* 1398.)

‡ Mai. Fr. Juillet-Août.

AC. Cultivé pour ses fruits.

### LXXXI. CANNABINEAE.

(*Endl. Gen. pl.* 286.) [XXII, 5.]

**412. Cannabis.** (*Tournf. Inst.* 309.) — Chanvre. — Hanff.

1094) † *C. sativa*. (*L. Sp.* 1457.) Wîerek. Plante mâle. Fimmel.  
Pl. femelle. Mesch . . . . . T. n° 1413.

① Juillet-Août.

C. Cultivé et souvent spontané aux bords des chemins.

**413. Humulus.** (*L. Gen.* 1116.) — Houblon. — Hopfen.

1095) *H. Lupulus*. (*L. Sp.* 1457.) Happ . . . . . T. n° 1410.  
‡ Juillet-Août.

AC. par place. Haies, buissons, lieux frais et ombragés. R. Cultivé.

### LXXXII. ULMACEAE.

(*Mirbel. Elém.* 905.)

**414. Ulmus.** (*L. Gen.* 316.) — Orme. — Ulme. [V, 2.]

1096) *U. campestris*. (*L. Sp.* 327.) Rôdhholz . . . . . T. n° 425.  
‡ Mars-Avril. Fr. Fin Mai.

AR. Bois montueux. Schockbüsch (Hautcharage.) AC. Planté en avenue.

Var.  $\beta$ . *suberosa*. (*Ehrh. Beitr.* 6. 87) . . . . . T. n° 427.  
Avec l'espèce.

1097) *U. effusa*. (*Willd. Prod. fl. Berol.* 206.) Wel Lann.

‡ Avril. Fr. Juin.

[T. n° 426.

AR. Bois. Sauerheck (Sandweiler), Helderich (Buschdorff), etc. Planté en avenue.

### LXXXIII. URTICEAE.

(DC. Fl. Fr. III. 517 ex parte.)

**415. *Urtica*.** (*Tournf. Inst.* 308 ex parte.) Ortie. Nessel. [XXI, 4.]

1098) *U. dioica*. (*L. Sp.* 1396.) Brenndeschtel. . . T. n° 1360.

‡ Juin-October.

C. Voisinage des lieux habités, pied des murs, décombres, lieux incultes et cultivés, haies, buissons, bois, etc.

1099) *U. urens*. (*L. Sp.* 1396.) Brenndeschtel. . . T. n° 1359.

① Mai-October.

C. Voisinage des habitations, pied des murs, décombres, haies, bords des chemins.

**416. *Parietaria*.** (*Tournf. Inst.* 289.) — Pariétaire. — Glas-  
kraut. [IV, 1, ou XXIII, 1.]

1100) *P. officinalis*. (*L. Sp.* 1492 pro parte.) . . T. n° 1361.

‡ Juin-October.

AC. par place. Vieux murs, décombres, ruines. Vieux château d'Ansembourg.  
T. Echternach. (Brinmeyr père).

1101) *P. ramiflora*. (*Mönch. meth.* 371.) *P. Judaica*. (*L.*)

‡ Juin-September.

[T. n° 1362.

AC. par place. Vieux murs, descente du Breitenweg. T. Rochers du Sternchen. Kz.

### LXXXIV. THYMELACEAE.

(Meisn. in DC. Prodr. XIV. 493.) [VIII, 1.]

**417. *Daphne*.** (*L. Gen.* 485.) — Daphné. — Seidelbast.

1102) *D. Mezereum*. (*L. Sp.* 509.) Mærzblum. Kellerholz.

Feechholz. Fichtenholz. Joli-bois. . . . T. n° 592.

‡ Février-Mars. Fr. Juin-Juillet.

AC. par place. Bois montueux.

**418. *Thymelæa*.** (*Tournf. Inst.* 594 emend.) — Thyméléé. —  
Spatzenzunge.

1103) *T. Passerina*. (*L. Sp.* 512.) *Stellera Passerina*. (*L.*)

① Juillet-September.

[T. n° 594.

AR. Champs maigres, terrains en friche, moissons. Bettendorf, Echternach,  
Berbourg, Reckange, Remich. T. Moselle. Wgt. Felz (Schengen.) Kz.

## LXXXV. ELÆAGNEAE.

(R. Brow. Prodr. p. 350.)

**419. Elæagnus.** (*L. Gen.* 159.) — Chalef. — Oelweide. [IV, 1.]1104) † *E. angustifolius.* (*L. Sp.* 176) . . . . . EF. 239.

‡ Mai-Juin. Fr. Août-Septembre.

AR. Cultivé. Côte d'Eich.!

**420. Hippophaë.** (*L. Gen.* 1452.) Argoussier. Seedorn. [XXII, 4.]1105) † *H. rhamnoides.* (*L. Sp.* 1452) . . . . . EF. 238.

‡ Avril-Mai. Fr. Septembre.

AC. Cultivé.

## LXXXVI. HIPPURIDEAE.

(Link. Enum. Hort. Berol. I. 5.) [I, 1.]

**421. Hippuris.** (*L. Gen.* 11.) — Pesse. — Tannwedel.1106) ? *H. vulgaris.* (*L. Sp.* 6) . . . . . T. n° 1.

‡ Juin-Août.

AC. par place. Fossés aquatiques, rivières et ruisseaux à courant peu rapides, flaques d'eau, marais tourbeux. Alzette (Joachim). L. 455. Neumühl. T. (Comme il y a 14 localités de ce nom dans le pays, il n'a pas encore été possible de retrouver la station indiquée.)

## LXXXVII. SANTALACEAE.

(R. Br. Prodr. Nov. Holl. 350.) [V, 1.]

**422. Thesium.** (*L. Gen.* 292.) — Thesion. — Verneinkraut.1107) *T. pratense.* (*Ehrh. herb. exc. n° 12.*) *T. Linophyllum.* (*L.*)

‡ Juin-Juillet.

[T. n° 394.]

AR. Prairies, pâturages, pelouses sèches, lieux pierreux, coteaux incultes, clairières des bois. Bettendorff. C. Ardennes. Our au-dessus de Vianden. (Courtois).

## LXXXVIII. ARISTOLOCHIEAE.

(Juss. Gen. 74 ex parte.)

**423. Asarum.** (*Tournf. Inst.* 215.) Asaret. Haselwurz. [XI, 1.]1108) *A. europæum.* (*L. Sp.* 633) . . . . . T. n° 679.

‡ Avril-Mai.

R. Bois montueux, humides, généralement sous coudrier. Ansembourg. T. Ospern. Md.

**424. Aristolochia.** (*Tournf. Inst.* 71.) — Aristoloche. —

Osterluzei. [XX, 5.]

1109) *A. Clematitis.* (*L. Sp.* 1364) . . . . . T. n° 1299.



‡ Mai-Août.

C. par place. Haies, lisières des bois, buissons, lieux incultes, etc. Pétange, Simmern. T. Vieux château d'Ansembourg. T. ! Echternach. (Brimmeyr père). Krautemesgrund. (Esch s/A.) EF. Kz.

1110) † A. **Sipho**. (*L'Hérit. Bot. Mag. t. 534.*) Peiffenholz.

‡ Mai-Juin.

[EF. 240.

AC. Cultivé comme plante grimpante.

LXXXIX. EUPHORBIACEAE.

(Juss. Gen. 384.)

**125. Euphorbia**. (*L. Gen. 609.*) Euphorbe. Wolfsmilch. [XXI, 4.]

1111) † E. **Lathyris**. (*L. Sp. 653.*) Porgëerkîeren. Zennett-blêder . . . . . T. n° 690.

② Juin-Juillet.

AC. Cultivé pour son emploi dans la médecine populaire. Quelquefois subspontané au voisinage des habitations. Clausen, Blaschette, Helmdange. T. Mies (Mersch.) Kz., etc.

1112) E. **amygdaloides**. (*L. Sp. 663.*) Fescherkraut. E. *silvatica*.

‡ Mai-Juin.

[T. n° 693.

C. Bois, taillis, buissons de l'Ardenne. AR. ailleurs. Beaufort. T. Langenberg (Dudelange.) BL. Grandbois (Rodange.) Kz. Bissenerhecken. DW. ! Echternach. (Brimmeyr père).

1113) E. **Pepulus**. (*L. Sp. 653*) . . . . . T. n° 688.

① Juillet-October.

C. Bords des chemins, jardins, lieux cultivés, moissons. AC. Ardennes.

1114) E. **helioscopia**. (*L. Sp. 658*) . . . . . T. n° 691.

① Juin-October.

C. Bords des chemins, jardins, lieux cultivés, moissons.

1115) E. **exigua**. (*L. Sp. 654*) . . . . . T. n° 689.

① Mai-September.

C. Bords des chemins, terrains cultivés et en friche, moissons. R. Ardennes.

1116) E. **dulcis**. (*L. Sp. 656.*) E. *purpurata*. (*Thuil.*) T. n° 696.

‡ Avril-Juin.

AC. par place. Bois montueux, lieux ombragés des terrains argileux. Ram-brouch, Esch s/S., Wiltz, Schrassig. T. Moselle. Md. Greiveldange, Ehnen. BB. Wecker, Merttert. R.

1117) E. **verrucosa**. (*L. Sp. 658*) . . . . . T. n° 697.

‡ Mai-Juin.

R. Buissons, haies, fossés, pâturages humides. Krewinkel (Hesperange.) BL. !

1118) *E. platyphyllos.* (*L. Sp.* 660) . . . . . T. n° 698.

② ou ① Juillet-Septembre.

AR. Lieux cultivés, champs frais entre Eich et Rodenhof. Remich. BB.! Pleistrange. BL.

1119) *E. stricta.* (*L. Syst. Nat.* 1049) *E. micrantha.* L. 1130.

‡ Mai-Juillet.

C. par place. Bords des chemins, haies, bords des eaux entre Wasserbillig et Echternach. L. (Brimmeyr père). Kleeberg, Remerschen. BB. Bords de la Moselle (Garke). Wecker, Mertert. R. Walferdingerberg. BL.

1120) *E. Gerardiana.* (*Jacq. Aust. V.* 1. 436) . . . T. n° 692.

‡ Juin-Août.

AR. Lieux secs, pelouses arides, clairières des bois secs, graviers de la Moselle. T. Grevenmacher, Schengen, Kz. Remich (Löhr).

1121) *E. Cyparissias.* (*L. Sp.* 661) *Hexemelech.* . . T. n° 694.

‡ Avril-Juin.

C. Bords des chemins, lieux stériles, sablonneux, coteaux arides, pâturages secs.

1122) *E. Esula.* (*L. Sp.* 660) . . . . . T. n° 695.

‡ Mai-Août.

AC. Bords des chemins et des eaux, près en amont de Remich, BB.! en aval de Grevenmacher. R.

**426. Mercurialis.** (*Tournf. Inst.* 308.) — Mercuriale. —  
Bingelkraut. [XXII, 8.]

1123) *M. annua.* (*L. Sp.* 1465.) Köhkräut . . . T. n° 1423.

① Juin-Octobre.

C. Voisinage des habitations, jardins, lieux cultivés, moissons.

1124) *M. perennis.* (*L. Sp.* 1465) . . . . . T. n° 1422.

‡ Avril-Mai.

AC. par place. Bois montueux, rochers, etc. C. Grandbois (Differdange).

**427. Buxus.** (*Tournf. Inst.* 345.) — Buis. — Buchs. [XXI, 4.]

1125) *B. sempervirens.* (*L. Sp.* 1394.) Pälz . . . T. n° 1363.

‡ Fl. Mars-Avril. Fr. Juillet-Août.

AC. Coteaux pierreux du Palmberg (Alm). T.! Ruines de Larochette!

Var.  $\beta$ . † *suffruticosa.* (*Lam. Dict. I.* 514.)

C. Employé comme bordure dans les jardins.

### XC. CALLITRICHINEAE.

(Lavielle in *Ann. soc. Linn. Par.* 1824. 229.) [XXI, 1, ou I, 2.]

**428. Callitriche.** (*L. Gen.* 13.) — Callitriche. — Wasserstern.

1126) *C. stagnalis*. (*Scop. Carn. II. 251*). . . . . L. 456.  
 ♀ Juin-Octobre.

C. Mares, fossés, ruisseaux.

1127) *C. vernalis*. (*Kützing in Linnæa. VII. 174*) . . . T. n° 2.  
 ♀ Mars-Octobre.

C. Mares, fossés, ruisseaux.

Var. *β. minima*. (*Hoppe.*) *C. cæspitosa*. (*Schultz.*)

AR. Chemins humides des bois. (Gleicht), Elvange. Kz.

Var. *γ. stellata*. (*Hoppe.*)

C. Eaux stagnantes, lavoirs.

Var. *δ. intermedia*. (*Hoppe.*)

AG. Avec la précédente.

Var. *ε. angustifolia*. (*Hoppe.*)

AR. Ornières du chemin du Beyerholz entre Munsbach et Schultrange. Kz.

1128) *C. hamulata*. (*Kütz in Koch syn. ed. 1. 246.*) *C. autumnalis*. (*Auct. non L.*) . . . . . T. n° 3.

♀ Avril-Automne.

R. Fossés, mares.

### XCI. CERATOPHYLLEAE.

(Gray, Arr. II. 534.) [XXI, 5.]

**429. Ceratophyllum.** (*L. Gen. 1065.*) — Cornifle. — Igellock.

1129) *C. demersum*. (*L. Sp. 1409*) . . . . . T. n° 1373.

♀ Juillet-Septembre.

C. par place. Rivières, fossés, bassins, étangs, mares.

Var. *β. apiculatum*. (*Cham. et Schldl.*)

R. Avec l'espèce.

## CLASSE II. — Apétales amentacées.

### XCII. JUGLANDEAE.

(DC. Théo. élém. 215.) [XXX, 5.]

**430. Juglans.** (*L. Gen. 1071 ex parte.*) — Noyer. — Wallnuss.

1130) † *J. regia*. (*L. Sp. 1415.*) Nössert . . . T. n° 1380.

‡ Avril-Mai. Fr. (Bâmnoss.) Septembre-Octobre. Hackernoss.

C. Anciennement cultivé pour ses fruits et son bois.

1131) † *J. nigra*. (*Michx. Arb. forest. 1. 157.*) . . . EF. 250.

‡ Avril-Mai.

R. Cultivé. Dudelange.

## XCIII. CUPULIFERAE.

(A. Rich. Elém. bot. éd. 6. 621.) [XXI, 5.]

**431. Fagus.** (*Tournf. Inst.* 351.) — Hêtre. — Buche.1132) *F. silvatica.* (*L. Sp.* 1416.) Bieh . . . . T. n° 1376.

‡ Avril-Mai. Fr. (Buchacker.) Octobre.

C. Bois, haies, etc.<sup>1)</sup>**432. Castanea.** (*Tournf. Inst.* 352.) — Châtaignier. — Kastanie.1133) † *C. sativa.* (*Mill. Dict.* 3.) Käschtebàm. *C. vulgaris.*

‡ Juin. Fr. (Marong. Käscht.) Septembre-Octobre. [T. n° 1377.

Cette essence qui était avant l'hiver de 1793 assez commune dans nos bois est aujourd'hui R. cultivée. Marienthal. T. Leesbech. Schmelzerbüsch (Simmern.) DW. Kz. Pleitränge. Lechensberg. Kz.

**433. Quercus.** (*Tournf. Inst.* 349.) — Chêne. — Eiche.1134) *Q. pedunculata.* (*Ehrh. arbor.* 77.) *Q. Robur.* (*L. fl. Suec.**ed.* 2. p. 340 *excl. Var. β.*) *Q. racemosa.* Sommerèch. Steen-

èch. Freche . . . . . T. n° 1378.

‡ Avril-Mai. Fr. Octobre.

AC. Bois de la plaine à sol frais et humides.

1135) *Q. sessiliflora.* (*Salisb. Prod.* 392.) Eisèch. Wanterèch.

Männchen. Ch. rouvre . . . . . T. n° 1379.

‡ Mai. Fr. Octobre.

C. Bois et taillis montueux.

1136) † *Q. rubra.* (*Michx. Chêne amé. t.* 35. 36.)

‡ Mai. Fr. Octobre.

Cultivé en forêt. Johannisberg, Schäferei (Schönfels.) Kz.

1137) † *Q. tinctoria.* (*Michx. l. c. t.* 24. 25.)

‡ Mai. Fr. Octobre.

Cultivé en forêt. Johannisberg, Schönfels. Kz.

1138) † *Q. alba.* (*Michx. arbres forestiers. II. p.* 13.)

‡ Mai. Fr. Octobre.

Cultivé en forêt. Johannisberg, Schönfels. Kz.

**434. Corylus.** (*Tournf. Inst.* 347.) — Coudrier. — Hasel.1139) *C. Avellana.* (*L. Sp.* 1417.) Hèselter. . . T. n° 1385.

‡ Février-Mars. Fr. (Hèselnoss.) Août-Septembre.

C. Haies, buissons, taillis, surtout de l'oolite. Cultivé en grand nombre de variétés.

1) Le hêtre du Höhenhof mesure à hauteur d'épaule 7<sup>m</sup>12, celui de la Hambierknup, (Grünenwald) 4<sup>m</sup>70, celui de la Seitert. (Lintgen). 4<sup>m</sup>74, etc.

**435. Carpinus.** (*L. Gen.* 1037 *ex parte.*) — Charme. — Hainbuche.

1140) *C. Betulus.* (*L. Sp.* 1416.) Hombuch. Maibich. Hoobich.  
 † Avril-Mai. Fr. Juillet-Août.

C. Haies, taillis, bois. Un exemplaire extraordinaire à Scheuerhof (Remich), mesure 2<sup>m</sup>80 à hauteur d'épaule, 8<sup>m</sup>10 au pied.

#### XCIV. SALICINEAE.

(A. Rich. *Elém. Bot.* éd. 6. 626.) [XXII, 2.]

**436. Salix.** (*Tournf. Inst.* 364.) — Saule. — Weide.

Sect. I. — Fragiles. (*Koch, Com. de Sal.*)

1141) † *S. pentandra.* (*L. Sp.* 1442) . . . . . EF. 252.  
 † Mai-Juin.

C. Talus des chemins de fer.

1142) *S. fragilis.* (*L. Sp.* 1443) . . . . . T. n° 1397.  
 † Avril-Mai.

AC. Villages, bords des chemins et des eaux.

Var.  $\beta$ . *decipiens.* (*Hoff. sal.* 2. p. 2. t. 3.) Gfêl Weid.

C. Avec le type.

1143) *S. alba.* (*L. Sp.* 1449) . . . . . T. n° 1390.  
 † Avril-Mai.

C. Bords des eaux et des chemins.

Var.  $\beta$ . *vitellina.* (*L. Sp.* 1442) . . . . . T. n° 1391.

AC. Avec l'espèce, surtout en oseraie.

1144) † *S. babylonica.* (*L. Sp.* 1443.) Trauerweid. T. n° 1395.  
 † Avril-Mai.

C. Cultivé comme arbre funéraire et dans les parcs.

Sect. II. — Amygdalinae. (*Koch, syn.* 741.)

1145) *S. amygdalina.* (*L. Sp.* 1443 *emend.*) . . . T. n° 1394.  
 † Avril-Mai.

C. Fossés, bords des eaux et des rivières.

Var.  $\beta$ . *concolor.* (*Koch, syn.* 742.) *S. triandria.* (*L. Sp.* 1442.)  
 Avec l'espèce. [T. n° 1393.]

1146) *S. hippohaëfolia.* (*Thuill. Fl. Par.* 514.) Holl. Fl. Moselle.  
 † Avril-Mai.

R. Lieux humides, bords des eaux. C. Wasserbillig à Schengen. BB.

Sect. III. — Pruinosaë. (*Koch, Com. de sal.*)

- 1147) *S. daphnoides*. (*Villars, fl. Dauph.* 3. 765) . . . T. n° 1396.  
 † Mars-Avril.

R. Bords sablonneux des rivières. Sûre entre Grundhof et Echternach. T. Weilerbach. L.

Sect. IV. — Purpurea. (*Koch, syn. 744.*)

- 1148) *S. purpurea*. (*L. Sp.* 1442) . . . . . T. n° 1406.  
 † Mars-Avril.

AC. Bords des eaux, lieux humides. Moulin de Steinsel, village de Sæul. Kz.

- 1149) *S. rubra*. (*Huds. fl. Ang. p.* 423) . . . . . BB. 392.  
 † Mars-Avril.

R. Prairies humides, bords des eaux, fossés. En amont de Remich. BB.

Sect. V. — Viminalis. (*Koch, syn. 745.*)

- 1150) *S. viminalis*. (*L. Sp.* 1448.) Banweid. Këferweid.  
 † Mars-Avril. [T. n° 1405.]

C. Bords des eaux et dans les oseraies.

Sect. VI. — Caprea. (*Koch, syn. 747.*)

- 1151) *S. Seringeana*. (*Gaud. Fl. helv.* 6. 251) . . . T. n° 1401.  
 † Avril.

AC. Bords des eaux. Moselle. T.

- 1152) *S. incana*. (*Schrank, baier. Fl.* 1. 230) . . . T. n° 1392.  
 † Avril-Mai.

R. Bords des eaux. Echternach, vers la Weilerbach. (Garke). Biwels (Courtois).

- 1153) *S. Caprea*. (*L. Sp.* 1448.) Beschweid. . . . T. n° 1398.  
 † Mars-Avril. Fr. Mai.

C. Bois, ruines, etc.

- 1154) *S. cinerea*. (*L. Sp.* 1449.) Muërweid. *S. acuminata*.  
 † Mars-Avril. [T. n° 1400.]

C. Lieux humides, mares, berges des rivières, etc.

- 1155) *S. aurita*. (*L. Sp.* 2446) . . . . . T. n° 1399.  
 † Avril-Mai.

AC. Prés paludéens, tourbières, marécages, etc.

- 1156) *S. depressa*. (*L. fl. Succ. ed.* 2. p. 352) . . . T. n° 1404.  
 † Avril.

AR. Marais tourbeux de l'Ardenne.

1157) *S. repens*. (*L. Sp.* 1417.)

‡ Avril-Mai.

AC. Prairies marécageuses et tourbeuses, pâturages, bruyères humides, lieux sablonneux. Brouch. EF.!

1158) † *S. rosmarinifolia*. (*L. Sp.* 1148) . . . . EF. 253.

‡ Mai.

AC. Marais spongieux. Eehternaech. Dmtr.

**437. Populus.** (*Tournf. Inst.* 365.) — Peuplier. — Pappel.

1159) † *P. alba*. (*L. Sp.* 1463). . . . . T. n° 1415.

‡ Mars-Avril. Fr. Mai.

AR. Planté et quelquefois spontané. Pont de Bettembourg.

Var.  $\beta$ . *denudata*. (*Hartig. Forstkulturpfl.* 454.)

R. Cultivé. Prés en aval du vieux château d'Ansembourg.

1160) † *P. canescens*. (*Smit. Brit.* 1080) . . . . T. n° 1416.

‡ Mars-Avril. Fr. Mai.

AR. Cultivé et quelquefois spontané. Bords de l'Alzette à Clausen. Kz.

1161) *P. tremula*. (*L. Sp.* 1464.) Tremble. Aesp. T. n° 1417.

‡ Mars-Avril. Fr. Mai.

C. Bois, terrains humides.

Var.  $\beta$ . *villosa*. (*Rchb. exsicc.* 173) . . . . T. n° 1417b.

AC. avec le type.

1162) *P. nigra*. (*L. Sp.* 1464.) Pampulgen. Pouplier. T. n° 1419.

‡ Mars-Avril. Fr. Mai.

AR. Bords des eaux, terrains humides entre Reckingen et Marienthal. T. ! Limpertsberg. Kz.

Var.  $\beta$ . *pyramidalis*. (*Rosier, Cours. agr.* VII. 619.) Wässerhousar.

*P. d'Italie. P. dilatata. (Ait.) fastigiata. (L.)* T. n° 1420.

‡ Mars-Avril.

AC. Cultivé le long des eaux et des haies dans les villages. Nous ne connaissons que le mâle. Les premiers peupliers plantés chez nous sont âgés de 175 ans, mesurent 3<sup>m</sup>80 de tour et se trouvent dans le parc du château de Berg.

1163) *P. canadensis*. (*Desf. Cat. hort. Par.*) Canada. *P. monolifera. (Ait.)* . . . . . T. n° 1421.

‡ Mars-Avril. Fr. Juin.

C. Cultivé en avenues dans lesquelles on ne rencontre le plus souvent que des pieds mâles.

1164) † *P. balsamifera*. (*L. Sp.* 1464.) Lantago. T. n° 1418.

‡ Mars-Avril.

AR. Cultivé en avenue. Route près de Merl. Altrier. Kz.

## XCV. BETULINEAE.

(A. Rich. Elém. bot. éd. 5. 626.)

- 438. Betula.** (*Tournf. Inst.* 360.) — Bouleau. — Birke. [XXI, 5.]  
 1165) *B. alba.* (*L. Sp.* 1393 *pro parte.*) Bêrk . . . T. n° 1382.  
 † Avril-Mai. Fr. Juin.  
 C. Bois sablonneux  
 Var. *β. pubescens.* (*Ehrh. Beiträge.* 6. p. 98. *arb.* n° 67.)  
 † Avril-Mai. Fr. Juin. [T. n° 1384.  
 AR. Tourbières, bois humides, C. Ardennes, Beaufort. L.  
 Var. *γ. carpatica.* (*Willd. Sp.* 4. 1. 464) . . . . T. n° 1383.  
 R. Forêts de l'Ardenne. Dmtr.  
 Var. *δ. verrucosa.* (*Ehrh. l. c.* n° 96.)  
 Avec var. *β.*
- 439. Alnus.** (*Tournf. Inst.* 359 *emend.*) Aulne. Erle. [XXI, 4.]  
 1166) *A. glutinosa.* (*Gærtn. Fruct. II. t.* 90.) Eller. Ahlenter.  
 † Février-Mars. Fr. Août-Septembre. [T. n° 1364.  
 C. Bords des eaux, lieux marécageux des bois, etc.  
 1167) † *A. incana.* (*DC. Fl. Fr. III.* 304) . . . . EF. 258.  
 † Février-Mars. Fr. Août-Septembre.  
 AR. Planté dans les bois. Fascht. (Mersch) (1842) Baumbüsch (1853).

## XCVI. PLATANEAE.

(Lestib in Martins. Hort. Monas. 46.) [XXI, 5.]

- 440. Platanus.** (*L. Gen.* 1075.) — Platane.  
 1168) † *P. orientalis.* (*L. Sp.* 1417). . . . . EF. 259.  
 † Fl. Avril-Mai. Fr. Août.  
 AC. Planté en avenues.  
 1169) † *P. acerifolius.* (*Willd. Sp. IV.* 474.)  
 † Avril-Mai. Fr. Août.  
 AC. Planté en avenues et dans les parcs. Au château de Berg il existe des pieds de 2<sup>m</sup>50 de tour.  
 1170) † *P. occidentalis.* (*L. Sp.* 1418) . . . . . EF. 260.  
 † Avril-Mai. Fr. Août.  
 R. Cultivé parce qu'il souffre de la gelée.

SUBDIVISION IV. — *Gymnospermes.*CLASSE UNIQUE. — *Coniferæ.* (*Juss. Gen.* 411.)

## XCVII. ABIETINEAE.

(Rich. Conif. 145.) [XXI, 1.]

- 441. Pinus.** (*L. Gen.* 1077 *ex parte.*) — Pin. — Kiefer.



1171) † *P. silvestris*. (*L. Sp.* 1418.) Wel Denn. Silvester.  
[T. n° 1388.

‡ Mai-Juin. Fr. (Weieràch.) Septembre de l'année suivante.  
C. Cultivé. Bois. Howald et Grünenwald (1810), Beyerholz (1816), Reisdorf (1827), et surtout depuis 1841.

1172) † *P. austriaca*. (*Höss. Anleit.* 6.)

‡ Mai. Fr. Automne de la seconde année.

AR. Cultivé. Bois sur calcaire. Edingsberg, Neudorf (1859), Grünenwald (1856), Baumbüsch (1868), etc.

1173) † *P. Pinaster*. (*Solander in Ait. Hort. Kew. ed. 1. III.* 367.) *P. maritime* . . . . . EF. 263.

‡ Avril-Mai. Fr. Automne de la 2<sup>e</sup> année.

AR. Cultivé en forêt. Friedbüsch, Diekirch (1827), Nagem (1855), Lintgen, Kopstal, Simmern (1858). Souffre des gelées tardives aux expositions méridionales.

1174) † *P. Strobus*. (*L. Sp.* 1419.) Lord Weymouth. EF. 262.

‡ Fin Mai. Fr. Automne de la 2<sup>e</sup> année.

AR. Cultivé en forêt. Schrassig (1825), Würthsberg (1836), Edingsberg (1851), Lintgen (1859).

**442. Larix.** (*Tournf. Inst.* 357.) — Mélèze. — Lärche.

1175) † *L. decidua*. (*Mill. Dic. n° 1.*) *L. europæa*. (*DC.*)

‡ Fl. Avril. Fr. Automne. [T. n° 1389.

C. Cultivé. Bois. Ansembourg, 2<sup>m</sup>35 de tour (1772), Baumbüsch et Brammeschbüsch (1779), Wurthsberg, Arsdorf (1823), Holz (1831), Kippenhof (1842).

**443. Picea.** (*Link. in Linnæa. XV.* 516.) — Pesse. — Fichte.

1176) † *P. excelsa*. (*Link. l. c.* 515.) Épicéa. Rothtan. Abies  
excelsa . . . . . T. n° 1388.

‡ Mai-Juin. Fr. Octobre de la même année.

C. Cultivé en forêt. Schälheck, Bissen, 2<sup>m</sup>40 de tour (1772). Clausen, Holzem (1825), Reisdorf (1827), Holz (1831).

1177) † *P. alba*. (*Mich. Fl. Bor. Amer. II.* 207.) Sapinette.

‡ Fl. Mai. Fr. Octobre.

AR. Cultivé en forêt. Bereldange (1851), Itzig (1852)

**444. Abies.** (*Tournf. Inst.* 353, 354.) — Sapin. — Tanne.

1178) † *A. pectinata*. (*DC. Fl. Fr. III.* 275.) Weistan.

‡ Fl. Mai. Fr. Octobre.

AR. Cultivé en forêt. Juckelsbüsch, 2<sup>m</sup>40 de tour (1768). Ansembourg, 2<sup>m</sup>30 de tour (1771).

1179) **A. balsamea.** (*Mill. Dict. n° 3.*) Baumier . . EF. 266.

‡ Fl. Mai. Fr. Automne.

AR. Cultivé en forêt. Edingsberg (1853).

### XCVIII. CUPRESSINEAE.

(Rich. Conif. 137 Taxineæ.) [XXII, 11.]

**445. Juniperus.** (*L. Gen. 1134.*) — Genévrier. — Wachholder.

1180) **J. communis.** (*L. Sp. 1470.*) Wackelter. Geißler. T n° 1425.

‡ Avril-Mai. Fr. (Wackelterkîeren.) Août-Octobre de l'année suivante.

C. Bruyères, coteaux sablonneux, incultes, clairières des bois.

1181) † **J. Sabina.** (*L. Sp. 1472.*) Sievèàm . . . EF. 268.

‡ Fl. Mai-Juin. Fr. Octobre.

AR. Cultivé dans les jardins, où l'on rencontre des sujets d'un grand âge.

1182) † **J. virginiana.** (*L. Sp. 1471.*) Cèdre de Virginie. EF. 269.

‡ Avril-Mai. Fr. Octobre.

AR. Cultivé comme arbre d'ornement.

**446. Thuia.** (*Tournf. Inst. 358.*) — Thuia. — Lebensbaum.

1183) † **T. occidentalis.** (*L. Sp. 1422.*) Thuja . . EF. 271.

‡ Avril-Mai. Fr. Octobre.

AC. Cultivé comme arbre d'ornement pour clôture, et quelquefois en massif forestier. Johannisberg. Kz.

**447. Taxus.** (*Tournf. Inst. 362.*) — If. — Eibe.

1184) † **T. baccata.** (*L. Sp. 1472.*) Fransèsche Pâlm. EF. 270.

‡ Mars-Avril. Fr. Août-Septembre.

Anciennement cultivé dans les jardins où il était soumis à des tailles bizarres. Château de Bettingen. ! A Ehlinge se trouve un pied ayant 2<sup>m</sup>52 de tour, ce qui fait à raison de 0,015<sup>m</sup> d'accroissement annuel : 675 ans.

## DIVISION II. — MONOCOTYLÉES ou Endogènes.

### SUBDIVISION I. — Coronariées.

#### CLASSE I. — Superovariées.

### XGIX. ALISMAGEAE.

(R. Br. Prod. Nov. Hall. 342 ex parte.)

**448. Alisma.** (*L. Gen. 460.*) — Flûteau. — Froshlöffel. [VI, 5.]

1185) **A. Plantago.** (*L. Sp. 486.*) . . . . . T. n° 566.

‡ Juin-Septembre.

C. Fossés, bords des eaux, lieux marécageux AC. Ardennes.

Var. *β. lanceolatum.* (*Wither. Arrang.* 362.)

R. Avec l'espèce sur la Moselle. L.

1186) *A. natans.* (*L. Sp.* 487) . . . . . T. n° 567.

‡ Juin-Septembre.

R. Mares et étangs des terres légères ou tourbeuses. Cap. T.

**449. Sagittaria.** (*L. Gen.* 1067.) Sagittaire. Pfeilkraut. [XXI, 5.]

1187) *S. sagittæfolia.* (*L. Sp.* 1410) . . . . . T. n° 1370.

‡ Juin-Août.

AC. par place. Bords des eaux, lieux marécageux. R. Ardennes.

### C. BUTOMEAE.

(Rich. in Mém. Mus. I. 364.) [IX, 3.]

**450. Butomus.** (*L. Gen.* 507.) — Butome. — Schwaneblume.

1188) *B. umbellatus.* (*L. Sp.* 532.) Wasserlesch. T. n° 612.

‡ Juin-Août.

C. par place. Bords des étangs et des rivières. Sûre, Moselle, Alzette près Mœsdorf. R. Ardennes.

### CI. COLCHICACEAE.

(DC. Fl. Fr. III. 192.) [VI, 3.]

**451. Colchicum.** (*Tournf. Inst.* 181.) — Colchique. — Zeitlose.

1189) *C. autumnale.* (*L. Sp.* 485.) Hierschtblum. Uchteblum.

Lichtblum . . . . . T. n° 565.

‡ Septembre-Octobre. Fr. (Guguekscer. Köhtüt.) Mai-Juin.

C. Prairies, pâturages humides. Manque dans plusieurs contrées.

### CII. LILIACEAE.

(DC. Theor. élé. éd. 1. 249.) [VI, 1.]

**452. Tulipa.** (*L. Gen.* 415.) — Tulipe. — Tulpe.

1190) † *T. silvestris.* (*L. Sp.* 438.) Tulipant.

‡ Mai-Juin.

AC. Cultivé et qqef. spontané. Alzette près du pont de la Pulvermühl. BL.

1191) † *T. Gesneriana.* (*L. Sp.* 439.)

‡ Mai-Juin.

AC. Cultivé en diverses et nombreuses variétés.

**453. Fritillaria.** (*L. Gen.* 411.) — Fritillaire. — Schachblume.

1192) † *F. imperialis.* (*L. Sp.* 436.) Keserkrön.

‡ Avril-Mai.

C. Cultivé dans les jardins.

**454. Lilium.** (*L. Gen.* 40.) — Lilie. — Lilie.1193) † *L. bulbiferum.* (*L. Sp.* 1. 437.) Rödlilie.

‡ Juillet-Août.

C. Cultivé.

1194) † *L. candidum.* (*L. Sp.* 433.) Weiss Lilie.

‡ Juin-Juillet.

C. Cultivé.

**455. Ornithogalum.** (*L. Gen.* 418 *ex parte.*) — Ornithogale. — Vogelmilch.1195) ? *O. pyrenaicum.* (*L. Sp.* 440) . . . Dmtr. P. 1829.

‡ Mai-Juin.

R. Buissons, taillis, lieux herbeux. Ardennes. Dmtr.

1196) *O. umbellatum.* (*L. Sp.* 441). . . . . T. n° 528.

‡ Mai-Juin.

R. Champs cultivés, moissons, vignes, haies, lisières des bois, coteaux pierreux. Beggen, Greisch, Keispelt. T. Entre Marienthal et Ansembourg en aval de Bour près du pont de Dondelange. Kz. Bords de l'Eisch près Simmern. DW.

1197) † *O. nutans.* (*L. Sp.* 441) . . . . . EF. 273.

‡ Avril-Mai.

AC. Cultivé et quelquefois subsponané au voisinage des jardins.

**456. Gagea.** (*Salisb. in Ann. bot.* II. 555.) Gagée. Goldstern.1198) *G. pratensis.* (*R. et S. syst.* 7. p. 536.) *G. stenopetala.*

‡ Avril-Mai. [L. 1303.]

C. Champs, pelouses sèches, rochers des terrains marneux.

1199) *G. arvensis.* (*Schult. syst. veg.* VII. 547) . . . L. 1305.

‡ Avril-Mai.

AC. Lieux cultivés, moissons, etc. des terres marneuses.

1200) *G. minima.* (*Schult. l. c.* 539.) . . . . . T. n° 526.

‡ Avril-Mai.

AR. Champs sablonneux, pelouses, bois, par place. Pulvermühl.

1201) *G. lutea.* (*Schult. l. c.* 538) *G. silvatica.* . . T. n° 525.

‡ Avril-Mai.

AR. par place. Bois, taillis, lieux ombragés des marnes irisées.

**457. Scilla.** (*L. Gen.* 419 *ex parte.*) — Scille. — Meerzwiebel.1202) *S. bifolia.* (*L. Sp.* 443) . . . . . T. n° 529.

‡ Mars-Avril.

C. par place, mais manque sur de grands espaces. Bois, taillis, buissons herbeux des terres fortes. Grund, entre Hesperange et Kockelscheuer. BL. Echternach. (Brimmeyr père). Dudelange. T. Scheffendelchen (Larochette.) Meysembourg. Kz.

**458. Allium.** (*L. Gen.* 409.) — Ail. — Lauch.

Sect. I. — *Molium.* (*Don, Monogr. of the genus Allium.* 3.)

1203) **A. ursinum.** (*L. Sp.* 431) . . . . . T. n° 516.

‡ Avril-Mai.

AR. par place, mais manque sur de grands espaces. R. Lieux ombragés, bois humides, bords des ruisseaux, entre Marienthal et Ausembourg. Kz. en aval de Kopstal. C. EF. Affluent de la Clerf dans la Wiltz, entre Michelau et Erpel-dange. BL.!

1204) † **A. moly.** (*L. Sp.* 430) . . . . . EF. 278.

‡ Mai-Juin.

C. Cultivé.

Sect. II. — *Scorodon.* (*Don. l. c.* 5.)

1205) † **A. sativum.** (*L. Sp.* 425.) Knûweleck . . . EF. 280.

‡ Juillet-Août.

C. Cultivé.

1206) † **A. Ophioscorodon.** (*Don. Monog. all.* 5.) Rocambole.

‡ Juillet-Août.

AR. Cultivé.

Sect. III. — *Porrum.* (*Tournef. Inst.* 210.)

1207) † **A. Porrum.** (*L. Sp.* 423.) Porett . . . . . EF. 279.

② Juin-Juillet.

C. Cultivé.

1208) **A. rotundum.** (*L. Sp.* 423) . . . . . T. n° 514.

‡ Juillet-Août.

AR. Lieux secs, vignes de la Moselle. Remich, Wintrange. BB. Kleeberg, entre Remerschen et Schengen. A. EE. Kz.

1209) **A. sphærocephalum.** (*L. Sp.* 426) . . . . . T. n° 512.

‡ Juin-Août.

R. Coteaux arides, rochers. Greisch, sur la Moselle. T.

1210) **A. vineale.** (*L. Sp.* 428) . . . . . T. n° 513.

‡ Juin-Juillet.

C. par place. Champs, ravins sablonneux, vignes, moissons, prés.

Sect. IV. — *Codonoprasum.* (*Don. l. c.*)

1211) **A. oleraceum.** (*L. Sp.* 429). . . . . L. 1317.

‡ Juin-Juillet.

C. Lieux cultivés, moissons, haies, bois, coteaux pierreux, rochers jurassiques.

1212) *A. complanatum*. (*Boreau, Not. XXXV.*) . . BB. 384.  
 24 Juin-Juillet.

R. Champs sablonneux. Clausen près le Tavion. BB.

1213) *A. carinatum*. (*L. Sp. 426*) . . . . . T. n° 511.  
 24 Juillet-Août.

R. Moissons, haies, buissons, coteaux secs de la Moselle. T. Erpeldange, Beyren. Md. K.

Sect. V. — *Schœnoprasum*. (*Don. l. c.*)

1214) † *A. Schœnoprasum*. (*L. Sp. 432.*) Bratzel. T. n° 515.  
 24 Juin-Juillet.

C. Cultivé et quelquefois subspontané. Rochers de la vallée de la Moselle. Dmtr. 1845.

1215) † *A. Ascalonicum*. (*L. Sp. 429.*) Schalott. . EF. 281.  
 24 Juin-Juillet.

C. Cultivé.

1216) † *A. Cœpa*. (*L. Sp. 431.*) Enn. . . . . EF. 276.  
 ② Juin-Juillet.

C. Cultivé en plusieurs variétés.

1217) † *A. fistulosum*. (*L. Sp. 432.*) Schalotten-Enn. E. 277.  
 24 Juin-Juillet.

AR. Cultivé.

**459. Muscari.** (*Tournf. Inst. 180.*) — Muscari. — Bisamhyacinthe.

1218) ? *M. comosum*. (*Mill. Dic. n° 5.*)  
 24 Mai-Juin.

R. Vignes, champs sablonneux de la Moselle. Schengen, Elnen. T.

**460. Phalangium.** (*Tournf. Inst. 193.*) — Phalange. — Graslilie.

1219) *P. ramosum*. (*Lmk. Ency. méth. V. 250*) . . T. n° 522.  
 24 Juin-Juillet.

R. Bois, coteaux pierreux. Schuttbourg. T. Entre Erpeldange et Michelau. (Bockholz.)

1220) *P. Liliago*. (*Schreb. spicil. 36*) . . . . . T. n° 523.  
 24 Mai-Juin.

AC. par place, manque sur de grands espaces. Rochers, coteaux sablonneux, incultes. Helpert. T. Pulvermühl. T. Wurthsberg. BL.! Revers du fort Olisy vers Kirchberg. BL.! Entre Erpeldange et Michelau. EF. Kz. Rosport et Echternach. T.

**461. Narthecium.** (*Mœhring in Ephem. nat. Curios. 1742. 389.*)  
 Albama. (*DC.*) — Narthécie. — Beinheil.

1221) *N. ossifragum*. (*Huds. Angl.* 145) . . . . T. n° 524.

‡ Juillet-Août.

R. Marais, lieux tourbeux, bruyères humides. Troine. Nœrtrange. Kz.

**462. Hemerocallis.** (*L. Gen.* 172.) — Hemerocalle. — Taglilie.

1222) † *H. flava*. (*L. Sp.* 462) . . . . . EF. 283.

‡ Juin.

C. Cultivé et souvent subspontané. Clausen, cimetières de la Moselle.

1223) † *H. fulva*. (*L. Sp.* 462.) Gfêl Lilje . . . . EF. 284.

‡ Juillet-Août.

AC. Cultivé.

### CIII. ASPARAGINEAE.

(A. Rich. Diet. clas. II, 21.)

**463. Asparagus.** (*L. Gen.* 424.) — Asperge. — Spargel. [VI, 1.]

1224) † *A. officinalis*. (*L. Sp.* 448.) Spargel . . . T. n° 530.

‡ Juin-Juillet. Fr. Août-Octobre.

C. Cultivé et souvent subspontané, entre les rochers sablonneux de Clausen. Gillensberg, Wurthsberg. Kz.

**464. Convallaria.** (*L. Gen.* 425 *ex parte.*) — Muguet. — Maiblume.

1225) *C. maialis*. (*L. Sp.* 451.) Meerèsgen . . . T. n° 520.

‡ Mai-Juin.

AC. Bois, taillis, surtout des terrains siliceux frais, etc.

**465. Polygonatum.** (*Desf. in Ann. Mus.* IX. 48.) — Polygonatum. — Weisswurz. [VI, 1.]

1226) *P. verticillatum*. (*L. Sp.* 451) . . . . . T. n° 517.

‡ Mai-Juin.

AC. Bois ombragés des Ardennes. Rambrouch, Esch s/S. C. Friedbüsch (Diekirch.) K. de Kautenbach à Wiltz. Kz.

1227) *P. multiflorum*. (*All. ped.* 1. p. 131) . . . T. n° 519.

‡ Mai-Juin.

AC. Forêts, bois taillis, pâturages montueux ombragés.

1228) *P. officinale*. (*All. l. c.*) Weisswurz. Convallaria. (*L.*)

‡ Mai-Juin.

[T. n° 518.]

AR. Bois montueux, rochers, rocailles, coteaux arides. C. par place. Pulvermühl, Neudorf. BL.

**466. Maianthemum.** (*Wiggers, Primit. fl. Holsat.* 15.) — Maianthème. — Schattenblume. [IV, 1.]

1229) *M. bifolium*. (DC. *Fl. F. III.* 177.) Zweeblatt. T. n° 241.  
 4 Mai-Juin.

AC. par place. Manque sur de grands espaces. Bois montueux, lieux ombragés.

467. **Paris**. (*L. Gen.* 198.) — Parisette. — Einbeere. [VIII, 4.]

1230) *P. quadrifolia*. (*L. Sp.* 526) . . . . . T. n° 611.  
 4 Mai. Fr. Août.

AC. par place. Manque sur de grands espaces. Bois humides.

## CLASSE II. — Inferovariées.

### CIV. DIOSCOREAE.

(R. Br. Prod. Nov. Holl. 294.)

468. **Tamus**. (*L. Gen.* 524.) Tamier. Schmeerwurz. [XXII, 6.]

1231) *T. communis*. (*L. Sp.* 1458) . . . . . T. n° 1414.  
 4 Mars-Avril. Fr. Août.

AC. Bois, buissons, broussailles. Fels (Schengen) A. EF. Kz. Dudelage. Md. (Courtois). Krautemesgrund. (Esch s|A.) BL!

### CV. IRIDEAE.

(Juss. Gen. 571.)

469. **Iris**. (*L. Gen.* 27.) — Iris. — Schwertel. [III, 1.]

1232) † *I. germanica*. (*L. Sp.* 55) . . . . . T. n° 50.  
 4 Avril-Mai.

C. Cultivé et quelquefois subspontané. Clausen, Basse-Pétrusse, Pulvermühl, BL!

1233) † *I. pumila*. (*L. Sp.* 56) . . . . . T. n° 49.  
 4 Avril-Mai.

AR. Cultivé et par-ci par-là subspontané.

1234) *I. Pseudo-Acorus*. (*L. Sp.* 56). . . . . T. n° 51.  
 4 Juin-Juillet.

C. Bords des rivières, étangs, marécages, fossés aquatiques.

### CVI. AMARYLLIDAE.

(R. Br. Prod. Nov. Holl. 296.) [VI, 1.]

470. **Narcissus**. (*L. Gen.* 161.) — Narcisse. — Narzisse.

1235) *N. Pseudo-Narcissus*. (*L. Sp.* 414). . . . . T. n° 510.  
 4 Mars-Avril.

R. Prairies. Stemeschwies dans la vallée de la Leespech entre Greisch et Tuntingen. DW.! A rechercher en Ardennes.

1236) † *N. poeticus*. (*L. Sp.* 414) . . . . . T. n° 509.  
 4 Avril-Mai.

AC. Cultivé.



**471. Leucolum.** (*L. Gen.* 160.) — Nivéole. — Knotenblume.

1237) † *L. vernum.* (*L. Sp.* 414) . . . . . T. n° 507.

‡ Mai-Juin.

AC. Cultivé et quelquefois subspontané.

**472. Galanthus.** (*L. Gen.* 160.) Galanthine. Schneeglöckchen.

1238) † *G. nivalis.* (*L. Sp.* 413.) Perce-neige . . T. n° 508.

‡ Février-Mars.

C. Cultivé et quelquefois subspontané.

## CVII. ORCHIDEEAE.

(*Juss. Gen.* 64.) [XX, 1 et 2.]

Tribu I. — Ophrydeæ. (*Lindl. Orch.* 280.)

**473. Aceras.** (*R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. V.* 191 *ex parte.*)

— Aceras. — Ohnhorn.

1239) *A. anthropophora.* (*R. Br. l. c.*) Gehänkte Männchen.

Synonymes. *Ophrys anthropophora.* (*L. Sp.* 1343.) [T. n° 1285.

*Himantoglossum anthropophorum.* (*Spr. sys.* 3. 694.)

*Loroglossum anthropophorum.* (*L. C. Rich. Orch. Eur.* 32.)

‡ Mai-Juin.

R. Pelouses, coteaux secs, clairières des bois sur le calcaire. Rodenhof, Kahlseheuer, Kempchen (Fouhren). (Courtois.) Md. K. Vallée de la Sûre. Diekirch, Echternach (Brimmeyr et M.) Niesbüsch (Greiveldange.) T. Md. Versant oriental du Scheuerberg (Remich). (Layen). Fels (Schengen.) T. Fels (Mertert.) BB. BL! Manternach. R.

**474. Loroglossum.** (*L. C. Rich. Orch. Eur. in Mém. Mus.* IV.

47 *ex parte.*) — Loroglosse. — Riemenzunge.

1240) *L. hircinum.* (*Rich. l. c.* 54.) Bocksbärt. T. n° 1277.

Syn. *Satyrium hircinum.* (*L. Sp.* 1337.)

*Orehis hircina.* (*Crantz, Stirp. Aust.* 484.)

*Himantoglossum hircinum.* (*Spr. sys.* 3. 694.)

*Aceras hircina.* (*Lindl. Orch.* 282)

‡ Mai-Juillet.

AR. Pelouses, taillis montueux, lisières des bois. Kempchen (Fouhren). (Courtois). Mersdorf. T. Md. M. R. Minerley (Echternach.) Niesbüsch (Greiveldange.) Md. T. Ehnen. T. Canach, Lenningen, Remich, Wellenstein (Layen). Fels (Mertert.) R. M. Hohfels près de Machthum et Ahn. BB. EF. Kz.

**475. Anacamptis.** (*Rich. l. c.* 47.) Anacamptis. Hundswurz.

1241) *A. pyramidalis.* (*Rich. l. c.* 41) . . . . . T. n° 1268.

Syn. *Orchis pyramidalis*. (*L. Sp.* 1332.)

— *condensata*. (*Desf. Atl.* 2. p. 316.)

*Aceras pyramidalis*. (*Rehb. Ic. vol.* 13. p. 6 t. 9)

#### ‡ Mai-Juin.

R. Coteaux secs, herbeux, bois. Beggen. M. Steinsel. T. Ernzerberg (Echternach.) M. Kempchen (Fouhren.) Md. K. Entre Manternach et Mertert. R. Littoral de la Moselle. Wintrange, Schengen. (Dmtr. Michel, Layen). Reif (Wellenstein.) Kz. Ehnen. BB. Niesbüsch (Greiveldange) Md.

**476. Orchis.** (*L. Gen.* 1009 *ex parte.*) — *Orchis*. — Knabenkraut.

1242) *O. ustulata*. (*L. Sp.* 1333) . . . . . T. n° 1272.

#### ‡ Mai-Juin.

R. Prairies, coteaux herbeux, lisières des bois. AC Prairies de l'Eisch de Hobscheid à Hollenfels. Md. DW. — R. Marienthal, Md, vis-à-vis d'Ingeldorf. Md. K. Diekirch, Bettendorf, Reisdorf. T. Mærdsdorf, Echternach (Brimmeyr père.) M. Scheuerhof (Canach). (Layen).

1243) ? *O. tridentata*. (*Scop. fl. Carn.* 2. p. 190.) T. n° 1274.

Syn. *Orchis variegata*. (*All. ped.* 2. 147.)

— *Simia*. (*Villars, fl. Dauph.* 2. 33.)

— *cercopithecica*. (*Lmk. Dict.* 4. 593.)

— *Scopoli*. (*Timbal-Lagrave, diag.* 1850.)

#### ‡ Mai-Juin.

R. Prés montueux, humides. Hollenfels. T. Kempchen (Fouhren.) Md. K. Leningen, entre Remich et Schengen (Layen).

1244) *O. purpurea*. (*Huds. Fl. Ang. ed.* 1. p. 334.) T. n° 1273b.

Syn. *Orchis militaris*. (*L. Sp.* 1334, *var.*  $\beta$  et  $\gamma$ .)

— *fusca*. (*Jacq. Aust. IV. t.* 307.)

#### ‡ Mai-Juin.

R. Bois montueux. Environs de Kopstal. Md. BB. Kahlscheuer, en dessous du Rodenhof. BB. Bereldange, Helmdange. Blaschette, Mersch, Goldknop (Diekirch.) Md. K. T. Ernsterberg (Echternach.) M. Mærdsdorf. R. Reif (Wellenstein.) Kz. Fels (Mertert.) BB. Remich (Layen).

*Var.  $\beta$ . Jacquini.* (*God. fl. Lorr. éd. I.* 3. 33.)

Syn. *Orchis hybrida*. (*Böungh. in Rehb. fl. exc.* 125.)

— *fusca.  $\beta$ . stenoloba.* (*Coss. et Germ. fl. Par. éd. 1.* 550.)

— *militaris.  $\gamma$ . hybrida.* (*Lindl. Orch.* 271.)

— *fusco-Rivini.* (*Timb. Mém. hybrd. p.* 16.)

— *mimusops.* (*Thuill. Fl. Par.* 458.)

R. Bois d'Echternach. (Brimmeyr père).

*Var.  $\gamma$ . moravica.* (*Jacq. Icon. rar. I.* 182) . . . . . L. 1239.

Avec le type dans la vallée de la Sûre inférieure. L.

1245) *O. militaris*. (*L. fl. Succ. ed. 2. p. 310*) . . . T. n° 1273.

Syn. *Orchis militaris*. (*L. Sp. 1333 excl. Var. β, δ, ε.*)

— Rivini. (*Gouan, ill. p. 74*)

— galeata. (*Poir. in Lmk. Dict. 4. p. 593.*)

— cinerea. (*Schrank, baier. Fl. 241.*)

#### ‡ Mai-Juin.

AR. Clairières des bois, pelouses ombragées, humides, près montueux. Grünewald. T. Beggen, Ronnenbüsch (Ansembourg), Mersch, Delling (Tuntingen.)  
 DW. Diekirch. T. Kempchen (Courtois.) Md. Mersdorf. Md. Ernsterberg (Echternach.) M. Niesbüsch (Greiveldange.) Md. Canach (Layen). Depuis Schengen jusqu'à Wormeldange (Layen).

Var. *β. nervata*. (*Marchand, Verhandlung over te Standelkruider van het G. Hgd. Luxemburg. p. 436. 9.*)<sup>1)</sup>

R. Bois montueux. Kahlscheuer. Md. Kempchen (Fouhren). Mersdorf, Niesbüsch (Greiveldange).

1246) *O. Simia*. (*Lmk. Fl. Fr. III. 507*) . . . . T. n° 1273.

Syn. *Orchis tephrosanthos*. (*Vill. fl. Dauph. 2. p. 32.*)

— *militaris*. (*L. Sp. 1333. Var. ε.*)

— *zoophora*. (*Thuill. Fl. Par. 459.*)

#### ‡ Mai-Juin.

R. Clairières et lisières des bois, pelouses ombragées. Kempchen (Fouhren). (Courtois).

1247) *O. coriophora*. (*L. Sp. 1332*) . . . . T. n° 1269.

#### ‡ Mai-Juin.

AG. Prairies, pâturages fertiles des bords de la Sûre et de la Moselle. Michelau (Ardennes.) BL. Diekirch, Gilsdorf, Longsdorf, Mœstroff. Md. Matteswies (Echternach.) M. — R. Ansembourg, Hollenfels, Beggen, etc. T.

1) Linné avait compris sous le même type spécifique les *Orchis purpurea*, *militaris* et *Simia*, qui ne sont aujourd'hui pas encore unanimement considérés comme bonne espèce. Marchand y a ajouté en 1827 l'*Orchis nervata*, sur lequel l'attention ne s'est pas fixée, le recueil où il a été publié n'étant abordable qu'à un public restreint. C'est ce qui nous engage à en donner la description suivante :

**Orchis nervata.** (*Md. de Orchideis Magni Ducatus Luxemburgensis l. c. 436. Pl. IV. fig. III.*)

Bulbes entiers, ovoïdes ou subglobuleux. Tige de 3—4 décimètres, robuste dressée, non fistuleuse. Feuilles oblongues-lancéolées. Bractées un peu plus courtes que l'ovaire, à nervures distinctes. Fleurs assez grandes, en épi ovoïde, court, gros, assez lâche, à casque d'un violet pâle ou grisâtre en dehors, purpurin en dedans, légèrement ponctué, avec 3 stries de couleur violette et pourpre en dedans, à labelle rosé, marqué de petites houppes purpurines, peu nombreuses. Périanthe à divisions conniventes en casque ovoïde-lancéolé. Labelle 3—partit; les lobes latéraux lancéolés, mucronés, obliquement divergents; le lobe moyen s'élargissant insensiblement à partir de la base, 4—fide. Eperon à peine courbé, regardant en bas, obtus, plus court que le quart de la longueur de l'ovaire.

- 1248) *O. Morio*. (*L. Sp.* 1333.) Schlesselblum. . . T. n° 1270.  
 2 Mai-Juin.  
 AC. Prairies, pâturages, clairières des bois. C. Merl, Grevels, Bertrange. Md.  
 AR. Ardennes.
- 1249) *O. pallens*. (*L. Mant.* 292) . . . . . T. n° 1275.  
 2 Mai-Juin.  
 R. Pelouses montueuses, bois clairiés. Fischbach. T. Mersch. T. Md. Schengen.  
 (Layen).
- 1250) *O. mascula*. (*L. Sp.* 1333.) Cruchteblum. T. n° 1271.  
 2 Avril-Juin.  
 AC. Bois montueux, prairies, lisières des bois.  
 Var.  $\beta$ . *speciosa*. (*Host. fl. aust.* 2. 527.)  
 AR. Bois de Remich (Layen).  
 Var.  $\gamma$ . *minima*. (*Md. l. c. p.* 430. 3). . . . . T. n° 1271c.  
 Avec l'espèce. Kockelscheuer, Merl Md. T.
- 1251) *O. laxiflora*. (*Lmk. Fl. Fr. III.* 504) . . . . . T. n° 1276.  
 2 Juin-Juillet.  
 R. Prairies humides, bois marécageux. Reckange. T. Matteswies (Echternach.) M.
- 1252) *O. maculata*. (*L. Sp.* 1335) . . . . . T. n° 1281.  
 2 Juin.  
 C. Prairies humides, bois.
- 1253) *O. latifolia*. (*L. Sp.* 1334) . . . . . T. n° 1280.  
 2 Mai-Juillet.  
 AC. par place. Bois humides. Dudelange. Md. Dommeldange. Grünenwald. T.  
 T. Kahlscheuer. T. Schwanenthal (Hunsdorf.) BL. Blaschette. T. Mersch. T.  
 Wahlenbrouch (Diekirch.) Md. K. Erpeldange, Echternach. M. Steemeschwies  
 (Greisch.) Kz. Littoral de la Moselle. (Layen).  
 Var.  $\beta$ . *Traunsteineri*. (*Sauter in Koch, syn. ed.* 1. 688.)  
 R. Prairies aux environs de Diekirch. Md. Dmtr. (Est l'*O. sambucina*. Md.)
- 1254) *O. sambucina*. (*L. Sp.* 1334) . . . . . T. n° 1278.  
 2 Mai-Juin.  
 R. Prés montueux, coleaux secs. Matteswies (Echternach.) M.
- 1255) *O. incarnata*. (*L. fl. succ. p.* 312. *sp.* 1335) T. n° 1279.  
 Syn. *Orehis divaricata*. (*Rich. in Mérat. fl. Par. éd.* 2. 94.)  
 2 Juin.  
 AR. Prés et bois marécageux et tourbeux (Heedgen) derrière Heisdorf. Md.  
 Grünenwald. T. Matteswies (Echternach). Nommern. BL. !  
 Var.  $\beta$ . *angustifolia*. (*Wimm. et Grab. Fl. Schl.* 323.) T. n° 1280b.  
 AR. Prés humides près du Hackenhof. (Layen).

**477. Ophrys.** (*L. Gen.* 1011 *ex parte.*) Ophrys. Frauenthräne.

1256) *O. muscifera.* (*Huds. Fl. Angl. ed.* 1. 340.) T. n° 1286.

Syn. *Ophrys insectifera.* (*L. Sp.* 1343.)

— *myodes.* (*Jacq. Misc. II.* 373.)

‡ Mai-Juin.

R. Coteaux herbeux, pelouses, clairières et lisières des bois montueux, calcaires. Dudelange, Grünewald, bois de Bereldange. BB. Steinsel, Helmsange. T. Krobëbüsch (Lorentzweiler.) Kz. Mersch, Reckingen, Kablenberg (Diekirch.) T. Kempchen (Fouhren.) K. Md. (Courtois). Beaufort (Michel et Dmtr.) Md. Côtes de la Sûre. Vianden. Md. Ernsterberg (Echternach.) M. Mersdorf. R. Wasserbillig (Löhr). Niesbüsch (Greiveldange.) Md. Reckingerhof (Layen). Remich. Md. Föls, (Mertert.) R.!

1257) *O. aranifera.* (*Huds. Fl. Angl. ed.* 2. 392.) Affekap.

Syn. *Ophrys insectifera.* (*L. Sp.* 1343. ♂.)

[T. n° 1287.

— *pseudo-speculum.* (*DC. fl. Fr.* V. 332.)

‡ Mai-Juin.

R. Pâturages, coteaux herbeux, clairières et lisières des bois calcaires. Kahl-scheuer. Md. Diekirch. T. Echternach. M. (Löhr). Canach, Elvingen (Layen). Wintrange. T. Hoffels (Machtum.) EF. Kz.

1258) *O. fuciflora.* (*Sequier, Rech. ic. 9. f.* 1162. 1165.) T. n° 1288.

Syn. *Ophrys arachnites.* (*Reichard. fl. mæno-francof.* 2. 89.)

— *insectifera.* (*L. Sp.* 1343. ♀.)

‡ Mai-Juin.

AR. Coteaux herbeux, clairières des bois de la Basse-Sûre et de la Moselle. Kempchen (Fouhren.) Md. (Courtois.) K. Diekirch. Md. T. Ernsterberg (Echternach.) M. Stadlbredimus, Remich, Wintrange. T. Remerschen. BB. Schengen. T. Hoffels (Machtum.) BB. Grevenmacher. T. Föls, Mertert. EF. Kz.

1259) *O. apifera.* (*Huds. Fl. Angl. ed.* 1. 340.) T. n° 1289.

Syn. *Ophrys insectifera.* (*L. Sp.* 1343. ♂.)

‡ Mai-Juin.

AR. Clairières des bois montueux avec la précédente. Diekirch, entre Bettendorf et Longsdorf. BL. Ernsterberg (Echternach.) M. Rosport, Mersdorf. Md. Remerschen. BB. Remich (Dmtr. et Michel.) Md. Hœchten (Ehnen.) BB. Föls (Mertert.) BL.

Var.  $\beta$ . *apiculata.* (*Dmtr. Prod.* 1763.) <sup>1)</sup> . . . R. Fl. Sp. 1292.

Avec le type entre Schengen et Remich (Dmtr. et Michel).

**478. Herminium.** (*Rich. Orch. Eur. in Mém. Mus. IV.* 49.) —

Herminie. — Ragwurz.

1) *O. bombiliflora.* (*Link. in Schrad. diar.* 2), indiqué par Lejeune (*Comp. n° 1554*) comme croissant dans le Grand-Duché est particulier à la Corse. Ce qui a été pris pour lui est *O. apifera*, Var.  $\beta$ . ci-dessus.

1260) *H. Monorchis*. (*R. Br. in Hort. Kew. ed. 2. V. 191.*)

Syn. *Ophrys Monorchis*. (*L. Sp. 1342.*)

*Hermidium clandestinum*. (*Gren. et God. Fl. Fr. III. 299.*)

‡ Juin-Juillet.

[T. n° 1284.

R. Prés, pâturages secs ou humides, coteaux herbeux. Kahlscheuer, Dommel-dange. T. M. Grünwald. Md. Klingelscheuer. Md. Eisembourg. Md. Blaschette. T. Kempchen (Fouhren.) Md. K. (Courtois). Ingeldorf. Md. Diekirch. Md. T. Ellingen (Mondorf). Schwebsingen, Wellenstein (Layen).

479. *Gymnadenia*. (*R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. V. 191 emend.*) — Gymnadénie. — Höswurz.

1261) *G. conopsea*. (*R. Br. l. c.*) . . . . . T. n° 1283.

Syn. *Orehis conopsea*. (*L. Sp. 1335.*)

‡ Juin-Juillet.

R. Prairies, pâturages, coteaux herbeux, clairières et lisières des bois. Beggen. M. Rodenhof. BB. Kahlscheuer. T. Blaschette. Md. T. Fischbach. Md. Kempehen (Fouhren.) Md. K. Rosport. Md. Matteswies (Echternach.) M. Manternach, Mertert. R. Fels (Schengen), Bous, Canach, Beyerholz, Greiveldange, Gostingen (Layen).

Var. *β. ornithis*. (*Jacq. Aust. t. 138.*) *albiflora*. . . T. n° 1283*b*.  
Avec l'espèce à Rodenhof (Kopstal.) Md.

1262) *G. odoratissima*. (*Rich. loc. cit. 57*). Meyer. Orch. 16.

Syn. *Orehis odoratissima*. (*L. Sp. 1335*)

‡ Mai-Juin.

R. Prairies tourbeuses, coteaux calcaires, herbeux, clairières des bois. Echternach. M. Schrondeweiler. BL. Clausen. BL.

1263) ? *G. albida*. (*Rich. l. c. 35*) . . . . . Meyer. Orch. 17.

Syn. *Orehis albida*. (*Scop. Carn. 2. p. 201.*)

*Satyrium albidum*. (*L. Sp. 1338.*)

*Habenaria albida*. (*Sw. summ. scand. 1814. 32.*)

*Platanthera albida*. (*Lindl. Orch. 299.*)

*Leucorchis albida*. (*E. Mey. Chl. Hanov. 539.*)

‡ Juin-Juillet.

R. Pelouses escarpées. Rodeshof (Echternach.) M.

1264) *G. viridis*. (*Rich. l. c. 57*) . . . . . T. n° 1282.

Syn. *Orehis viridis*. (*Crantz. Aust. 491.*)

*Satyrium viride*. (*L. Sp. 1337.*)

*Platanthera viridis*. (*Lindl. Orch. 299.*)

*Habenaria viridis*. (*R. Bw. Kew. 5. p. 192.*)

‡ Juin-Juillet.

AC. Prés humides. Pétrusse, Kopstal, Eisembourg, Md. Entre Junglinster et Godbrange, à gauche de la route. A. Wahlenbrouch (Diekirch.) Md. Echternach. M.

**480. Platanthera.** (*Rich. Orch. Eur. in Mém. Mus. IV. 48.*) —  
Platanthère. — Kukueksblume.

1265) *P. bifolia.* (*Rich. l. c. 57*) . . . . . T. n° 1267.

Syn. *Orchis bifolia.* (*β. L. Sp. 1331.*)

— — *β. brachyglossa.* (*Wall. Sched 486.*)

*Platanthera solstitialis.* (*Bönningh. in Rehb. Fl. exc. 120.*)

*Conopsidium sthenantherum.* (*Wallr.*)

*Satyrium bifolium.* (*Whib. succ. 558.*)

‡ Mai-Juin.

AC. Bois, pâturages, prairies humides. Fels (Schengen), T. Echternach (Brimmeyr père). Neumühl (Mandelbach), Schwanenthal (Heisdorf.) BL. Grünewald. T. etc. R. Ardennes. Erpeldange (Wiltz.) Kz.

1266) *P. chlorantha.* (*Custor ap. Reich. in Mœssl. Handb. 2. p. 1565.*) . . . . . C. et Lej. Comp. n° 1533.

Syn. *Orchis bifolia.* (*γ. h. Sp. 1331.*)

— *montana.* (*Schmidt, fl. Born. p. 35.*)

— *Conopsidium platantherum.* (*Wallr.*)

‡ Juin-Juillet.

R. Bois feuillus. Nommern. BL. Cruichten. M. Vallée de la Sûre. Echternach. Md. (Brimmeyr père). Mœrsdorf. M. R. Manternach à Mertert. R. Vallée de la Moselle : Machtum, Ehnen. BB.

Tribu II. — *Gastrodieæ.* (*Lindl. l. c.*)

**481. Epipogon.** (*Gmel. Sib. 1. p. 12. t. 2. f. 2.*) — Epipogon. —  
Widderbart.

1267) *E. aphyllus.* (*Swartz, summ. veg. scand 1814. 32.*)

[Lej. et C. Comp. n° 1558.

Syn. *Epipogon Gmelini.* (*Rich. l. c. 36.*)

*Satyrium Epipogium.* (*L. Sp. 1338.*)

*Orchis aphylla.* (*Schmidt. l. c.*)

‡ Juillet-Août.

R. Forêts de hêtre humides et sombres des Ardennes. L. et C.

Tribu III. — *Neotieæ.* (*Lindl. l. c.*)

**482. Limoderum.** (*Tournf. Inst. 250.*) — Limodore. — Dingel.

1268) *L. abortivum.* (*Swartz, act. Holm. VI. 80.*) T. n° 1297.

Syn. *Orchis abortiva.* (*L. Sp. 1336.*)

‡ Juin-Juillet.

R. Clairières et lisières herbeuses des bois montueux, buissons et genévriers. Vallée de la Basse-Sûre et de la Moselle, par place. Echternach. M. Rosport. T. Hoffels (Machtum.) BB. ! Dreibern, Wormeldange (Layen). Fels (Mertert-Manternach.) BB. !

**483. Cephalanthera.** (*Rich. l. c. 51.*) — Cephalanthère. — Waldvöglein.

1269) *C. grandiflora.* (*Babingt. Man. Brit. bot. 296.*) T. n° 1293.

Syn. *Cephalanthera pallens.* (*Rich. l. c. 60.*)

*Epipactis pallens.* (*Willd. Sp. 4. 85.*)

*Serapias grandiflora.* (*L. Mant. 471.*)

— *lanceifolia.* (*Murr. syst. veg. 815.*)

— *longifolia.* (*L. Sp. 1345. ♂. part.*)

*Epipactis lanceifolia.* (*DC. fl. Fr. III. 261.*)

‡ Mai-Juin

AC. Bois ombragés, humides. Dudelange. Schifflange. Kz. Md. Kahlscheuer. BB. Rodenhof. Md. Niederanven. T. Reckingen. T. Mandelbach. Kz. Nommern. BL. Altrier. Kz. Mœrsdorf. Md. Mondorf. T. Greiveldange (Layen). Reif (Wellenstein.) A. EF. Kz. Fels (Schengen.) A. EF. Kz.

1270) *C. Xiphophyllum.* (*Rchb. fil. Ic. XIII. 135. t. 470.*) T. n° 1292.

Syn. *Cephalanthera ensifolia.* (*Rich. l. c. 38.*)

*Epipactis* — (*Schwartz. Act. Holm. 1800. 232.*)

*Serapias Xiphophyllum.* (*L. fil. suppl. 404.*)

— *longifolia.* (*♂. ex parte. L. Sp. 1345*)

— *ensifolia.* (*Murr. syst. veg. 815.*)

‡ Mai-Juillet.

R. Pelouses humides, taillis, forêts. Kahlscheuer. Md. Niederanven. Md. T. Seitert (Diekirch.) Md. Mœrsdorf. Md. T. T. Bous, Reckingerhof et vallée de la Moselle (Layen.) Reif (Wellenstein). Fels (Schengen.) A. EF. Kz.

1271) *C. rubra.* (*Rich. l. c. 38*) . . . . . T. n° 1294.

Syn. *Serapias rubra.* (*L. Mant. 490.*)

— *longifolia.* (*♂. ex parte. L. Sp. 1345.*)

*Epipactis rubra.* (*All. Ped. II. 153.*)

‡ Juin-Juillet.

R. Forêts, coteaux boisés. Greiveldange, Canach (Layen). Grünenwald près du Kiém. BL. Au-dessus de Dommeldange BL. Niederanven. Md. Dudelange. Md. T. — C. Wasserfall (Schifflange.) Kz.

**484. Epipactis.** (*Rich. l. c. 51.*) — Epipactis. — Sumpfwurzel.

1272) *E. latifolia.* (*All. Ped. II. 152.*) . . . . . T. n° 1291.

Syn. *Epipactis Helleborine.* (*Crantz, Stirp. Aust. IV. 467.*)

*Serapias Helleborine. α. latifolia.* (*L. Sp. 1344.*)

— *latifolia.* (*L. Mant. 490.*)

‡ Juillet-Août.

AC. Bois, taillis, coteaux boisés. Diekirch, Dudelange, Kayl, Tétange. T.



Var.  $\beta$ . *microphylla*. (*Ehrh. Beitr.* 4. p. 42) . . . T. n° 1291b.

R. Avec l'espèce. Clausen, Siehenhof. Md.

Var.  $\gamma$ . *varians*. (*Crantz, Aust.* VI. 462.)

Avec le type dans les forêts ombragés. Reif (Wellenstein.) Kz.

1273) *E. palustris*. (*Crantz, Aust.* VI. 462. 2. 1. f. 5.) T. n° 1290.

Syn. *Serapias longifolia*. (*L. Sp.* 1345. Var.  $\beta$ . et  $\gamma$ .)

— *palustris*. (*Scop. Carn. ed.* 2. 204.)

‡ Juin-Juillet.

R. Bois humides, près tourbeux. Kahlscheuer. T. Md. Neumaxmühle. T. Neumühl (Mandelbach.) Kz. Echternach. Md. (Brimmeyr père). Reckingerhof (Layen). Lenningen, Canach, Ehnén (Layen).

**485. Neottia.** (*Rich. l. c.* 12.) — Néottie. — Vogelnest.

1274) *N. Nidus-avis*. (*Rich. l. c.* 59) . . . . . T. n° 1295.

Syn. *Epipactis Nidus-avis*. (*Crantz, Stirp. Aust.* 475.)

*Ophrys* — (*L. Sp.* 1339.)

‡ Mai-Juin.

AC. par place. Manque sur de grands espaces. Couvert des bois. R. Ardennes.

**486. Listera.** (*R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed.* 2. V. 201.)—Listerie.

— Zweiblatt.

1275) *L. ovata*. (*R. Br. l. c.*) . . . . . T. n° 1296.

Syn. *Ophrys ovata*. (*L. Sp.* 1340.)

*Neottia ovata*. (*Bluff. et Fingerh. Comp.* 453.)

— *latifolia*. (*Rich. l. c.* 59.)

*Epipactis ovata*. (*Crantz, Stirp. Aust.* 473.)

‡ Mai-Juin.

AC. par place. Bois, taillis herbeux, prairies humides Birkenwäldchen (Luxembourg). Felsmühl, Völkerbach (Echternach). Grossebüsch (Grevenmacher). Fels (Schengen.) Kz. R. Ardennes. Friedbüsch. BL!

**487. Spiranthes.** (*Rich. l. c.* 50.)—Spiranthe. — Wendelorchée.

1276) ? *S. æstivalis*. (*Rich. l. c.* 58). Layen, Orchidées. 189.

Syn. *Neottia æstivalis*. (*DC. fl. Fr.* III. 258.)

*Ophrys* — (*Lmk. Dict.* IV. 567.)

‡ Juillet-Août.

R. Prairies marécageuses, marais tourbeux. Reckingerhof (Layen).

Tribu IV. — *Cypripediæ*. (*Lindl. l. c.*)

**488. Cypripedium.** (*L. Gen.* 1015.) Cypripède. Frauenschuh.

1277) *C. Calceolus*. (*L. Sp.* 1346). . . . . T. n° 1298.

‡ Mai-Juin.

R. Couvert des bois dans les jeunes coupes. Forêt de Grevenmacher T. district Hart, lieu dit Stolzenberg. Kz.

SUBDIVISION II. — **Périspermées.**CLASSE I. — **Spiciflores.**

## CVIII. JUNCAGINEAE.

(Rich. in Mém. Mus. II. 365.) [VI, 3.]

**489. Triglochin.** (*L. Gen.* 453.) — Troscart. — Dreizack.1278) *T. palustris.* (*L. Sp.* 482) . . . . . T. n° 564.

‡ Juin-Juillet.

AR. Prairies humides ou spongieuses. Kahlscheuer, Blaschette, Mersch. T. Bomühl (Schrassig.) BL. !

## CIX. POTAMEAE.

(Juss. in Diet. Sc. nat. t. 43. 93.) [IV, 4.]

**490. Potamogeton.** (*Tournf. Inst.* 103.) Potamot. Laichkraut.Sect. I. — *Diversifolii.* (*Coss. et Germ. fl. Par.* 572).1279) *P. natans.* (*L. Sp.* 182) . . . . . T. n° 277.

‡ Juin-Août.

C. Mares, étangs, eaux tranquilles, bords des rivières.

1280) *P. polygonifolius.* (*Pourret, Chl. narb. act. toul.* 3. p. 325.)*P. oblongus.* (*Viv.*) . . . . . T. n° 280.

‡ Juin-Août.

AC. Étangs, mares, ruisseaux de l'Ardenne.

1281) *P. fluitans.* (*Roth. Tentam. fl. Germ.* 1. 72 et 2. 202.)

‡ Juillet-Août. [T. n° 278.]

AR. Rivières, eaux stagnantes et courantes. Sûre lez Gilsdorf. K.

1282) *P. alpinus.* (*Balbis, Misc. p.* 13.) *P. rufescens.* (*Schrad.*)

‡ Juin-Août. [T. n° 288.]

R. Fossés, mares, eaux stagnantes, étangs. Bassin du jardin d'Ansembourg. T. Md. Our entre Bivels et Stolzenbourg. (Courtois).

1283) *P. gramineus.* (*L. Gen.* 184) . . . . . T. n° 281.

‡ Juin-Août.

AR. Eaux stagnantes, mares, étangs, rivières.

Var. *β. heterophyllus.* (*DC. Fl.* 1. 844) . . . . . T. n° 279.

‡ Juin-Août.

R. par place. Eaux courantes et stagnantes. Fischbach, Burel. T.

Sect. II. — *Conformifolii.* (*Coss. et Germ. l. c.*)1284) *P. lucens.* (*L. Sp.* 183) . . . . . T. n° 282.

‡ Juin-Août.

C. par place. Eaux stagnantes et courantes, ruisseaux, rivières, étangs.

1285) *P. perfoliatus*. (*L. Sp.* 182) . . . . . T. n° 284.  
 ☿ Juin-Août.

C. Eaux stagnantes et courantes, rivières, ruisseaux, étangs.

1286) *P. crispus*. (*L. Sp.* 183) . . . . . T. n° 286.  
 ☿ Mai-Septembre.

C. Eaux stagnantes, mares, étangs, fossés.

1287) *P. densus*. (*L. Sp.* 182) . . . . . T. n° 285.  
 ☿ Juin-Septembre.

C. Fossés, mares, sources, ruisseaux, étangs. R. Ardennes.

Sect. III. — Graminifolii. (*Coss. et Germ. l. c.*)

1288) *P. compressus*. (*L. Sp.* 183) . . . . . T. n° 287.  
 ☿ Juillet-Août.

AR. Fossés, mares, eaux stagnantes.

1289) *P. obtusifolius*. (*Mert. et Koch. Deutsch. Fl.* 1. 855.)  
 ☿ Juin-Août.

R. Mares, étangs, fossés. Environs de Luxembourg. (*Wtg. Fl. R.* 433.)

1290) *P. pusillus*. (*L. Sp.* 184) . . . . . T. n° 292.  
 ☿ Juin-Septembre.

AC. par place. Mares, fossés, ruisseaux, étangs. C. Alzette à Clausen. Kz. Echternach (Brimmeyr père).

1291) *P. pectinatus*. (*L. Sp.* 183) . . . . . T. n° 291.  
 ☿ Juin-Août.

AC. Ruisseaux, rivières, fossés, étangs. Alzette entre Hesperange et Luxemb.!

**491. Zannichellia.** (*L. Gen.* 1034.) — Zannichellie. [XXI, 1.]

1292) *E. palustris*. (*L. Sp.* 1375) . . . . . T. n° 1300.  
 ☿ Mai-Septembre.

AC. par place. Eaux stagnantes et courantes. C. Albach (Mondorf.) EF. Kz.

**CX. NAIADAE.**

(*Lmk. Handb.* I. 820.) [XXI, 1.]

**492. Najas.** (*L. Gen.* 1096.) — Naiade. — Nixkraut.

1293) *N. major*. (*Roth. Germ.* II. 499.) Sèlm. . . . . T. n° 1366.  
 ☿ Août-Septembre.

AC. Dans les courants peu rapides de la Moselle. T. Remich, Grevenmacher. BL. — C. dans les années à température élevée.

**CXI. LEMNACEAE.**

(*Duby, Bot. Gall.* 532. *Link. Handb.* I. 289.) [II, 1.]

**493. Lemna.** (*L. Gen.* 1038.) — Lenticule. — Wasserlinse.

1294) *L. trisulca*. (*L. Sp.* 1376) . . . . . T. n° 1307.

① ou 2 Avril-Mai.

R. Mares, fossés, étangs.

1295) *L. minor*. (*L. Sp.* 1378) . . . . . T. n° 1305.

① ou 2 Avril-Juin.

C. Mares, fossés.

1296) *L. gibba*. (*L. Sp.* 1377) . . . . . T. n° 1306.

① ou 2 Avril-Juin.

AC. par place. Mares, fossés.

1297) *L. polyrrhiza*. (*L. Sp.* 1377) . . . . . T. n° 1308.

2 Mai-Juin.

R. Mares, fossés, rivières à courant peu rapides.

## CLASSE II. — Spadiciflores.

### CXII. AROIDEAE.

(*Juss. Gen.* 23.)

**494. Arum.** (*L. Gen.* 1028 *ex parte.*) Gouet. Aron. [XXI, 1.]

1298) *A. maculatum*. (*L. Sp.* 1370.) Ieselsöeren. Perderches-  
wurzél . . . . . T. n° 1369.

2 Mai-Juillet.

AC par place. Lieux ombragés, haies, bois frais. R. Ardennes.

**495. Calla.** (*L. Gen.* 1030.) — Calla. — Schweinekraut. [XXI, 1.]

1299) *C. palustris*. (*L. Sp.* 1373.)

2 Juin-Juillet.

R. Marais tourbeux. Nœrtrange, Troine. K.

**496. Acorus.** (*L. Gen.* 434.) — Acore. — Kalmus. [VI, 1.]

1300) *A. Calamus*. (*L. Sp.* 462 *excl. Var. β.*) Kalmes. T. n° 531.

2 Juin-Juillet.

AC. Manque sur de grandes étendues. Bords des eaux. Pétrusse, Korn, Our, Sûre. C. Moselle.

### CXIII. TYPHACEAE.

(*Juss. Gen.* 23.) [XXI, 3.]

**497. Typha.** (*L. Gen.* 1040.) — Massette. — Rohrkolben.

1301) *T. latifolia*. (*L. Sp.* 1377) . . . . . T. n° 1309.

2 Juin-Août.

AR. Étangs, fossés, rivières, lieux marécageux au-dessus du fourneau de Dom-meldange. T. Eisch, depuis le déversoir jusqu'aux forges d'Ansembourg. Kz.



Var.  $\beta$ . repens. (Koch, syn. 843.) *J. uliginosus*. (Roth. tent. 2. 1. p. 405.)

AC. Avec l'espèce.

Var.  $\gamma$ . fluitans. (Lmk. Fl. Fr. 2. 589) . . . . . T. n° 540.

R. Lieux tourbeux. Rambrouch. T.

1313) *J. squarrosus*. (L. Sp. 465) . . . . . T. n° 545.

24 Juin-Août.

C. Tourbières, pâturages, bruyères et bois humides de l'Ardenne. R. ailleurs.

1314) *J. compressus*. (Jacq. Stirp. vind. p. 60 et 235.) *J. bulbosus*.

24 Juin-Août.

[T. n° 544.

AR. Lieux humides, bords des eaux. Steinsel. K.

1315) *J. Tenageia*. (Ehrh. Beitr. 4. 148) . . . . . T. n° 543.

① Juin-Août.

R. Lieux humides, chemins inondés l'hiver. Mondorf. EF.

1316) *J. bufonius*. (L. Sp. 465) . . . . . T. n° 542.

① Juin-Septembre.

C. Lieux humides, bords des eaux, etc.

Var.  $\beta$ . ranarius. (Perrier et Songeon.)

C. avec le type.

Var.  $\gamma$ . fasciculatus. (Bertol. fl. ital. 4. p. 190.)

R. avec le type.

**500. Luzula.** (DC. Fl. Fr. III. 158.) Luzule. Marbel. [VI, 1.]

1317) *L. pilosa*. (Willd. Enum. 1. 393.) *L. vernalis*. (DC.)

① Avril-Mai.

[T. n° 547.

C. Bois, broussailles.

1318) *L. angustifolia*. (Wulf. in Jacq. coll. 3. p. 56.) *albida*. (DC.)

24 Juin-Juillet.

[T. n° 548.

AC. par place. Bois. Bellevue. BB. C. Ardennes.

1319) *L. silvatica*. (Gaud. helv. 2. 568.) *L. maxima*. (DC.)

24 Mai-Juin.

[T. n° 546.

AR. Bois montueux. Predigstuhl (Diekirch.) K. Sengels (Tuntingen.) Kz. Neudorf. BB. Howald, Lintgen. BL. etc.

1320) *L. campestris*. (DC. Fl. Fr. III. 161) . . . . . T. n° 549.

24 Mars-Mai.

C. Pâturages, prairies, bruyères, etc.

1321) *L. multiflora*. (Lej. Fl. Spa. 1. p. 169). . . . . T. n° 550.

24 Mars-Mai.

AC. Bois, taillis montueux.

Var.  $\beta$ . congesta. (Lej. Fl. Spa. 1. p. 163). . . . . T. n° 551.

Avec l'espèce.

## CXV. CYPERACEÆ

(Juss. Gen. 26.)

Tribu I. — Cariceæ. (Koch, *syn.* 861.)501. *Carex*. (*L. Gen.* 1146.) — *Carex*. — Segge. [XXI, 3.]Sect. I. — *Psyllophora*. (*Lois. fl. Gall. ed. 2. p.* 282.)1322) *C. pulicaris*. (*L. Sp.* 1380) . . . . . T. n° 1315.

‡ Mai-Juillet.

R. Pâturages, prairies marécageuses et tourbeuses, au-dessus de Kedange, Eisembourg vers le Grünenwald. T. AC. Ardennes.

Tribu II. — *Vignea*. (Koch, *syn.* 864.)1323) *C. disticha*. (*Huds. fl. Angl. ed. 1, 403.*) *C. intermedia*. (*Good.*)

‡ Mai-Juin.

[T. n° 1318.

C. Prairies et pelouses humides, fossés, bords des eaux.

1324) *C. vulpina*. (*L. Sp.* 1382) . . . . . T. n° 1319.

‡ Mai-Juin.

C. Lieux frais, fossés humides, prairies tourbeuses.

1325) *C. muricata*. (*L. Sp.* 1382) . . . . . T. n° 1321.

‡ Mai-Juin.

C. Buissons, bois, lieux herbeux. R. En Ardennes.

Var.  $\beta$ . *virens*. (*Schreb. spicil.* 64.) *C. loliacea*. . Löhr. 1387b.

Avec l'espèce.

1326) *C. divulsa*. (*Good. trans. of. linn. soc. II.* 160.) T. n° 1320.

‡ Mai-Juin.

R. Prairies, lieux herbeux, bois d'Echternach. L.

1327) *C. teretiuscula*. (*Good. l. c.* 163) . . . . . T. n° 1328.

‡ Mai-Juin.

R. par place. Prés marécageux, tourbeux. (Michel). Ansembourg. T Md.

1328) *C. paniculata*. (*L. Sp.* 1383) . . . . . T. n° 1325.

‡ Mai-Juin.

R. Prairies et mares tourbeuses.

1329) *C. paradoxa*. (*Willd. act. acad. berol.* 1794. p. 39. t. 1. f. 1.)

‡ Mai-Juin.

[T. n° 1324.

R. Marais tourbeux des Ardennes. T.

1330) *C. præcox*. (*Schreb. spicil.* 63.) *C. Schreberi*. (*Schrnk.*)

‡ Avril-Mai.

[T. n° 1327.

C. Chemins, lieux sablonneux, bois.

1331) *C. brizoides*. (*L. Sp.* 1381). . . . . Löhr. 1393.

‡ Mai-Juin.

R. par place. Prairies humides de la Haute-Sûre. L. Echternach (Brim. père).  
1332) *C. remota*. (*L. Sp.* 1383). . . . . T. n° 1330.

‡ Mai-Juin.

AC. Bords des fossés, endroits humides, ombragés.

1333) *C. echinata*. (*Murr. Prodr.* p. 76.) *C. stellulata*. T. n° 1329.

‡ Mai-Juin.

C. Lieux marécageux, tourbeux, fossés.

1334) *C. leporina*. (*L. Sp.* 1384 *excl. syn. Fl. Lapp.*) *C. ovalis*.  
(*Good.*) . . . . . T. n° 1326.

‡ Mai-Juin.

C. Prairies, lieux herbeux, bois.

1335) *C. elongata*. (*L. Sp.* 1383) . . . . . T. n° 1331.

‡ Mai-Juin.

AC. par place. Fossés, lieux marécageux. Ellersmoor (Reisdorf).

1336) *C. canescens*. (*L. Sp.* 1383.) *C. curta*. (*Good.*) T. n° 1328.

‡ Mai-Juin.

C. Prés marécageux, marais.

Tribu III. — Legitimæ. (*Koch, syn.* 871.)

1337) *C. stricta*. (*Good. trans. of. linn. soc.* V. 2. 196. t. 21.)

‡ Mai-Juin. [T. n° 1333.

AR. Bords des eaux vaseuses, marais, fossés tourbeux.

1338) *C. cœspitosa*. (*L. fl. succ.* p. 333) . . . . . T. n° 1332.

‡ Avril.

AR. Prés marécageux entre Marienthal et Ansembourg.

1339) *C. Goodenoughii*. (*Gay, ann. sc. nat. sér.* 2. 11. 191.)

‡ Avril-Juin. [C. vulgaris.

C. Fossés, prairies humides, bruyères, pâturages, bois.

1340) *C. acuta*. (*L. Sp.* 1388. *Var. β.*) *C. gracilis*. (*Curt.*)

‡ Avril-Mai. [T. n° 1334.

C. Pelouses et prairies humides, fossés, bords des eaux.

*Var. β. nigra*. (*L. Sp.* 1388. *Var. α.*) . . . . . T. n° 1334.

AR. Avec l'espèce. Leesbech.

1344) *C. pilulifera*. (*L. Sp.* 1385) . . . . . T. n° 1344.

‡ Avril-Mai.

C. Manque dans certains cantons. Bois, bruyères, prairies fraîches des terres sablonneuses.

1342) *C. tomentosa*. (*L. Mant.* 123) . . . . . T. n° 1337.



‡ Mai-Juin.

AR. Prés frais, bois feuillus montueux, coteaux gypseux. Mompach, Lellig, Wasserbillig (Hse).

1343) *C. montana*. (*L. fl. succ. ed. 2. 328.*) *C. collina*. (*Willd.*)

‡ Avril-Mai. [T. n° 1338.

C. Bois montueux, herbeux.

1344) *C. verna*. (*Vill. fl. Dauph. 2. p. 204*) . . . T. n° 1336.

‡ Mars-Mai.

C. Pâturages, pelouses, prairies, bois.

1345) *C. humilis*. (*Leyss. fl. Hall. 175.*) *C. clandestina*. (*Good.*)

‡ Avril-Mai. [T. n° 1342.

R. Coteaux arides, broussailles, rochers. Wurthsberg au-dessus de la Hierze-krepp. (Clausen.) Kz. Pulfermühl. T BB.

1346) *C. digitata*. (*L. Sp. 1384*) . . . T. n° 1340.

‡ Avril-Mai.

C. par place. Rochers, coteaux arides, bois montueux. Kopstal, Dudelange. BL!

1347) *C. ornithopoda*. (*Willd. Sp. 4. 255.*)

‡ Avril-Mai.

AR. Clairières des bois calcareux. Galgenberg (Dudelange.) BL!

1348) *C. panicea*. (*L. Sp. 1387*) . . . T. n° 1350.

‡ Mai-Juin.

C. Prairies, pâturages, bois humides.

1349) *C. flacca*. (*Schreb. spic. 968.*) *C. glauca*. (*Scop.*) T. n° 1353.

‡ Avril-Mai.

C. Prés humides.

1350) *C. pendula*. (*Huds. fl. Angl. 411.*) *C. maxima*. (*Scop.*)

‡ Mai-Juin. [T. n° 1344.

R. Bois montueux, humides. Helmdange. T. Dillingen (Hse).

1351) *C. pallescens*. (*L. Sp. 1386*) . . . T. n° 1349.

‡ Mai-Juin.

C. Bois et prairies humides.

1352) *C. flava*. (*L. Sp. 1384*) . . . T. n° 1339.

‡ Mai-Juin.

C. Prairies humides, marécageuses et tourbeuses.

1353) *C. Oederi*. (*Ehrh. calam. n° 79*) . . . T. n° 1335.

‡ Mai-Juin.

C. Fossés, prés humides, endroits marécageux.

1354) *C. distans*. (*L. Sp. 1387*) . . . T. n° 1346.

‡ Mai-Juin.

AC. par place. Manque sur de grands espaces. Pelouses et prairies humides.

- 1355) *C. Hornschuchiana*. (*Hoppe, in Regensb. Bot. Ztg. p. 599.*)  
 4 Mai-Juin.  
 R. Prairies humides de la vallée de la Syr (Nussbaum).
- 1356) *C. fulva*. (*Good. in trans. Lin. Soc. II. 177. t. 20. f. 6.*)  
 4 Mai-Juin. [T. n° 1345.  
 R. Prairies humides, pâturages marécageux, etc. Rambrouch. T.
- 1357) *C. binervis*. (*Smith. trans. of Linn. Soc. V. 5. 268.*)  
 4 Mai-Juin. [T. n° 1347.  
 R. Bruyères, pâturages, près humides de l'Ardenne.
- 1358) *C. lævigata*. (*Smith. l. c. 272.*) *C. bilingularis*. (*DC.*)  
 4 Mai-Juin. [T. n° 1348.  
 R. Bois montueux, frais ou humides de l'Ardenne.
- 1359) *C. silvatica*. (*Huds. Fl. Ang. ed. 1. 353.*) . . . T. n° 1351.  
 4 Mai-Juin.  
 C. Bois, taillis frais, lieux ombragés.
- 1360) *C. Pseudo-Cyperus*. (*L. Sp. 1387*) . . . T. n° 1353.  
 4 Mai-Juin.  
 AR. Fossés, bords des eaux, lieux marécageux. Cap, au-dessous du Höhenhof. T.
- 1361) *C. rostrata*. (*With. Arr. brit. 2. 1059.*) *C. ampullacea*.  
 (*Good.*) . . . . . T. n° 1357.  
 4 Mai-Juin.  
 AC. Bords des eaux, fossés, lieux marécageux.
- 1362) *C. vesicaria*. (*L. Sp. 1388 pro parte*) . . . T. n° 1358.  
 4 Mai-Juin.  
 AC. Fossés, bords des eaux, lieux paludéens.
- 1363) *C. acutiformis*. (*Ehrh. calam. 30.*) *C. paludosa*. (*Good.*)  
 4 Mai. [T. n° 1354.  
 C. Lieux humides, marécages, bords des rivières.
- 1364) *C. riparia*. (*Curt. Fl. Lond. fasc. 4. 60*) . . . T. n° 1355.  
 4 Mai-Juin.  
 C. Fossés, bords des eaux.
- 1365) *C. hirta*. (*L. Sp. 1389*) . . . . . T. n° 1358.  
 4 Avril-Juin.  
 C. Lieux frais, bords des eaux dans les terres légères.

Tribu IV. — Scirpæ. (*Koch, syn. 851.*)

**502. Rhynchospora.** (*Vahl. Enum. II. 229.*) — Rhynchospore.  
 — Schnabelsame. [III, 1.]

1366) *R. alba*. (*Vahl. l. c.* 236) . . . . . T. n° 55.  
 4 Juillet-Août.

R. Marais tourbeux, Eltersmoor (entre Beaufort et Reisdorf.) K.!

**503. Heleocharis.** (*R. Br. Prod. Nov. Holl.* 224.) — Héléocharis.  
 — Teichbinse. [III, 1.]

1367) *H. palustris*. (*R. Br. l. c.* 224) . . . . . T. n° 67.  
 4 Mai-Juillet.

C. Lieux humides, bords des eaux et des étangs.

1368) *H. acicularis*. (*R. Br. l. c.* 224) . . . . . T. n° 69.  
 4 Juin-Septembre.

C. par place. Bords des eaux, lieux inondés l'hiver.

**504. Scirpus.** (*L. Gen.* 67 *ex parte.*) — Scirpe. — Simse. [III, 1.]

1369) *S. pauciflorus*. (*Lightf. fl. Scot.* 1078.) *S. Bæothryon.*  
 (*Ehrh.*) *S. campestris*. (*Roth.*) Lesch. . . . . T. n° 60, 61.  
 4 Juin-Juillet.

AC. par place. Prairies marécageuses et tourbeuses entre Weiler et Putscheid. K.

1370) *S. cæspitosus*. (*L. Sp.* 71) . . . . . T. n° 59.  
 4 Juin-Juillet.

AR. Marais, tourbières, bruyères humides.

1371) *S. setaceus*. (*L. Sp.* 73.) *Isolepis setacea*. (*R. B.*) T. n° 58.  
 ① Juin-Août.

C. Terrains humides, bords des eaux.

1372) *S. lacustris*. (*L. Sp.* 72) . . . . . T. n° 63.  
 4 Juin-Juillet.

C. Fossés, mares, étangs. Our près de Bivels.

Var.  $\beta$ . *medius*. (*Schrad.*) . . . . . T. n° 63b.

R. Avec l'espèce.

Var.  $\gamma$ . *glaucus*. (*Sm. Eng. bot.* 4. 232.)

R. Prairies tourbeuses, marécages.

1373) *S. Polichii*. (*God. et Gren. Fl. Fr. III.* 374.) *S. triquet.*  
 (*Auct. non L.*) . . . . . Wtg. Fl. R. 4296.

4 Juillet-Août.

AC. Terrains vaseux des fossés et des étangs. Haute-Moselle. Wgt.

1374) *S. maritimus*. (*L. Sp.* 74) . . . . . T. n° 65.  
 4 Juin-Septembre.

AC. par place. Bords des eaux, surtout de la Moselle. BB.

1375) *S. silvaticus*. (*L. Sp.* 75) . . . . . T. n° 60.  
 4 Juin-Juillet.

C. Fossés, bords des eaux, prairies ombragées, lisières des bois humides.

1376) *S. compressus*. (*Pers. syst. I. 66.*) *Schoenus compressus*. (*L.*)  
 2 Juin-Juillet. [T. n° 53.

C. Prairies et pâturages humides, lieux marécageux.

**505. Eriophorum.** (*L. Gen. 68.*) Linaigrette. Wollgras. [III, 1.]

1377) *E. vaginatum*. (*L. Sp. 76*) . . . . . T. n° 70.

2 Avril-Mai.

AC. Tourbières, bois marécageux de l'Ardenne. R. Ailleurs. Echternach (Brimmeyr père).

1378) *E. polystachyum*. (*L. Succ. 17. pro parte.*) *E. angustifolium*. (*Roth.*) . . . . . T. n° 71.

2 Avril-Mai.

AC. Bruyères humides, prairies marécageuses, tourbeuses de l'Ardenne. R. Ailleurs. Près Grewehesbour entre Simmern et les forges St-Michel. Kz.

1379) *E. latifolium*. (*Hopp. Taschb. 108*) . . . . . L. 1375.

2 Avril-Mai.

AC. Manque sur de grands espaces. Prairies marécageuses, bruyères humides, tourbières.

1380) ? *E. gracile*. (*Koch, ap. Roth. Cat. bot. II. 259.*) T. n° 72.

2 Mai-Juin.

R. Prairies tourbeuses, marécageuses.

Tribu V. — *Cypereæ*. (*Koch, syn. 248.*)

**506. Cyperus.** (*L. Gen. 66.*) — Souchet. — Cypergrass. [III, 1.]

1381) *C. flavescens*. (*L. Sp. 68*) . . . . . T. n° 74.

① Juillet-Août.

R. Lieux humides, bords des eaux, environs d'Echternach. (Löhr).

1382) *C. fuscus*. (*L. Sp. 69*) . . . . . T. n° 75.

① Juillet-Septembre.

AR. Lieux marécageux, sablonneux, humides, bords des eaux. Kopstal. T. de la Moselle, entre Schengen et Wintrange. T.

## CXVI. GRAMINEAE.

(*Juss. Gen. 28.*)<sup>1)</sup>

Tribu I. — *Phalarideæ*. (*Kunth, en. 1, 18.*)

Sous-tribu I. — *Olyreæ*. (*Coss. et Germ. Fl. Par. 772*)

**507. Zea.** (*L. Gen. 1042.*) — Maïs. — Mais. [XXX, 3.]

1) A l'exception de *Zea Mays* (XXX, 3), *Anthoxanthum odoratum* (II, 2), *Nardus stricta* (III, 1), toutes les graminées font partie de la III. cl. 2. de Linné.

1383) † *Z. Mays*. (*L. Sp.* 1378.) Tièrkesche Wees.

① Juin-Septembre.

Quelquefois cultivé dans les jardins.

**Sous-tribu II. — Oryzæ.** (*Kunth, Enum.* 1. p. 5.)

**508. Oryza.** (*A. Braun. Verh. Bot. Verein. Brandenb.* 1862. 195. 205.) — Riz. — Reis.

1384) *O. clandestina*. (*A. Braun. l. c.*) *Leersia orysoïdes*. (*Schwarz.*)

‡ Août-Octobre.

R. Bords vaseux des fossés, des rivières et des étangs. Moselle. L. et C.

**Sous-tribu III. — Euphalaridæ.** (*Coss. et Germ. l. c.* 772.)

**509. Anthoxanthum.** (*L. Gen.* 42.) — Flouve. — Ruchgras.

1385) *A. odoratum*. (*L. Sp.* 40) . . . . . T. n° 195.

‡ Mai-Juin.

C. Bois, pâturages, pelouses, prairies.

Var.  $\beta$ . *villosum*. (*Dmtr. Ag. Belg.*) . . . . . T. n° 196.

Avec l'espèce.

**510. Hierochloa.** (*Gmel. fl. sibir.* 1. p. 100.) — Hierochloa. — Mariengras.

1386) *H. odorata*. (*Wahlenberg, sys.* 32.) *H. borealis*. T. n° 180.

‡ Mai-Juin.

R. Prairies marécageuses, tourbières. Rambrouch. T.

**511. Phalaris.** (*L. Gen.* 74.) — Alpiste. — Glanzgras.

1387) † *P. canariensis*. (*L. Sp.* 79.) *Fulesämchen*. EF. 294.

① Juin-Septembre.

AC. Cultivé et quelquefois subspontané.

**512. Baldingera.** (*Gartn. Fl. Wett.* 1. 95.) Baldingère. Phalaris.

1388) *B. arundinacea*. (*Dmtr. Agros. Belg.* 1. 12. f. 135.)

① Juin-Juillet.

[T. n° 197.

C. Bords des eaux, lieux marécageux.

**Tribu II. — Paniceæ.** (*Kunth, en.* 1. 40.)

**Sous-tribu IV. — Eupanicæ.** (*Coss. et Germ. l. c.* 773.)

**513. Oplismenus.** (*P. Beauv. Agros.* 53. 11. f. 3.) — Oplismène. — Hirse.

1389) *O. Crus-galli.* (Kunth, Enum. pl. 1. 143). . . T. n° 214.

① ou ② Juin-Septembre.

C. Lieux sablonneux, frais, champs, décombres, bords des chemins.

**514. Digitaria.** (Scop. Carn. 1. 42.) — Digitale. — Fingerhirse.

1390) *D. sanguinalis.* (Scop. l. c. 1. 52) . . . T. n° 212bis.

① Juin-Août.

AC. Lieux cultivés ou incultes, vignes, bords des chemins. T.

1391) *D. filiformis.* (Koch, Gram. 26.) *D. glabra.* (Ræm.) T. n° 213.

① Juillet-October.

C. Champs sablonneux, arides.

**515. Setaria.** (P. Beauv. Agros. 51. t. 13. f. 3.) Sétaire. Fennich.

1392) *S. verticillata.* (P. Beauv. l. c.) . . . T. n° 217.

① Juillet-Septembre.

R. Lieux cultivés, jardins, décombres. Jardin Mansfeld (Clausen.) Kz.

Var. *β. verticilliformis.* (Dmtr.) . . . Dmtr. P. f. B. 2007.

Avec l'espèce.

1393) *S. viridis.* (P. Beauv. l. c. 51) . . . T. n° 218.

① Juin-Septembre.

C. Lieux cultivés, bords des chemins, jardins, champs arides, etc.

Var. *β. rubicunda.* (Dmtr. Agros. p. 139) . . . T. n° 219.

Avec l'espèce.

1394) *S. glauca.* (P. Beauv. l. c. 51) . . . T. n° 220.

① Juillet-Août.

AC. Champs sablonneux, moissons maigres, terres en friche.

1395) † *S. italica.* (P. Beauv. l. c. 51.) Hieschem. T. n° 216.

① Juillet-Septembre.

AR. Cultivé dans les jardins.

† Var. *β. germanica.* (P. Beauv. l. c. 51) . . . T. n° 215.

AC. Cultivé dans les jardins.

**516. Panicum.** (L. Gen. 76.) — Panic. — Hirse.

1396) † *P. miliaceum.* (L. Sp. 86.) Fullesämchen. EF. 295.

① Juillet-Septembre.

AC. Cultivé dans les jardins et quelquefois subspontané au voisinage des habitations.

Tribu III. — Poææ. (Coss. et Germ. l. c. 773.)

Sous-tribu V. — Alopecurææ. (Coss. et Germ. l. c. 774.)

**517. Alopecurus.** (L. Gen. 78.) — Vulpin. — Fuchsschwanz.

1397) *A. agrestis*. (*L. Sp.* 89) . . . . . T. n° 203.

① Avril-Août.

C. Lieux cultivés, champs, vignes. Manqué à l'Ardenne.

1398) *A. pratensis*. (*L. Sp.* 88) . . . . . T. n° 204.

‡ Avril-Juin.

C. Endroits herbeux, pâturages, prairies, bords des eaux.

Var. *β. aquaticus*. (*Dmtr. Agros.* 133) . . . . . T. n° 205.

AC. Prés humides.

Var. *γ. pallidus*. (*Dmtr. Agros.* 133) . . . . . T. n° 206.

R. Prés humides. Kaarwies au-dessus des forges de Dommeldange. T.

1399) *A. utriculatus*. (*Pers. syn. pl.* 1. 80) . . . . . T. n° 202.

① Mai-Juin.

R. Prairies fertiles entre Grevenmacher et Wasserbillig (Dmtr. et Michel.) R. entre Mompach et Wasserbillig (H-e), de la haute-Moselle. Gke.

1400) *A. fulvus*. (*Sm. Engl. bot. t.* 1467) . . . . . T. n° 209.

① Juin-Août.

AC. Mares, fossés, lieux humides. Koekelscheuer, Fehnerholz (Hesperange.) BL.!

1401) *A. geniculatus*. (*L. Sp.* 89) . . . . . T. n° 208.

① Juin-Août.

AC. Mares, fossés, lieux humides.

**518. Phleum.** (*L. Gen.* 77.) — Philéole. — Lieschgras.

1402) *P. pratense*. (*L. Sp.* 87.) Thimoty . . . . . T. n° 200.

‡ Juin-Juillet.

C. Prés, pâturages, coteaux arides, bords des chemins, bois.

Var. *β. nodosum*. (*L. Sp.* 88). . . . . T. n° 201.

AC. Lieux herbeux, secs.

Var. *γ. stoloniferum*. (*Hort.*)

C. avec l'espèce.

1403) *P. Bœhméri*. (*Wibel. primit. flor. werth. p.* 125.) T. n° 199.

‡ Juin-Juillet.

AC. Coteaux arides, rochers, broussailles des terres calcaires de la Moselle. Hohfels (Machtum). EF. Kz. Föls (Mertert). BL.!

**Sous-tribu VI. — Agrostideæ.** (*Kunth, en* 198.)

**519. Agrostis.** (*L. Gen.* 80.) — Agrostide. — Straussgras.

1404) *A. vulgaris*. (*Withering, Arrang.* 132) . . . . . T. n° 189.

‡ Juin-Juillet.

C. Prairies, pâturages, lieux herbeux, bois, etc.

Var. *β. stolonifera*. (*L. Sp.* 93. *α.*) . . . . . T. n° 190.

Avec l'espèce.

Var.  $\gamma$ . *pumila*. (*L. Mant.* 31) . . . . . T. n° 190c.  
Avec l'espèce.

1405) *A. alba*. (*L. Sp.* 93.) Fioringräs. . . . . T. n° 191.  
‡ Juin-Juillet.

C. Prairies, lieux herbeux, fossés, champs en friche, vignes, bois, etc.

Var.  $\beta$ . *diffusa*. (*Host. Gram. Aust.* 4. *tabl.* 53) . . . T. n° 192.  
C. avec l'espèce.

Var.  $\gamma$ . *gigantea*. (*Meyer. Chlor. Hanov.* 655.)  
C. avec l'espèce.

Var.  $\delta$ . *prorepens*. (*Koch, Taschenb.* p. 363.)  
C. avec l'espèce.

1406) *A. canina*. (*L. Sp.* 92) . . . . . T. n° 193.  
‡ Juin-Juillet.

C. Bois, prés, bruyères des terrains sablonneux, humides.

Var.  $\beta$ . *mutica*. [*A. varians*.] (*Thuill. Fl. Par.* 35.) T. n° 193c.  
AR. avec l'espèce.

**520. *Apera*.** (*Adans. Fam. pl.* II. 49.) — *Apère*. — Windhalon.

1407) *A. spica-venti*. (*P. Beauv. Agrost.* 31.) Perdsgräs.

① Juin-Juillet. [T. n° 187.

C. Lieux cultivés, jachères, moissons. R. Ardennes.

1408) *A. interrupta*. (*P. Beauv. l. c.* 31) . . . . . T. n° 188.

① Mai-Juillet.

R. Champs sablonneux. Simmern. Kopstal. T.

**521. *Calamagrostis*.** (*Adans. Fam. pl.* II. 31.) — *Calamagrostide*. — Schilf.

1409) *C. lanceolata*. (*Roth. Tent. fl. Germ.* I. 34.) T. n° 186.

‡ Juillet-Août.

AR. Marais tourbeux, bois marécageux, prés paludéens, fossés.

1410) *C. epigeios*. (*Roth. Tent. fl. Germ.* I. 34.) T. n° 184.

‡ Juillet-Août.

AC. Terrains sablonneux, fossés et lisières des bois humides.

1411) *C. arundinacea*. (*Roth. Tent.* II. 89.) *silvatica*. T. n° 183.

‡ Juillet-Août.

AC par place. Bois montueux.

Var.  $\beta$ . *contracta*. (*Dmtr. P. F. B.* 126). . . . . T. n° 183bis.

R. avec l'espèce.

1412) *C. varia*. (*Schrad. Germ.* I. 216.) *C. subulata*. (*Dmtr.*)

‡ Juillet-Août. [T. n° 185.

R. Bois montueux des Ardennes.



**Sous-tribu VII. — Stipacæ.** (*Coss. et Germ. l. c. 775.*)**522. Milium.** (*L. Gen. 79 ex parte.*) — Millet. — Flattergras.1413) *M. effusum.* (*L. Sp. 90*) . . . . . T. n° 210.

‡ Mai-Juillet.

C. par place. Bois montueux, lieux ombragés. R. Ardenues.

**523. Stipa.** (*L. Gen. 90.*) — Stipe. — Pfriemengras.1414) † *S. pennata.* (*L. Sp. 115.*)

‡ Mai-Juin.

C. Cultivé et souvent spontané. Sternchen (Clausen) !

**Sous-tribu VIII. — Pappophoræ.** (*Kunth, enum. 1. 175.*)**524. Sesleria.** (*Scop. Carn. 1. 189.*) — Soslérie.1415) *S. cœrulea.* (*Ard. Sp. II. 18*) . . . . . T. n° 141.

‡ Avril-Mai.

C. par place. Manque sur de très-grands espaces. Coteaux secs, rochers sablonneux ou calcaireux. Clausen, Palvermühl. T. Pétrusse. BL. ! Sichenhof. Kz. Echternach (Brimmeyr père).

**Sous-tribu IX. — Aveneæ.** (*Coss. et Germ. l. c. 775.*)**525. Weingartneria.** (*Bernh. erf. 51.*) [1800.] — Coryneplore.

[1812.] — Silbergras.

1416) *W. canescens.* (*L. Sp. 97.*) *Aira canescens.* (*L.*) T. n° 161.

‡ Juillet-Août.

C. Champs sablonneux, pâturages secs, clairières des bois, etc.

**526. Aira.** (*L. Gen. 81 ex parte.*) — Canche. — Schmiele.1417) *A. caryophyllea.* (*L. Sp. 97.*) . . . . . T. n° 165.

② ou ① Mai-Juin.

C. Bruyères, clairières des bois sablonneux, coteaux incultes, rochers, etc.

Var.  $\beta$ . *multiculmis.* (*Dmitr. Agros. 121. 3*) . . . . . T. n° 164.

Avec l'espèce.

1418) *A. præcox.* (*L. Sp. 97.*) *Festuca præcox.* (*L.*) T. n° 166.

① Avril-Juin.

AR. Terrains sablonneux, bords des chemins, bruyères, pelouses, rochers, clairières des bois. Kopstal, Fischbach. T.

**527. Deschampsia.** (*P. Beauv. Agros. 91.*) — Deschampsie.1419) *D. cæspitosa.* (*P. Beauv. 91.*) *Aira cæspitosa.* (*L.*) T. n° 159.

‡ Juin-Juillet.

C. Prairies, pelouses, lieux et bois humides.

- Var. *β. parviflora.* (*Thuill. fl. Par.* 38) . . . . . T. n° 160.  
 AR. Prairies humides avec le type
- 1420) *D. flexuosa.* (*Nees. Gen. fl. Germ. monog. I.*) T. n° 163.  
 4 Juin-Juillet.
- C. Bois, taillis, rochers, etc.
- 1421) *D. discolor.* (*Ram. et Schult. syst. veg. II.* 686.) T. n° 162.  
 4 Juillet-Septembre.
- R. Fossés, terrains humides, marécageux. Kopstal, Mersch, Beaufort. T.
- 528. Avena.** (*L. Gen.* 91 *ex parte.*) — Avoine. — Hafer.
- 1422) ? *A. brevis.* (*Roth. tent. fl. germ.* 1. 40.) Dmtr. P. 2072.  
 ① Juillet-Août.
- R. Moissons des Ardennes. Md. Michel.
- 1423) † *A. sativa.* (*L. Sp.* 118.) Huõver . . . . . T. n° 171.  
 ① Juin-Août.
- C. Cultivé et souvent spontané.
- 1424) † *A. orientalis.* (*Schreb. spicil.* 52.) Strausshuõver.  
 ① Juillet-Août. [T. n° 170.]
- AC. Cultivé et spontané au voisinage des habitations.
- 1425) *A. strigosa.* (*Schreb. spicil.* 52) . . . . . T. n° 175.  
 ① Juillet-Août.
- C. Spontané parmi les moissons des n°s 1423, 24. Autrefois C. en Ardennes.
- 1426) † *A. nuda.* (*L. Sp.* 118) . . . . . T. n° 172.  
 ① Juillet-Août.
- R. Cultivé.
- 1427) *A. fatua.* (*L. Sp.* 118.) Welhuõver. . . . . T. n° 173.  
 ① Juin-Juillet.
- C. Moissons, surtout de la Moselle.
- 1428) ? *A. barbata.* (*Brot. lus.* 108.) *A. hirsuta.* (*Roth.*) T. n° 174.  
 ① Juin-Juillet.
- R. Moissons.
- 1429) *A. pubescens.* (*L. Sp.* 1665) . . . . . T. n° 168.  
 4 Mai-Juin.
- C. Prés secs, pâturages, coteaux arides, clairières des bois sablonneux.
- 1430) *A. pratensis.* (*L. Sp.* 119) . . . . . T. n° 169.  
 4 Juin-Juillet.
- AR. Coteaux incultes, pâturages secs, rochers, clairières des bois siliceux entre Wecker et Mertert. R.
- 1431) *A. flavescens.* (*L. Sp.* 118.) Langhalm. Trisetum.  
 4 Juin-Juillet. [T. n° 167.]
- C. Pâturages, pelouses, prairies, etc.

**529. Arrhenatherum.** (*P. Beauv. Agrost. 55. t. 11. f. 3.*) — Arrhéuanthère. — Wiesenhafer.

1432) *A. elatius.* (*Mert. et Koch. Deutsch. Fl. I. 546.*) *Avena elatior.* (*L.*) . . . . . T. n° 176.

‡ Juin-Juillet.

C. Prairies, pâturages, lieux herbeux, lisières des bois. R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *bulbosum.* (*Schrad. Germ. 1. 248*) . . . T. n° 175.

AG. avec le type.

**530. Holcus.** (*L. Gen. 1146.*) — Houque. — Honiggras

1433) *H. lanatus.* (*L. Sp. 1485*) . . . . . T. n° 179.

‡ Juin-Août.

C. Prairies, pelouses, pâturages, bois, etc.

1434) *H. mollis.* (*L. Sp. 1485*) . . . . . T. n° 178.

‡ Juin-Août.

C. Pâturages, pelouses, lisières et clairières des bois.

1435) † *S. saccharatus.* (*L. Sp. 1485*) Sorgho. Zuckerhirse.

① Août-Octobre.

Cultivé en 1837 et abandonné depuis.

**531. Sieglingia.** (*Bernh. erf. 44. 1800.*) — Sieglingie.

1436) *S. decumbens.* (*Bernh. l. c.*) *Danthonia decumbens.* (*DC.*)

‡ Juin-Juillet. [T. n° 125.

C. Pâturages, prairies, bois frais.

**532. Kœleria.** (*Pers. Syn. p. 1. 1. 97.*) — Kœlérie.

1437) *K. cristata.* (*Pers. Syn. pl. 1. 97*) . . . . . T. n° 142.

‡ Juin-Juillet.

C. Bois, rochers, coteaux, pelouses.

Var.  $\beta$ . *glauca.* (*DC. Hort. Mousp. 406*) . . . Dmtr. P. 2108.

R. Prés secs avec le type. Vallée de la Sûre (Löhr) !

**Sous-tribu X. — Festuceæ.** (*Coss. et Germ. l. c. 777.*)

**533. Phragmites.** (*Trin. Fund. Agrost. 154.*) Phragmite. Rohr.

1438) *P. communis.* (*Trin. l. c.*) Lesch . . . . . T. n° 181.

‡ Juillet-Septembre.

C. par place. Fossés, bords des eaux, près marécageux. R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *nigricans.* (*Mérot. Fl. Par. ed. II. 33*) . . . T. n° 182.

R. avec l'espèce. Étang de Pleitrangle. BL. !

**534. Gyncrium.** (*Humb. et Bompl.*) — Gynévri. — Pampasgras.

1439) † *G. argenteum*. (*Nees. in Mart. Fl. brass. II. 462.*)

‡ Juillet-Septembre.

AC. Cultivé depuis 1855

**535. *Cynosurus*.** (*L. Gen. 87.*) — Cynosure. — Kammgras.

1440) *C. cristatus*. (*L. Sp. 105*). . . . . T. n° 140.

‡ Juin-Août.

C. Prairies, pâturages, pelouses.

**536. *Melica*.** (*L. Gen. 82.*) — Mélique. — Perlgras.

1441) *M. ciliata*. (*L. Sp. 97*). . . . . T. n° 127.

‡ Mai-Juillet.

C. Rochers, coteaux arides de la Sûre, Echternach, de la Moselle, Stromberg (Schengen.) BB.! Hohfels.! (Wormeldange)

1442) *M. uniflora*. (*Retz. Obs. 1. 10*) . . . . . T. n° 129.

‡ Mai-Juin.

C. Bois montueux. R. Ardennes.

1443) *M. nutans*. (*L. Sp. 98*). . . . . T. n° 128.

‡ Mai-Juin.

AC. Bois montueux de la Moselle, de la Sûre et des Ardennes. R. Ailleurs.

**537. *Molinia*.** (*Schrank. baier. fl. 1. 334.*) Molinie. Pfeiffengras.

1444) *M. cœrulea*. (*Mönch. meth. 183.*) *Enodium cœruleum*.

‡ Juillet-Septembre.

[T. n° 126.

AC. Bois, bruyères, pâturages humides, prairies tourbeuses. C. Sur terre dite de bruyère.

**538. *Catabrosa*.** (*P. Beauv. Agrost. 97.*) Catabrose. Quellgras.

1445) *C. aquatica*. (*Beauv. Agrost. 97*). . . . . T. n° 124.

‡ Juin-Août.

AC. Mares, fossés aquatiques, bords des eaux.

**539. *Glyceria*.** (*R. Br. Prod. Nov. Holl. 179.*) Glycérie. Schwaden.

1446) *G. fluitans*. (*R. Br. l. c.*) . . . . . T. n° 122.

‡ Juin-Août.

C. Fossés, mares, bords des ruisseaux et des rivières, étangs, etc.

1447) *G. plicata*. (*Fries. Nov. Mant. 3. p. 176.*) Wrtg. F. R. 1481.

‡ Mai-Juillet.

R. Fossés, mares, ruisseaux de la vallée de la Moselle. Wrtg.

1448) *G. aquatica*. (*Whlbg. Fl. Gothol. 18.*) *Poa aquatica*. (*L.*)

‡ Juin-Septembre.

[T. n° 130.

AC. par place. Bords des eaux, lieux marécageux Moselle. R. Ardennes.

1449) *G. distans*. (*Whlb. fl. Upsal. p. 36.*) *G. maritima*. T. n° 123.  
 2 Mai-Juin.

R. Eaux saumâtres. Born. Md. Source sous la Fels (Schengen). Steininger.

**540. Briza.** (*L. Gen. 84.*) — Brize. — Zittergras.

1450) *B. media*. (*L. Sp. 103.*) Fulegrîeschen. Wibbel-de-Wappel.  
 Fli-fla-flîeschen . . . . . T. n° 139.

2 Mai-Juillet.

C. Pâturages, prairies, bois.

1451) † *B. maxima*. (*L. Sp. 103.*)

① Mai-Juin.

AC. Cultivé comme plante d'ornement.

**541. Sclerochloa.** (*P. Beauv. Agrost. 98.*) *Sclerochloé*. Hartgras.

1452) *S. dura*. (*P. B. l. c.*) . . . . . Löhr. 1500.

② Mai-Juin.

AR. Terrains compactes en friche, bords des chemins, de tout le littoral de la Moselle.

**542. Poa.** (*L. Gen. 83 ex parte.*) — Paturin. — Rispengras.

1453) *P. annua*. (*L. Sp. 99*) . . . . . T. n° 132.

① ou ② Fl. presque toute l'année.

C. Cours, rues peu fréquentées, bords des chemins, lieux cultivés, endroits herbeux, etc.

1454) *P. bulbosa*. (*L. Sp. 102*) . . . . . T. n° 131.

2 Mai-Juin.

R. Bords des chemins, coteaux arides, pelouses. Mompach (Bochkolz). Crispinufels. EF.!

Var.  $\beta$ . vivipara. (*L. Sp. 102. \beta*.)

R. avec le type. Mompach. B. C. Glacis au-dessus de la Crispinufels. EF.!

1455) *P. nemoralis*. (*L. Sp. 102*) . . . . . T. n° 136.

2 Juin-Août.

C. Taillis, bois, buissons, haies.

1456) *P. serotina*. (*Ehrh. Beitr. VI. 83.*) *P. fertilis*. (*Host.*)

2 Juin-Août.

[T. n° 135.

R. Bords des eaux, alluvions, lieux herbeux, frais. Moselle. L.

1457) *P. Chaixii*. (*Vill. fl. Dauph. 2. 128.*) *P. sudetica*. T. n° 136.

2 Juin-Juillet.

AC. Bois montueux de l'Ardenne, ruines d'Esch s/S. Rambrouch. T. Wiltz. T. R. Ailleurs.

1458) *P. trivialis*. (*L. Sp. 99*) . . . . . T. n° 133.

2 Juin-Juillet.

C. Lieux cultivés, pelouses, prairies, bords des eaux.

1459) *P. pratensis*. (*L. Sp.* 99) . . . . . T. n° 134.  
 ④ Mai-Juillet.

C. Prairies, pâturages, pelouses.

Var. *β. angustifolia*. (*L. Sp.* 99) . . . . . T. n° 134a.

Avec le type.

Var. *γ. Lejeunii*. (*Dmtr. Agros.* 112) . . . . . T. n° 134b.

Avec le type.

Var. *δ. strigosa*. (*Koeler. Gr. Dmtr. l. c.*) . . . . . T. n° 134c.

Avec le type lieux sablonneux.

Var. *ε. anceps*. (*Dmtr. l. c.*) . . . . . T. n° 134d.

Avec le type.

1460) *P. compressa*. (*L. Sp.* 101) . . . . . T. n° 137.

④ Juin-Août.

C. Prairies, pâturages, lieux secs, vieux murs, etc.

Var. *β. Langeana*. (*Rehb. Ic.* 11. f. 1647.)

Avec le type.

**543. Dactylis.** (*L. Gen.* 86.) — Dactyle. — Knaulgras.

1461) *D. glomerata*. (*L. Sp.* 105) . . . . . T. n° 143.

④ Juin-Juillet.

C. Prairies, lieux herbeux, bords des chemins, fossés, bois.

Var. *β. hispanica*. (*Roth. catal. bot.* 4. 8) . . . . . T. n° 144.

Avec le type.

**544. Bromus.** (*L. Gen.* 89.) Brome. Trespe. Fulegreeschen.

Sect. I. — Euhromus. (*Gren. et God. Fl. fr.* III. 582.)

1462) *B. sterilis*. (*L. Sp.* 113) . . . . . T. n° 141.

① ou ② Mai-Juillet.

C. Bords des chemins, vieux murs, lieux incultes, champs en friche.

1463) *B. tectorum*. (*L. Sp.* 114) . . . . . T. n° 142.

① Mai-Août.

C. par place. Vieux murs, toits, bords des chemins, coteaux incultes, etc.

Sect. II. — Festucoides. (*Coss. et Germ. l. c.* 830.)

1464) *B. asper*. (*Murr. Prod. Gatt.* 42) . . . . . T. n° 148.

④ Juin-Juillet.

AC. par place. Bois montueux. R. Ardennes.

1465) *B. erectus*. (*Huds. Fl. Angl. ed.* 2. 49) . . . . . T. n° 149.

④ Mai-Juin.

AC. Prairies, pâturages, pelouses montueuses, bords des chemins, clairières des bois sur les marnes irisées.

1466) *B. inermis*. (*Leysser. fl. halens. ed. 1. p. 16.*) T. n° 150.  
 2<sup>e</sup> Juin-Juillet.

R. par place. Prairies, coteaux secs, bords des champs, bois des vallées de la Sûre et de la Moselle.

Sect. III. — *Serrafalcus*. (*Parlatore, pl. rar. sic. fasc. 2. 14.*)

1467) *B. arvensis*. (*L. Sp. 113*) . . . . . T. n° 154.  
 ① Juin-Juillet.

R. Bords des chemins, lieux incultes, prairies artificielles, moissons. Kleeberg, entre Remerschén et Schengen. BB.!

1468) ? *B. patulus*. (*Mert. et Koch. Deutsch. Fl. 1. 685.*)

① Juin-Juillet. [T. n° 155.]

R. Bords des chemins, lieux incultes, humides. Reckingen. T. Ardennes. L. et C.

1469) *B. mollis*. (*L. Sp. 112*). . . . . T. n° 151.

② ou ① Mai-Juin.

C. Prairies, pâturages, lieux incultes, chemins.

1470) *B. racemosus*. (*L. Sp. 114*) . . . . . T. n° 152.

② Mai-Juin.

AC. par place. Manqué sur de très-grands espaces. Prairies naturelles et artificielles, pâturages.

1471) *B. commutatus*. (*Schrad. fl. Germ. 1. p. 253.*)

② Mai-Juin.

C. Prairies, lieux incultes, bords des chemins. R. Ardennes.

1472) *B. secalinus*. (*L. Sp. 112*). . . . . T. n° 156.

① ou ② Juin-Juillet.

C. Champs cultivés et en friche.

Var.  $\beta$ . *elongatus*. (*Gaud. agr. 1. 305*) . . . . . T. n° 153.

C. Prairies.

Var.  $\gamma$ . *hordeaceus*. (*Gmel. fl. Bad. IV. 68. t. 1.*)

AR. Champs d'orge.

1473) *B. grossus*. (*DC. Fl. F. 1. 680*) . . . . . T. n° 158.

① ou ② Juin-Juillet.

AC. Moissons.

Var.  $\beta$ . *velutinus*. (*Schrad. 1. 349. t. 6. f. 3.*)

Avec l'espèce.

Var.  $\gamma$ . *nitidus*. (*Dmtr. Agros. p. 119.*)

R. Prés des Ardennes. Dmtr. Mersch. T.

1474) *B. arduennensis*. (*Lej. Comp. 1. 99. 253.*)

② Juin-Juillet.

R. par place. Moissons de l'Ardenne. Schimpach. EF. Kz. Moissons, champs d'épeautre.

1475) † **B. Schraderi.** (*Kunth, Enum. 1. 416.*)

① Juin-Juillet.

R. Cultivé depuis 1865 comme fourrage.

**545. Festuca.** (*L. Gen. 88 emend.*) — Fétuque. — Schwingel.

Sect. I. — *Nardurus.* (*Comp. fl. Germ. ed. 2. p. 193.*)

1476) **F. rigida.** (*Kunth, Enum. pl. 1. 392.*)

① Mai-Juin.

R. Coteaux secs, lieux incultes, rochers, bords des chemins, des terrains calcaires.

Sect. II. — *Vulpia.* (*Gmel. l. c.*)

1477) **F. bromoides.** (*L. Sp. 110.*) . . . . . T. n° 406, 407.

① Mai-Juillet.

R. Bords des chemins, champs secs. Everlange, Rambrouch. T.

1478) **F. sciuroides.** (*Roth, Ten. fl. Germ. II. 130.*) T. n° 408.

① Mai-Juillet.

AR. par place. Terrains sablonneux, coteaux secs, lieux incultes, bords des chemins entre Berdorf et Beaufort à la descente du Müllerthal. T. R. Ardennes.

1479) **F. Pseudo-Myuros.** (*Soy. Willm. in God. fl. Lorr. éd. 1.*

3. 177) . . . . . T. n° 409.

① Mai-Juillet.

AC. par place. Lieux incultes, coteaux secs, bords des chemins, pelouses. Kempchen (Courtois). C. Everlange. R. Ardennes.

Sect. III. — *Eufestuca.* (*Coss. et Germ. l. c. 776.*)

1480) **F. rubra.** (*L. Sp. 109.*) . . . . . T. n° 116.

‡ Juin-Juillet.

C. Lieux cultivés, bords des chemins, prairies, bois. R. Ardennes. Schimpach. EF. Kz.

1481) **F. heterophylla.** (*Lmk. Fl. Fr. III. 600.*) . . . T. n° 115.

‡ Juin-Juillet.

C. Bois montueux, lieux herbeux, ombragés de l'Ardenne. AR. Ailleurs.

1482) **F. duriuscula.** (*L. Sp. 108.*) . . . . . T. n° 114.

‡ Mai-Juillet.

C. Pâturages, pelouses, sables arides, lisières et clairières des bois.

1483) **F. ovina.** (*L. Sp. 108.*) . . . . . T. n° 110.

‡ Mai-Juillet.

C. Clairières et lisières des bois, prairies, pâturages, pelouses.

Var.  $\beta$ . *glauca.* (*Schrad. Fl. Germ. 322.*) . . . . . T. n° 113.

AC. avec le type. Prés secs.



Var.  $\gamma$ . *valesciaca*. (*Sleich. in D. fl. 1. 631*) . . . T. n° 112.

R. Avec le type. Lieux sablonneux. Kopstal, Schanz (Klingelscheuer.) T.!

Var.  $\delta$ . *capillata*. (*Lmk. Fl. F. III. 597*) . . . . . T. n° 111.

C. Avec le type. Clairières et lisières des bois.

1484) *F. elatior*. (*L. Fl. succ. ed. 2. 32. non Sp. sec. Sm.*) *Schenodorus pratensis* . . . . . T. n° 119.

‡ Juin-Juillet.

C. Prairies, lieux herbeux, bords des eaux.

Var.  $\beta$ . *radicans*. (*Dmtr. P. Fl. B. 2161*) . . . . . T. n° 120.

AC. avec l'espèce. Prairies.

1485) *F. loliacea*. (*Huds. fl. Angl. ed. 1. 38.*) *Schenodorus loliaceus* . . . . . T. n° 121.

‡ Mai-Juillet.

AC. par place. Prairies.

1486) *F. arundinacea*. (*Schreb. spicil. 57.*) *Schenodorus arundinaceus* . . . . . T. n° 118.

‡ Juin-Juillet.

C. Lieux herbeux, bords des eaux, prairies humides, fossés aquatiques.

1487) *F. silvatica*. (*Vill. fl. Dauph. 2. 103.*) *Schenodorus silvaticus*.

‡ Juin-Juillet. [T. n° 117.

AC. par place. Bois montueux entre Beeh et Consdorf (Ilse).

1488) *F. gigantea*. (*Vill. fl. Dauph. II. 110.*) Brous. g. T. n° 147.

‡ Juin-Juillet.

C. Bois montueux, buissons ombragés.

**546. *Brachypodium*.** (*P. Beauv. Agros. 100. t. 19. ex parte.*)—  
Brachypode. — Zwenke.

1489) *B. silvaticum*. (*Rœm. et Schult. syst. veg. II. 741.*) T. n° 92.

‡ Juillet-Août.

C. Bois, taillis, buissons. R. Ardennes.

1490) *B. pinnatum*. (*P. Beauv. Agros. 101*) . . . . . T. n° 94.

‡ Juin-Août.

AC. Lieux herbeux, pâturages, coteaux pierreux, lisières et clairières des bois.  
R. Ardennes.

Var.  $\beta$ . *rupestre*. (*R. et S. syst. 2. 737.*) *gracile*. T. n° 93, 95.

AR. Bois avec le type.

**Sous-tribu XI. — *Triticeæ*.** (*God. et Gren. fl. fr. III. 598.*)

**547. *Lolium*.** (*L. Gen. 95.*) — Ivraie. — Lolch.

1491) *L. perenne*. (*L. Sp. 122.*) Rêgras . . . . . T. n° 84.

4 Juin-Septembre.

C. Prairies, lieux herbeux, bords des champs.

Var.  $\beta$ . *tenue*. (*L. Sp.* 122) . . . . . T. n° 85.

C. Avec le type.

1492) † *L. italicum*. (*A. Braun, in Flora XVII.* 229.) EF. 307.

4 Juin-Octobre.

C. Cultivé, subspontané. Lieux herbeux, prairies, etc.

1493) *L. multiflorum*. (*Lmk. fl. Fr. II.* 621) . . . T. n° 90.

① Juin-Juillet.

AR. Pâturages, lieux herbeux, moissons.

1494) *L. temulentum*. (*L. Sp.* 122.) Dronkekaar. T. n° 88.

① Juin-Juillet.

AC. suivant l'année. Moissons.

Var.  $\beta$ . *arvense*. (*With. arrang.* 168.)

R. Avec le type : Sûre près Diekirch (Courtois).

1495) *L. remotum*. (*Hoff. D. fl. ed. 2. 1. f.* 63.) *L. liniculum*.

① Juin-Août.

[EF. 308.

R. Linières, champs cultivés.

**548. Hordeum.** (*L. Gen.* 98 *ex parte.*) — Orge. — Gerste.

Sect. I. — *Campestris*.

1496) *H. murinum*. (*L. Sp.* 126.) Wel Grëscht . . . T. n° 76.

① ou ② Juin-Septembre.

C. Villages, pieds des murs, décombres, lieux incultes, bords des chemins. R. Ardennes.

1497) *H. secalinum*. (*Schreb. spicil.* 148.) *H. pratense*. (*Rth.*)

4 Juin-Juillet.

[T. n° 77, 78.

AR. Prairies, lieux herbeux.

Sect. II. — *Cerealia*.

1498) † *H. distichum*. (*L. Sp.* 125.) Grëscht . . . T. n° 80.

① Juin-Août.

C. Cultivé.

1499) † *H. zeocritnon*. (*L. Sp.* 125). . . . . T. n° 79.

① Juin-Août.

R. Cultivé.

1500) † *H. vulgare*. (*L. Sp.* 125.) Wantergrëscht. T. n° 82.

① ou ② Juin-Juillet.

AR. Cultivé.

1501) † *H. hexastichon.* (*L. Sp.* 125) . . . . . T. n° 81.

① Juin-Août.

AC. Cultivé par place.

**549. Elymus.** (*L. Gen.* 96.) — Elyme. — Haargras.

1502) *E. europæus.* (*L. Mant.* 35) . . . . . T. n° 83.

‡ Juin-Juillet.

R. Bois montueux, Grünewald derrière Dommeldange. K. AR. Ardennes.

**550. Secale.** (*L. Gen.* 97.) — Seigle. — Roggen.

1503) † *S. cereale.* (*L. Sp.* 124.) Kuōr . . . . . T. n° 91.

① ou ② Mai-Juin.

C. Cultivé et souvent spontané, notamment sur les toits en chaume.

**551. Triticum.** (*L. Gen.* 99.) — Froment. — Weizen.

Sect. I. — Cereale. (*Grieseb. Fl. Rum.* II. 427.)

1504) † *T. vulgare.* (*Vill. fl. Dauph.* II. 153.)

① Juillet-Août.

Var. *α. æstivum.* (*L. Sp.* 126.) Summerwees. . . . T. n° 103.

AR. Cultivé.

Var. *β. hybernum.* (*L. Sp.* 126.) Wees . . . . . T. n° 102.

C. Cultivé en plusieurs variétés.

1505) *T. durum.* (*Desf.*) Spreuze Wees.

① Juillet-Août.

AC. Cultivé suivant la région.

1506) *T. turgidum.* (*L. Sp.* 126.) Englesche Wees.

① ou ② Juin-Juillet.

AR. Cultivé en plusieurs variétés.

1507) † *T. Spelta.* (*L. Sp.* 127.)

② Juillet-Août.

R. Cultivé en Ardennes.

1508) † *T. monococcum.* (*L. Sp.* 127.) Spelz . . . T. n° 101.

① ou ② Juin-Juillet.

AC. Cultivé dans les marnes irisées et le gris bigarré.

Sect. II. — *Agropyrum.* (*Endl. Gen. pl.* 913b.)

1509) *T. repens.* (*L. Sp.* 128.) Dunggràs. Ongràs. T. n° 98.

‡ Juin-Septembre.

C. Lieux cultivés, champs en friche, bords des chemins.

1510) *T. caninum*. (*Schreb. spicil.* 51) . . . . . T. n° 97.

‡ Juin-Juillet.

C. Haies, buissons, lieux ombragés, lisières des bois.

**Sous-tribu XII. — Nardoideae.** (*N. ab E. gen.* 10. 15.)

**552. Nardus.** (*L. Gen.* 69.) — Nard. — Borstengras.

1511) *N. stricta*. (*L. Sp.* 722) . . . . . T. n° 221.

‡ Mai-Juin.

C. Prairies, pâturages, bruyères, tourbières de l'Ardenne. R. ailleurs. Eltersmoor (Beaufort). EF. Kz.



## CALENDRIER DES FLORAISONS.

## JANVIER.

<b>Helleborus</b> niger . . . n° 37	<b>Stellaria</b> media . . . 91	<b>Capsella</b> Bursa pastoris . . 250
--	------------------------------------	---

## FÉVRIER.

<b>Eranthis</b> hiemalis . . . 36	<b>Amygdalus</b> communis . . . 391	<b>Tussilago</b> Farfara . . . 985
<b>Helleborus</b> niger . . . 37	<b>Armeniaca</b> vulgaris . . . 392	<b>Daphne</b> Mezereum . . . 1102
foetidus . . . 39	<b>Veronica</b> hederifolia . . . 697	<b>Corylus</b> Avellana . . . 1139
<b>Stellaria</b> media . . . 91	<b>Bellis</b> perennis . . . 934	<b>Alnus</b> glutinosa . . . 1166
<b>Capsella</b> Bursa pastoris . . 250	<b>Senecio</b> vulgaris . . . 973	incana . . . 1167
<b>Persica</b> vulgaris . . . 390		<b>Galanthus</b> nivalis . . . 1238

## MARS.

<b>Aucumone</b> Pulsatilla . . . 6	<b>Arabis</b> arenosa . . . 197	<b>Prunus</b> institia . . . 395
hepatica . . . 10	<b>Cardamine</b> hirsuta . . . 201	domestica . . . 396
<b>Ficaria</b> ranunculoides . . 34	<b>Draba</b> verna . . . 237	<b>Potentilla</b> verna . . . 447
<b>Eranthis</b> hiemalis . . . 36	<b>Thlaspi</b> perfoliatum . . . 247	sterilis . . . 446
<b>Helleborus</b> niger . . . 37	<b>Capsella</b> Bursa pastoris . . 250	<b>Cydonia</b> japonica . . . 484
viridis . . . 38	<b>Neslia</b> paniculata . . . 258	<b>Cornus</b> mas . . . 574
foetidus . . . 39	<b>Viola</b> hirta . . . 263	<b>Viscum</b> album . . . 575
<b>Spergularia</b> rubra . . . 79	odorata . . . 264	<b>Ribes</b> Grossularia . . . 576
<b>Holosteum</b> umbellatum . . . 88	<b>Persica</b> vulgaris . . . 390	<b>Saxifraga</b> tridactylites . . . 580
<b>Stellaria</b> media . . . 91	<b>Amygdalus</b> communis . . . 391	<b>Cryosplenium</b> alternifolium . . . 584
<b>Malva</b> rotundifolia . . . 132	<b>Armeniaca</b> vulgaris . . . 392	<b>Primula</b> officinalis . . . 588
<b>Corydalis</b> solida . . . 181		elatior . . . 589

<b>Primula</b>		<b>Petasites</b>		<b>Populus</b>	
grandiflora . . .	590	officinalis . . .	986	pyramidalis $\beta$ . .	1162
<b>Vinea</b>		<b>Ulmus</b>		canadensis . . .	1163
minor . . .	610	campestris . . .	1096	balsamifera . . .	1164
major . . .	611	<b>Daphne</b>		<b>Alnus</b>	
<b>Convolvulus</b>		Mezereum . . .	1102	glutinosa . . .	1166
arvensis . . .	627	<b>Buxus</b>		incana . . .	1167
<b>Veronica</b>		sempervirens . .	1125	<b>Taxus</b>	
arvensis . . .	689	<b>Callitriche</b>		baccata . . .	1184
agrestis . . .	693	vernalis . . .	1127	<b>Sedilla</b>	
polita . . .	694	<b>Corylus</b>		bifolia . . .	1202
opaca . . .	695	Avellana . . .	1139	<b>Tamus</b>	
hederæfolia . .	697	<b>Salix</b>		communis . . .	1231
<b>Lathraea</b>		daphnoides . . .	1147	<b>Narcissus</b>	
squamaria . . .	744	purpurea . . .	1148	Pseudo-Narcissus	1235
<b>Lamium</b>		rubra . . .	1149	<b>Galanthus</b>	
purpureum . . .	777	viminalis . . .	1150	nivalis . . .	1238
<b>Adoxa</b>		Caprea . . .	1153	<b>Luzula</b>	
Moschatellina .	839	cinerea . . .	1154	campestris . . .	1320
<b>Bellis</b>		<b>Populus</b>		multiflora . . .	1321
perennis . . .	934	alba . . .	1159	<b>Carex</b>	
<b>Senecio</b>		canesceas . . .	1160	verna . . .	1344
vulgaris . . .	973	tremula . . .	1161	<b>Poa</b>	
<b>Tussilago</b>		nigra . . .	1162	annua . . .	1453
Farfara . . .	985				

## AVRIL.

<b>Anemone</b>		<b>Spergularia</b>		<b>Erodium</b>	
Pulsatilla . . .	6	rubra . . .	79	pimpinellefolium	128
nemorosa . . .	8	<b>Spergula</b>		<b>Malva</b>	
ranunculoides .	9	pentandra . . .	81	rotundifolia . . .	132
Hepatica . . .	10	<b>Holosteum</b>		<b>Acer</b>	
<b>Myosurus</b>		umbellatum . . .	88	platanoides . . .	146
minimus . . .	14	<b>Stellaria</b>		<b>Chelidonium</b>	
<b>Ranunculus</b>		media . . .	91	majus . . .	178
nemorosus . . .	28	<b>Cerastium</b>		<b>Corydalis</b>	
repens . . .	29	caespitosum . . .	96	solida . . .	181
parviflorus . .	32	pumilum . . .	97	lutea . . .	182
<b>Ficaria</b>		semi decandrum	98	<b>Barbarea</b>	
ranunculoides .	34	glomeratum . . .	101	vulgaris . . .	191
<b>Caltha</b>		apetalum $\beta$ . . .	101	praecox . . .	194
palustris . . .	35	<b>Mentha</b>		<b>Arabis</b>	
<b>Helleborus</b>		erecta . . .	103	arenosa . . .	197
niger . . .	37	<b>Oxalis</b>		<b>Cardamine</b>	
viridis . . .	38	acetosella . . .	110	amara . . .	199
<b>Eplimedium</b>		<b>Erodium</b>		pratensis . . .	200
alpinum . . .	51	cicutarium . . .	127	hirsuta . . .	201

<b>Cordamine</b>		<b>Amygdalus</b>		<b>Chrysosplenium</b>	
<i>silvatica</i> . . . . .	202	<i>communis</i> . . . . .	391	<i>alternifolium</i> . . . . .	584
<b>Sisymbrium</b>		<b>Prunus</b>		<i>oppositifolium</i> . . . . .	585
<i>Altiaria</i> . . . . .	209	<i>spinosa</i> . . . . .	393	<b>Primula</b>	
<i>Thalianum</i> . . . . .	210	<i>fruticans</i> . . . . .	394	<i>officinalis</i> . . . . .	588
<b>Diptotaxis</b>		<i>institia</i> . . . . .	395	<i>elatior</i> . . . . .	589
<i>tenuifolia</i> . . . . .	219	<i>domestica</i> . . . . .	396	<i>grandiflora</i> . . . . .	590
<b>Brassica</b>		<i>cerasifera</i> . . . . .	397	<i>auricula</i> . . . . .	591
<i>Napus</i> . . . . .	223	<b>Cerasus</b>		<b>Plantago</b>	
<i>Rapa</i> . . . . .	224	<i>avium</i> . . . . .	398	<i>lanceolata</i> . . . . .	601
<b>Sinapis</b>		<i>vulgaris</i> . . . . .	399	<b>Fraxinus</b>	
<i>arvensis</i> . . . . .	226	<b>Kerria</b>		<i>excelsior</i> . . . . .	605
<b>Lunaria</b>		<i>japonica</i> . . . . .	407	<i>Ornus</i> . . . . .	606
<i>biennis</i> . . . . .	232	<b>Spiraea</b>		<b>Jasminum</b>	
<b>Draba</b>		<i>prunifolia</i> . . . . .	406	<i>fruticans</i> . . . . .	609
<i>verna</i> . . . . .	237	<b>Fragaria</b>		<b>Vinea</b>	
<i>muralis</i> . . . . .	238	<i>vesca</i> . . . . .	439	<i>minor</i> . . . . .	610
<b>Teesdalia</b>		<b>Potentilla</b>		<i>major</i> . . . . .	611
<i>nudicaulis</i> . . . . .	244	<i>sterilis</i> . . . . .	446	<b>Menyanthes</b>	
<b>Thlaspi</b>		<i>verna</i> . . . . .	447	<i>trifoliata</i> . . . . .	614
<i>montanum</i> . . . . .	246	<b>Cratægus</b>		<b>Convolvulus</b>	
<i>perfoliatum</i> . . . . .	247	<i>Oxyacantha</i> . . . . .	478	<i>arvensis</i> . . . . .	627
<i>alpestre</i> . . . . .	248	<b>Cotoneaster</b>		<b>Pulmonaria</b>	
<b>Capsella</b>		<i>vulgaris</i> . . . . .	481	<i>officinalis</i> . . . . .	649
<i>Bursa pastoris</i> . . . . .	250	<b>Amelanchier</b>		<i>mollis</i> . . . . .	651
<b>Viola</b>		<i>vulgaris</i> . . . . .	482	<b>Omphalodes</b>	
<i>hirta</i> . . . . .	263	<b>Cydonia</b>		<i>verna</i> . . . . .	655
<i>odorata</i> . . . . .	264	<i>vulgaris</i> . . . . .	483	<b>Veronica</b>	
<i>canina</i> . . . . .	265	<i>japonica</i> . . . . .	484	<i>Chamædryis</i> . . . . .	681
<i>silvestris</i> . . . . .	267	<b>Peris</b>		<i>Teucrium</i> . . . . .	685
<i>Riviniiana</i> . . . . .	268	<i>communis</i> . . . . .	485	<i>serpyllifolia</i> . . . . .	686
<i>mirabilis</i> . . . . .	269	<b>Malus</b>		<i>acinifolia</i> . . . . .	688
<i>Altaica</i> . . . . .	271	<i>communis</i> . . . . .	487	<i>arvensis</i> . . . . .	689
<i>elatior</i> . . . . .	272	<i>baccata</i> . . . . .	488	<i>verna</i> . . . . .	690
<b>Sarothamnus</b>		<b>Cornus</b>		<i>triphyllus</i> . . . . .	691
<i>scoparius</i> . . . . .	277	<i>mas</i> . . . . .	574	<i>præcox</i> . . . . .	692
<b>Clex</b>		<b>Viscum</b>		<i>agrestis</i> . . . . .	693
<i>europæus</i> . . . . .	286	<i>album</i> . . . . .	575	<i>polita</i> . . . . .	694
<b>Cercis</b>		<b>Ribes</b>		<i>opaca</i> . . . . .	695
<i>siliquastrum</i> . . . . .	330	<i>Grossularia</i> . . . . .	576	<i>Buxbaumii</i> . . . . .	696
<b>Vicia</b>		<i>rubrum</i> . . . . .	577	<i>hederæfolia</i> . . . . .	697
<i>lathyroides</i> . . . . .	339	<i>alpinum</i> . . . . .	578	<b>Lunaria</b>	
<b>Orobus</b>		<i>nigrum</i> . . . . .	579	<i>Cymbalaria</i> . . . . .	717
<i>tuberosus</i> . . . . .	358	<b>Saxifraga</b>		<b>Lathræa</b>	
<i>vernus</i> . . . . .	360	<i>tridaetylites</i> . . . . .	580	<i>squamaria</i> . . . . .	744
<b>Montia</b>		<i>crespitosa</i> . . . . .	582	<b>Ocimum</b>	
<i>minor</i> . . . . .	372			<i>Basilicum</i> . . . . .	746

<b>Rosmarinus</b>		<b>Hippochaë</b>		<b>Betula</b>	
officinalis . . .	757	rhamnoides . . .	1105	alba . . .	1165
<b>Glechoma</b>		<b>Asarum</b>		<b>Platanus</b>	
hederacea . . .	774	europæum . . .	1108	orientalis . . .	1168
<b>Lamium</b>		<b>Euphorbia</b>		accrifolius . . .	1169
amplexicaule . . .	775	dulcis . . .	1116	occidentalis . . .	1170
incisum . . .	776	Cyparissias . . .	1121	<b>Pinus</b>	
purpureum . . .	777	<b>Mercurialis</b>		Pinaster . . .	1173
album . . .	778	perennis . . .	1124	<b>Larix</b>	
maculatum . . .	779	<b>Rhus</b>		decidea . . .	1175
<b>Galeobdolon</b>		sempervirens . . .	1125	<b>Juniperus</b>	
luteum . . .	780	<b>Callitriche</b>		communis . . .	1180 <sup>2</sup>
<b>Vaccinium</b>		vernalis . . .	1127	virginiana . . .	1182
Myrtillus . . .	815	hamulata . . .	1128	<b>Thuja</b>	
<b>Oxycoccus</b>		<b>Juglans</b>		occidentalis . . .	1183
palustris . . .	816	regia . . .	1130	<b>Taxus</b>	
<b>Adoxa</b>		nigra . . .	1131	baccata . . .	1184
Moschatellina . . .	839	<b>Fagus</b>		<b>Fritillaria</b>	
<b>Sambucus</b>		silvatica . . .	1132	imperialis . . .	1192
racemosa . . .	842	<b>Quercus</b>		<b>Ornithogalum</b>	
<b>Galium</b>		pedunculata . . .	1134	nutans . . .	1197
Cruciata . . .	854	<b>Carpinus</b>		<b>Gagea</b>	
<b>Valeriana</b>		Betulus . . .	1140	pratensis . . .	1198
dioica . . .	868	<b>Salix</b>		arvensis . . .	1199
<b>Valerianella</b>		fragilis . . .	1142	minima . . .	1200
olitoria . . .	869	alba . . .	1143	lutea . . .	1201
carinata . . .	870	babylonica . . .	1144	<b>Scilla</b>	
<b>Bellis</b>		amygdalina . . .	1145	bifolia . . .	1202
perennis . . .	934	hippochaëfolia . . .	1146	<b>Allium</b>	
<b>Cineraria</b>		daphnoides . . .	1147	ursinum . . .	1203
spatulæfolia . . .	972	purpurea . . .	1148	<b>Tamus</b>	
<b>Senecio</b>		rubra . . .	1149	communis . . .	1231
vulgaris . . .	973	viminalis . . .	1150	<b>Iris</b>	
<b>Tussilago</b>		Seringeana . . .	1151	germanica . . .	1232
Farfara . . .	985	incana . . .	1152	pumila . . .	1233
<b>Petasites</b>		Caprea . . .	1153	<b>Narcissus</b>	
officinalis . . .	986	cinerea . . .	1154	Pseudo-Narcissus . . .	1235
<b>Taraxacum</b>		aurita . . .	1155	poeticus . . .	1236
officinale . . .	1009	depressa . . .	1156	<b>Orehis</b>	
<b>Barkhausia</b>		repens . . .	1157	mascula . . .	1250
taraxacifolia . . .	1023	<b>Populus</b>		<b>Lemna</b>	
<b>Polygonum</b>		alba . . .	1159	trisulea . . .	1294
cuspidatum . . .	1078	canescens . . .	1160	minor . . .	1295
<b>Ulmus</b>		tremula . . .	1161	gibba . . .	1296
campestris . . .	1096	nigra . . .	1162	polyrrhiza . . .	1297
montana . . .	1096 <sup>2</sup>	canadensis . . .	1163	<b>Luzula</b>	
effusa . . .	1097	balsamifera . . .	1164	pilosa . . .	1317



<b>Luzula</b>		<b>Carex</b>		<b>Alopecurus</b>	
<i>campestris</i> . . .	1320	<i>humilis</i> . . .	1345	<i>agrestis</i> . . .	1398
<i>multiflora</i> . . .	1321	<i>digitata</i> . . .	1346	<i>pratensis</i> . . .	1399
<b>Carex</b>		<i>ornithopoda</i> . . .	1347	<b>Sesleria</b>	
<i>præcox</i> . . .	1330	<i>flacca</i> . . .	1349	<i>cærulea</i> . . .	1416
<i>cæspitosa</i> . . .	1338	<i>hirta</i> . . .	1365	<b>Aira</b>	
<i>Goodenoughii</i> . . .	1339	<b>Eriophorum</b>		<i>præcox</i> . . .	1419
<i>æuta</i> . . .	1340	<i>vaginatum</i> . . .	1377	<b>Poa</b>	
<i>pilulifera</i> . . .	1341	<i>polystachyum</i> . . .	1378	<i>annua</i> . . .	1553
<i>montana</i> . . .	1343	<i>latifolium</i> . . .	1379		

## MAL.

<b>Thalictrum</b>		<b>Actæa</b>		<b>Mehringia</b>	
<i>aqueligifolium</i> . . .	2bis.	<i>spicata</i> . . .	48	<i>trinervia</i> . . .	87
<b>Anemone</b>		<b>Pæonia</b>		<b>Holosteum</b>	
<i>Pulsatilla</i> . . .	6	<i>officinalis</i> . . .	19	<i>umbellatum</i> . . .	88
<i>silvestris</i> . . .	7	<b>Berberis</b>		<b>Arenaria</b>	
<i>nemorosa</i> . . .	9	<i>vulgaris</i> . . .	50	<i>serpyllifolia</i> . . .	89
<i>ranunculoides</i> . . .	10	<b>Epimedium</b>		<b>Stellaria</b>	
<b>Adonis</b>		<i>alpinum</i> . . .	51	<i>nemorum</i> . . .	90
<i>æstivalis</i> . . .	12	<b>Gianthus</b>		<i>media</i> . . .	91
<b>Myosurus</b>		<i>arceutus</i> . . .	57	<i>Holosteum</i> . . .	92
<i>minimus</i> . . .	14	<b>Silene</b>		<i>graminea</i> . . .	94
<b>Ranunculus</b>		<i>nulans</i> . . .	67	<b>Cerastium</b>	
<i>hederaceus</i> . . .	15	<b>Melandryum</b>		<i>cæspitosum</i> . . .	96
<i>aquatilis</i> . . .	16	<i>silvestre</i> . . .	71	<i>pumilum</i> . . .	97
<i>tripartitus</i> . . .	17	<b>Lychuis</b>		<i>semi decandrum</i> . . .	98
<i>trichophyllus</i> . . .	18	<i>chalcædonia</i> . . .	73	<i>tomentosum</i> . . .	99
<i>fluitans</i> . . .	19	<i>Flos-Cuculi</i> . . .	74	<i>brachypetalum</i> . . .	100
<i>sceleratus</i> . . .	21	<i>Viscaria</i> . . .	76	<i>glomeratum</i> . . .	101
<i>platanifolius</i> . . .	22	<b>Spergularia</b>		<i>apetalum</i> $\beta$ . . .	101
<i>auricomus</i> . . .	25	<i>rubra</i> . . .	79	<i>arvense</i> . . .	102
<i>acris</i> . . .	26	<b>Spergula</b>		<b>Menchia</b>	
<i>lanuginosus</i> . . .	27	<i>arvensis</i> . . .	80	<i>erecta</i> . . .	103
<i>nemorosus</i> . . .	28	<i>maxima</i> $\beta$ . . .	80	<b>Oxalis</b>	
<i>repens</i> . . .	29	<i>sativa</i> $\gamma$ . . .	80	<i>acetosella</i> . . .	110
<i>bulbosus</i> . . .	30	<i>pentandra</i> . . .	81	<b>Dictamnus</b>	
<i>sardous</i> . . .	31	<b>Sagina</b>		<i>albus</i> . . .	113
<i>parvulus</i> $\beta$ . . .	31	<i>procumbens</i> . . .	82	<b>Geranium</b>	
<i>parviflorus</i> . . .	32	<i>apetala</i> . . .	83	<i>phaeum</i> . . .	116
<i>arvensis</i> . . .	33	<i>saxatilis</i> $\beta$ . . .	83	<i>silvaticum</i> . . .	117
<i>inermis</i> $\beta$ . . .	33	<i>ciliata</i> . . .	84	<i>sanguineum</i> . . .	120
<b>Ficaria</b>		<i>depressa</i> $\beta$ . . .	84	<i>rotundifolium</i> . . .	125
<i>ranunculoides</i> . . .	34	<b>Alsine</b>		<i>Robertianum</i> . . .	126
<b>Caltha</b>		<i>tenuifolia</i> . . .	85	<b>Erodium</b>	
<i>palustris</i> . . .	35	<i>viscosa</i> . . .	86	<i>cicutarium</i> . . .	127

<b>Erodium</b>		<b>Arabis</b>		<b>Draba</b>	
pimpinellæfolia.	128	sagittata . .	196	verna . .	237
<b>Malva</b>		arenosa . .	197	muralis . .	238
rotundifolia . .	132	Turrilita . .	198	<b>Teesdalia</b>	
silvestris . .	131	<b>Cardamine</b>		nudicaulis . .	244
<b>Polygala</b>		amara . .	199	<b>Thlaspi</b>	
vulgaris . .	144	pratensis . .	200	arvense . .	245
oxyptera $\beta$ . .	144	hirsuta . .	201	montanum . .	246
comosa . .	142	silvatica . .	202	perfoliatum . .	247
calcarea . .	143	impatiens . .	203	alpestre . .	248
austriaca . .	144	<b>Nasturtium</b>		<b>Iberis</b>	
<b>Acer</b>		officinale . .	204	amara . .	249
campestre . .	145	silvestre . .	205	<b>Capsella</b>	
platanoides . .	146	amphibium . .	206	Bursa pastoris . .	250
pseudo-platanus	147	palustre . .	207	<b>Lepidum</b>	
<b>Aesculus</b>		<b>Turritis</b>		campestre . .	252
hippocastanum	148	glabra . .	208	ruderales . .	254
rubicunda . .	149	<b>Sisymbrium</b>		draba . .	255
<b>Staphylea</b>		Alliaria . .	209	<b>Senecio</b>	
pinnata . .	152	Thalianum . .	210	Coronopus . .	256
<b>Evonymus</b>		officinale . .	211	<b>Isatis</b>	
europæa . .	153	Sophia . .	211	tinctoria . .	257
<b>Papaver</b>		<b>Erysimum</b>		<b>Neslia</b>	
Rhœas . .	173	orientalis . .	217	paniculata . .	258
hybridum . .	174	<b>Hesperis</b>		<b>Caleptra</b>	
Argemone . .	175	matronalis . .	218	Corvini . .	259
dubium . .	176	<b>Diploaxis</b>		<b>Viola</b>	
<b>Cheilidonium</b>		tenuifolia . .	219	palustris . .	262
majus . .	178	muralis . .	220	hirta . .	263
<b>Corydalis</b>		<b>Erucastrum</b>		odorata . .	264
solida . .	181	obtusangulum . .	221	canina . .	265
lutea . .	182	<b>Brassica</b>		montana . .	266
<b>Fumaria</b>		oleracea . .	222	silvestris . .	267
officinalis . .	183	Napus . .	223	Rivimiana . .	268
tenuifolia . .	184	Rapa . .	224	mirabilis . .	269
Vaillantii . .	185	<b>Sinapis</b>		tricolor . .	270
parviflora . .	186	arvensis . .	226	Altaica . .	271
capreolata . .	187	alba . .	227	elatior . .	272
<b>Cheiranthus</b>		Cheiranthus . .	228	rothomagensis . .	273
cheiri . .	190	<b>Staphanus</b>		<b>Rhamnus</b>	
<b>Barbarea</b>		sativus . .	230	cathartica . .	275
vulgaris . .	191	<b>Lunaria</b>		frangula . .	276
arœuata . .	191	rediviva . .	231	<b>Sarothamnus</b>	
stricta . .	193	biennis . .	232	scoparius . .	277
præcox . .	194	<b>Alyssum</b>		<b>Cytisus</b>	
<b>Arabis</b>		calycinum . .	233	Laburnum . .	278
hirsuta . .	195	saxatile . .	236		

<b>Genista</b>		<b>Lathyrus</b>		<b>Fragaria</b>	
germanica . . . . .	279	Aphaca . . . . .	349	vesca . . . . .	439
sagittalis . . . . .	280	Nissolia . . . . .	350	moschata . . . . .	440
tinctoria . . . . .	281	<b>Orobus</b>		viridis . . . . .	441
pilosa . . . . .	282	tuberosus . . . . .	358	virginiana . . . . .	442
<b>Ulex</b>		niger . . . . .	359	grandiflora . . . . .	443
europæus . . . . .	286	vernus . . . . .	360	<b>Comarum</b>	
<b>Anthyllis</b>		<b>Coronilla</b>		palustre . . . . .	445
vulneraria . . . . .	289	Emerus . . . . .	361	<b>Potentilla</b>	
<b>Lotus</b>		varia . . . . .	362	sterilis . . . . .	446
corniculatus . . . . .	290	<b>Ornithopus</b>		verna . . . . .	447
<b>Robinia</b>		perpusillus. . . . .	363	Anserina . . . . .	450
pseudo-acacia . . . . .	293	<b>Hippocrepis</b>		rupestris . . . . .	451
umbraculifera $\beta$ . . . . .	293	comosa . . . . .	365	<b>Tormentilla</b>	
viscosa . . . . .	294	<b>Onobrychis</b>		silvestris . . . . .	456
<b>Colutea</b>		viciaefolia . . . . .	366	<b>Rosa</b>	
arborescens . . . . .	296	<b>Montia</b>		cinnamomea . . . . .	458
<b>Medicago</b>		minor . . . . .	372	pomifera . . . . .	461
lupulina . . . . .	304	rivularis . . . . .	373	lutea . . . . .	463
Willdenowii $\beta$ . . . . .	304	<b>Herniaria</b>		<b>Achemilla</b>	
minima . . . . .	308	glabra . . . . .	375	vulgaris . . . . .	472
maculata . . . . .	309	hirsuta . . . . .	376	arvensis . . . . .	473
denticulata . . . . .	311	<b>Scleranthus</b>		<b>Poterium</b>	
<b>Trifolium</b>		annuus . . . . .	377	dictyocarpum . . . . .	475
filiforme . . . . .	312	perennis . . . . .	378	<b>Mespilus</b>	
procumbens . . . . .	313	<b>Crassula</b>		germanica . . . . .	477
pratense . . . . .	316	rubens . . . . .	379	<b>Cratægus</b>	
sativum . . . . .	317	<b>Prunus</b>		Oxyacantha. . . . .	478
alpestre . . . . .	318	spinosa . . . . .	393	monogyna . . . . .	479
incarnatum . . . . .	321	fruticans . . . . .	394	Pyracantha . . . . .	480
striatum . . . . .	323	cerasifera . . . . .	397	<b>Cotoneaster</b>	
montanum. . . . .	324	<b>Cerasus</b>		vulgaris . . . . .	481
repens . . . . .	325	avium . . . . .	398	<b>Amelanchier</b>	
<b>Cercis</b>		vulgaris . . . . .	399	vulgaris . . . . .	482
siliquastrum . . . . .	330	Mahaleb . . . . .	400	<b>Cydonia</b>	
<b>Vicia</b>		Padus . . . . .	401	vulgaris . . . . .	483
pisiformis . . . . .	331	<b>Spiræa</b>		japonica . . . . .	484
sepium . . . . .	335	prunifolia . . . . .	406	<b>Pirus</b>	
lutea . . . . .	336	<b>Cærria</b>		communis . . . . .	485
sativa . . . . .	337	japonica . . . . .	407	<b>Malus</b>	
angustifolia . . . . .	338	<b>Rubus</b>		acerba . . . . .	486
lathyroides. . . . .	339	saxatilis . . . . .	432	communis . . . . .	487
<b>Ervum</b>		<b>Geum</b>		baccata . . . . .	488
hirsutum . . . . .	340	urbanum . . . . .	435	<b>Sorbus</b>	
<b>Pisum</b>		rivale . . . . .	436	domestica . . . . .	489
sativum . . . . .	347	rivali-urbanum . . . . .	437	aucuparia . . . . .	490
		urbano-rivale . . . . .	438	terminalis . . . . .	491

<b>Sorbus</b>		<b>Hlex</b>		<b>Veronica</b>	
Aria . . .	492	aquifolium. . .	603	Chamaedrys . . .	681
<b>Philadelphus</b>		<b>Fraxinus</b>		officinalis . . .	683
coronarius . . .	493	Ornus . . .	606	prostrata . . .	684
<b>Santienta</b>		<b>Syringa</b>		Teucrium . . .	685
europea . . .	513	vulgaris . . .	607	serpyllifolia. . .	686
<b>Astrantia</b>		persica . . .	608	peregrina . . .	687
major . . .	514	<b>Jasminum</b>		acinifolia . . .	688
<b>Carum</b>		fruticans . . .	609	arvensis . . .	689
Carvi . . .	521	<b>Vinea</b>		verna . . .	690
<b>Oenanthe</b>		minor . . .	610	triphyllus . . .	691
peucedanifolia. . .	533	major . . .	611	præcox . . .	692
<b>Mentum</b>		<b>Menyanthes</b>		agrestis . . .	693
althamanticum. . .	539	trifoliata . . .	614	polita . . .	694
<b>Caucalis</b>		<b>Convolvulus</b>		opaca . . .	695
daucoides . . .	558	arvensis . . .	627	Buxbaumii . . .	696
<b>Torilis</b>		<b>Symphytum</b>		hederacefolia. . .	697
nodosa . . .	562	officinalis . . .	636	<b>Scropularia</b>	
<b>Anthriscus</b>		<b>Myosotis</b>		vernalis . . .	703
Cerfolium . . .	563	palustris . . .	637	<b>Linaria</b>	
silvestris . . .	564	strigulosa . . .	638	Cymbellaria . . .	717
<b>Scandix</b>		caespitosa . . .	639	<b>Pedicularis</b>	
Pecten-Veneris . . .	569	silvatica . . .	640	palustris . . .	720
<b>Cornus</b>		intermedia. . .	641	<b>Rhinanthus</b>	
sanguinea . . .	573	hispida . . .	642	major . . .	722
<b>Ribes</b>		versicolor . . .	643	minor . . .	723
rubrum . . .	577	strieta . . .	644	Alectorolophus . . .	724
alpinum . . .	578	sparsiflora. . .	645	<b>Orobanche</b>	
nigrum . . .	579	<b>Lithospermum</b>		Rapum . . .	737
<b>Saxifraga</b>		officinale . . .	646	<b>Lathraea</b>	
tridactylites . . .	580	purpureo-cœruleum . . .	647	squamaria . . .	744
granulata . . .	581	arvense . . .	648	<b>Ocimum</b>	
caespitosa . . .	582	<b>Pulmonaria</b>		Basilicum . . .	746
sponhemica . . .	583	officinalis . . .	649	<b>Rosmarinus</b>	
<b>Chrysesplenium</b>		mollis . . .	651	officinalis . . .	757
alternifolium . . .	584	<b>Cynoglossum</b>		<b>Salvia</b>	
oppositifolium. . .	585	officinale . . .	654	pratensis . . .	758
<b>Prinula</b>		<b>Omphalodes</b>		<b>Clethoma</b>	
officinalis . . .	588	verna . . .	655	hederacea . . .	774
elatior. . .	589	<b>Asperugo</b>		<b>Laminium</b>	
grandiflora. . .	590	procumbens . . .	656	amplexicaule . . .	775
auricula . . .	591	<b>Hyoseyanus</b>		incisum . . .	776
<b>Arenaria</b>		niger . . .	668	purpureum. . .	777
elongata . . .	598	<b>Veronica</b>		album . . .	778
<b>Plantago</b>		scutellata . . .	678	maculatum. . .	779
media . . .	600	Anagallis . . .	679	<b>Galeobdolon</b>	
lanceolata. . .	601	Beccabunga . . .	680	luteum . . .	780

<b>Ajuga</b>		<b>Arthemisa</b>		<b>Euphorbia</b>	
reptans . . .	804	Dracunculus . . .	935	verrucosa . . .	1117
pyramidalis . . .	805	<b>Antennaria</b>		stricta . . .	1119
Chamaepitys . . .	807	dioica . . .	950	Cyparissias . . .	1121
<b>Vaccinium</b>		<b>Cnicus</b>		Esula . . .	1122
Myrtillus . . .	815	spatulifolia . . .	972	<b>Mercurialis</b>	
Vitis-idaea . . .	814	<b>Tragopogon</b>		perennis . . .	1124
<b>Oxycoccus</b>		orientalis . . .	1002	<b>Callitriche</b>	
palustris . . .	816	pratensis . . .	1003	vernalis . . .	1127
<b>Campanula</b>		<b>Scorzonera</b>		hamulata . . .	1128
patula . . .	826	hiemalis . . .	1004	<b>Juglans</b>	
<b>Specularia</b>		<b>Podospermum</b>		regia . . .	1130
speculum . . .	827	callitrapifolium . . .	1007	nigra . . .	1131
<b>Phyteuma</b>		<b>Taraxacum</b>		<b>Fagus</b>	
spicatum . . .	830	officinale . . .	1009	silvatica . . .	1132
<b>Cacumis</b>		paludosum . . .	1010	<b>Quercus</b>	
sativus . . .	835	<b>Barkhausia</b>		pedunculata . . .	1131
Melo . . .	836	taraxacifolia . . .	1023	sessiliflora . . .	1135
<b>Sambucus</b>		<b>Crepis</b>		rubra . . .	1136
racemosa . . .	842	praemorsa . . .	1024	tinctoria . . .	1137
<b>Viburnum</b>		pulebra . . .	1025	alba . . .	1138
Lantana . . .	843	tectorum . . .	1028	<b>Carpinus</b>	
Opulus . . .	844	<b>Hieracium</b>		Betulus . . .	1140
<b>Lonicera</b>		Pilosella . . .	1830	<b>Salix</b>	
Xylosteum . . .	845	<b>Rumex</b>		pentandra . . .	1141
Periclymenum . . .	846	scutatus . . .	1066	fragilis . . .	1142
caprifolium . . .	847	Acetosa . . .	1067	alba . . .	1143
<b>Scherardia</b>		Acetosella . . .	1068	babylonica . . .	1144
arvensis . . .	849	<b>Polygonum</b>		amygdalina . . .	1145
<b>Galium</b>		cuspidatum . . .	1078	hippohaëfolia . . .	1146
Mollugo . . .	857	<b>Morus</b>		incana . . .	1152
erectum . . .	858	alba . . .	1092	aurita . . .	1155
palustre . . .	861	nigra . . .	1093	repens . . .	1157
<b>Valeriana</b>		<b>Urtica</b>		rosmarinifolia . . .	1158
Phu . . .	867	urens . . .	1099	<b>Betula</b>	
dioica . . .	868	<b>Elaeagnus</b>		alba . . .	1165
<b>Valerianella</b>		angustifolius . . .	1104	<b>Platanus</b>	
olitoria . . .	869	<b>Hippohaë</b>		orientalis . . .	1168
carinata . . .	870	rharnoides . . .	1105	acerifolius . . .	1169
eriocarpa . . .	873	<b>Asarum</b>		occidentalis . . .	1170
<b>Matricaria</b>		europæum . . .	1108	<b>Pinus</b>	
Chamomilla . . .	927	<b>Aristolochia</b>		silvestris . . .	1171
<b>Pyrethrum</b>		Clematitis . . .	1109	austriaca . . .	1172
Leucanthemum . . .	929	Sipho . . .	1110	Pinaster . . .	1173
<b>Bellis</b>		<b>Euphorbia</b>		strobus . . .	1174
perennis . . .	934	amygdaloides . . .	1112	<b>Picea</b>	
		exigua . . .	1115	excelsa . . .	1176

<b>Picea</b>			<b>Aceras</b>		<b>Luzula</b>	
alba . . .	1177		anthropophora	1239	pilosa . . .	1317
<b>Abies</b>			<b>Eoroglossum</b>		silvatica . . .	1319
pectinata . . .	1178		hircinum . . .	1240	campestris . . .	1320
balsamea . . .	1179		<b>Anacamptis</b>		multiflora . . .	1321
<b>Juniperus</b>			pyramidalis . . .	1241	<b>Carex</b>	
communis . . .	1180		<b>Orechis</b>		pulicaris . . .	1322
Sabina . . .	1181		ustulata . . .	1242	disticha . . .	1323
<b>Tulipa</b>			tridentata . . .	1243	vulpina . . .	1324
silvestris . . .	1190		purpurea . . .	1244	muricata . . .	1325
Gesneriana . . .	1191		militaris . . .	1245	divulsa . . .	1326
<b>Fritellaria</b>			Simia . . .	1246	teretiuseula . . .	1327
imperialis . . .	1192		coriophora . . .	1247	paniculata . . .	1328
<b>Ornithogalum</b>			Morio . . .	1248	paradoxa . . .	1329
pyrenaicum . . .	1195		pallens . . .	1249	præcox . . .	1330
umbellatum . . .	1196		mascula . . .	1250	brizoides . . .	1331
nutans . . .	1197		latifolia . . .	1253	remota . . .	1332
<b>Gagea</b>			sambucina . . .	1254	echinata . . .	1333
pratensis . . .	1198		<b>Ophrys</b>		leporina . . .	1334
arvensis . . .	1199		muscifera . . .	1256	elongata . . .	1335
minima . . .	1200		aranifera . . .	1257	canescens . . .	1336
lutea . . .	1201		fuciflora . . .	1258	stricta . . .	1337
<b>Allium</b>			apifera . . .	1259	Goodenoughii . . .	1339
ursinum . . .	1203		<b>Gymnadenia</b>		acuta . . .	1340
moly . . .	1204		conopsea . . .	1261	pilulifera . . .	1341
<b>Muscari</b>			<b>Platanthera</b>		tomentosa . . .	1342
comosum . . .	1218		bifolia . . .	1265	montana . . .	1343
<b>Phalangium</b>			<b>Cephalanthera</b>		verna . . .	1344
Liliago . . .	1220		grandiflora . . .	1269	humilis . . .	1345
<b>Convallaria</b>			Xyphophyllum	1270	digitata . . .	1346
maialis . . .	1225		<b>Neottia</b>		ornithopoda . . .	1347
<b>Polygonatum</b>			Nidus-avis . . .	1274	panicca . . .	1348
verticillatum . . .	1226		<b>Listera</b>		flacca . . .	1349
multiflorum . . .	1227		ovata . . .	1275	pendula . . .	1350
officinale . . .	1228		<b>Cypripedium</b>		pallescens . . .	1351
<b>Maianthemum</b>			Calceolus . . .	1277	flava . . .	1352
bifolium . . .	1229		<b>Potamogeton</b>		Oederi . . .	1353
<b>Paris</b>			erispus . . .	1286	distans . . .	1354
quadrifolia . . .	1230		<b>Zanichellia</b>		Hornschuchiana	1355
<b>Iris</b>			palustris . . .	1292	fulva . . .	1356
germanica . . .	1232		<b>Lemna</b>		binervis . . .	1357
pumila . . .	1233		trisulea . . .	1294	levigata . . .	1358
<b>Narcissus</b>			minor . . .	1295	silvatica . . .	1359
poeticus . . .	1236		gibba . . .	1296	Pseudo-Cyperus	1360
<b>Leucoicum</b>			polyrrhiza . . .	1297	rostrata . . .	1361
vernum . . .	1237		<b>Arum</b>		vesicaria . . .	1362
			maculatum . . .	1298	acutiformis . . .	1363

<b>Carex</b>		<b>Stipa</b>		<b>Poa</b>	
riparia . . .	1364	pinnata . . .	1414	bulbosa . . .	1454
hirta . . .	1365	<b>Sesleria</b>		pratensis . . .	1459
<b>Helicoharis</b>		cœrulea . . .	1415	<b>Bromus</b>	
palustris . . .	1367	<b>Aira</b>		sterilis . . .	1462
<b>Eriophorum</b>		caryophyllea . . .	1417	erectus . . .	1465
vaginatum . . .	1377	præcox . . .	1418	racemosus . . .	1470
polystachium . . .	1378	<b>Arena</b>		commutatus . . .	1471
latifolium . . .	1379	pubescens . . .	1430	<b>Festuca</b>	
gracile . . .	1380	<b>Melica</b>		rigida . . .	1476
<b>Anthoxanthum</b>		ciliata . . .	1441	bromoides . . .	1477
odoratum . . .	1385	uniflora . . .	1442	sciuroides . . .	1478
<b>Hierochloa</b>		nutans . . .	1443	Pseudo-Myuros . . .	1479
odorata . . .	1386	<b>Glyceria</b>		duriuscula . . .	1482
<b>Alopecurus</b>		plicata . . .	1447	ovina . . .	1483
agrestis . . .	1397	<b>Briza</b>		loliacea . . .	1485
pratensis . . .	1398	media . . .	1450	<b>Secale</b>	
utriculatus . . .	1399	maxima . . .	1451	cereale . . .	1503
<b>Apera</b>		<b>Sclerochloa</b>		<b>Nardus</b>	
interrupta . . .	1408	dura . . .	1452	stricta . . .	1511
<b>Millium</b>		<b>Poa</b>			
effusum . . .	1413	annua . . .	1453		

## JUN.

<b>Clematis</b>		<b>Ranunculus</b>		<b>Berberis</b>	
Vitalba . . .	1	lanuginosus . . .	27	vulgaris . . .	50
recta . . .	2	nemorosus . . .	28	<b>Dianthus</b>	
<b>Talietrum</b>		repens . . .	29	prolifer . . .	53
aquilegifolium . . .	2	bulbosus . . .	30	diminutus $\beta$ . . .	53
minus . . .	3	parvulus $\beta$ . . .	30	Armeria . . .	54
saxatile $\beta$ . . .	3	sardous . . .	31	Carthusianorum . . .	55
<b>Adonis</b>		parviflorus . . .	32	arrectus . . .	57
autumnalis . . .	11	arvensis . . .	33	deltoides . . .	58
æstivalis . . .	12	inermis $\beta$ . . .	33	glaucus $\beta$ . . .	58
<b>Ranunculus</b>		<b>Nigella</b>		cæsius . . .	59
hederaceus . . .	15	arvensis . . .	40	<b>Saponaria</b>	
aquatilis . . .	16	damascena . . .	41	Vaccaria . . .	61
tripartitus . . .	17	sativa . . .	42	<b>Cucubalus</b>	
trichophyllus . . .	18	<b>Aquilegia</b>		baccifer . . .	63
fluitans . . .	19	vulgaris . . .	43	<b>Silene</b>	
divaricatus . . .	20	<b>Delphinium</b>		inflata . . .	64
secleratus . . .	21	Consolida . . .	44	conica . . .	65
platanifolius . . .	22	Ajacis . . .	45	conoidea . . .	66
<b>Flammula</b> . . .	23	<b>Aconitum</b>		nutans . . .	67
Lingua . . .	24	lycoctonum . . .	46	gallica . . .	68
acris . . .	26	Napellus . . .	47		

<b>Melandryum</b>		<b>Linum</b>		<b>Staphylea</b>	
silvestre . . .	71	catharticum . . .	106	pinnata . . .	152
<b>Lychnis</b>		tenuifolium . . .	107	<b>Evonymus</b>	
chalcedonica . . .	73	usitatissimum . . .	108	europaea . . .	153
Flos-Cuculi . . .	74	<b>Radiola</b>		<b>Monotropa</b>	
tomentosa . . .	75	linoides . . .	109	hypopitys . . .	154
Viscaria . . .	76	<b>Oxalis</b>		<b>Hypericum</b>	
Githago . . .	77	stricta . . .	111	perforatum . . .	155
<b>Spergularia</b>		<b>Dietamnus</b>		humifusum . . .	156
segetalis . . .	78	albus . . .	113	quadrangulum . . .	157
rubra . . .	79	<b>Impatiens</b>		tetrapterum . . .	158
<b>Spergula</b>		noli-tangere . . .	114	pulehrum . . .	159
arvensis . . .	80	<b>Geranium</b>		montanum . . .	160
maxima $\beta$ . . .	80	phæum . . .	116	hirsutum . . .	161
sativa $\gamma$ . . .	80	silvaticum . . .	117	<b>Drosera</b>	
<b>Sagina</b>		pratense . . .	118	rotundifolia . . .	162
procumbens . . .	82	sanguineum . . .	120	<b>Pyrola</b>	
apetala . . .	83	columbinum . . .	121	rotundifolia . . .	165
saxatilis $\beta$ . . .	83	dissectum . . .	122	minor . . .	166
ciliata . . .	84	molle . . .	123	<b>Reseda</b>	
depressa $\beta$ . . .	84	pusillum . . .	124	luteola . . .	167
<b>Alsine</b>		rotundifolium . . .	125	lutea . . .	168
tenuifolia . . .	85	Robertianum . . .	126	odorata . . .	169
viscosa . . .	86	<b>Erodium</b>		<b>Nuphar</b>	
<b>Mehringia</b>		Cicutarium . . .	127	luteum . . .	170
trinervia . . .	87	pimpinellæfolium . . .	128	<b>Nymphaea</b>	
<b>Arenaria</b>		<b>Malva</b>		alba . . .	171
serpyllifolia . . .	89	Alcea . . .	129	<b>Papaver</b>	
<b>Stellaria</b>		moschata . . .	130	somniferum . . .	172
memorum . . .	90	silvestris . . .	131	setigerum $\beta$ . . .	172
media . . .	91	rotundifolia . . .	132	Rhœas . . .	173
Holostea . . .	92	<b>Altea</b>		hybridum . . .	174
glauca . . .	93	officinalis . . .	134	Argemone . . .	175
graminea . . .	94	hirsuta . . .	135	dubium . . .	176
uliginosa . . .	95	<b>Hibiscus</b>		Lecoquii . . .	177
<b>Cerastium</b>		Trionum . . .	137	<b>Chelidonium</b>	
cæspitosum . . .	96	<b>Tilia</b>		majus . . .	178
tomentosum . . .	99	platyphyllos . . .	139	<b>Glaucium</b>	
brachypetalum . . .	100	<b>Polygala</b>		flavum . . .	179
glomeratum . . .	101	vulgaris . . .	141	<b>Corydalis</b>	
apetalum $\beta$ . . .	101	oxyptera $\beta$ . . .	141	lutea . . .	182
arvense . . .	102	comosa . . .	142	<b>Fumaria</b>	
<b>Malacothum</b>		calcarea . . .	143	officinalis . . .	183
aquaticum . . .	104	austriaca . . .	144	tenuifolia . . .	184
arenaria $\beta$ . . .	104	<b>Vitis</b>		Vaillantii . . .	185
<b>Elatine</b>		vinifera . . .	150	parviflora . . .	186
Alsinastrum . . .	105			capreolata . . .	187



<b>Cheiranthus</b>		<b>Brassica</b>		<b>Hellanthemum</b>	
cheiri . . .	190	nigra . . .	223	Chanæcistus . .	260
<b>Barbarea</b>		<b>Sinapis</b>		serpyllifolium $\gamma$	260
vulgaris . . .	191	arvensis . . .	226	polifolium . . .	261
arcuata . . .	192	alba . . .	227	<b>Viola</b>	
stricta . . .	193	Cheiranthus . .	228	palustris . . .	262
præcox . . .	194	<b>Raphanus</b>		canina . . .	265
<b>Arabis</b>		Raphanistrum .	229	montana . . .	266
hirsuta . . .	195	<b>Lunaria</b>		silvestris . . .	267
sagittata . . .	196	rediviva . . .	231	Altaica . . .	271
arenosa . . .	197	<b>Alyssum</b>		elatior . . .	272
Turrita . . .	198	calycinum . . .	233	rothomagensis .	273
<b>Cardamine</b>		campestre . . .	234	intermedia . . .	274
pratensis . . .	200	saxatile . . .	235	<b>Rhamnus</b>	
hirsuta . . .	201	<b>Berteroa</b>		cathartica . . .	275
silvatica . . .	202	incana . . .	236	frangula . . .	276
impatiens . . .	203	<b>Draba</b>		<b>Sarothamnus</b>	
<b>Nasturtium</b>		muralis . . .	238	scoparius . . .	277
officinale . . .	204	<b>Cochlearia</b>		<b>Genista</b>	
silvestre . . .	205	Armoracia . . .	239	germanica . . .	279
amphibium . . .	206	officinalis . . .	240	anglica . . .	279b
palustre . . .	207	<b>Camellia</b>		sagittalis . . .	280
<b>Turritis</b>		silvestris . . .	241	tinctoria . . .	281
glabra . . .	208	sativa . . .	242	pilosa . . .	282
<b>Sisymbrium</b>		dentata . . .	243	juncea . . .	283
Alliaria . . .	209	<b>Teesdalla</b>		<b>Lupinus</b>	
Thalianum . . .	210	nudicaulis . . .	244	angustifolius . .	285
officinale . . .	211	<b>Thlaspi</b>		<b>Ulex</b>	
Sophia . . .	212	arvense . . .	245	europæus . . .	286
<b>Braya</b>		<b>Iberis</b>		<b>Ononis</b>	
supina . . .	213	amara . . .	249	spinosa . . .	287
<b>Erysimum</b>		<b>Capsella</b>		repens . . .	288
cheiranthoides.	214	Bursa pastoris.	250	<b>Anthyllis</b>	
hieracifolium .	215	<b>Leplidium</b>		vulneraria . . .	289
virgatum . . .	216	sativum . . .	251	<b>Lotus</b>	
orientale . . .	217	campestre . . .	252	corniculatus . .	290
<b>Hesperis</b>		graminifolium.	253	uliginosus . . .	291
matronalis . . .	218	rudérale . . .	254	<b>Trigonella</b>	
<b>Diplotaxis</b>		Draba . . .	255	Fœnum-græcum	292
tenuifolia . . .	219	<b>Seneciera</b>		<b>Robinia</b>	
muralis . . .	220	Coronopus . . .	256	pseudo-acacia . .	293
<b>Erucastrum</b>		<b>Isatis</b>		umbraiculifera $\beta$	293
obtusangulum .	221	tinctoria . . .	257	viscosa . . .	294
<b>Brassica</b>		<b>Neslia</b>		<b>Colutea</b>	
oleracea . . .	222	paniculata . . .	258	arborescens . . .	296
Napus . . .	223	<b>Calepina</b>		<b>Astragalus</b>	
Rapa . . .	224	Corviui . . .	259	glycyphyllos . .	297

<b>Mellilotus</b>		<b>Vicia</b>		<b>Herniaria</b>	
arvensis . . .	298	angustifolia . . .	339	hirsuta . . .	376
macrorrhiza . . .	299	lathyroides . . .	340	<b>Scieranthus</b>	
leucantha . . .	300	<b>Ervum</b>		annuus . . .	377
alba . . .	301	hirsutum . . .	340	perennis . . .	378
parviflora . . .	302	tetraspermum . . .	341	<b>Crassula</b>	
caerulea . . .	303	gracile . . .	342	rubens . . .	379
<b>Medicago</b>		monanthos. . .	343	<b>Sedum</b>	
lupulina . . .	304	Ervilia . . .	344	acre . . .	380
Willdenowii $\beta$ . . .	304	Lens . . .	345	sexangulare. . .	381
falcata . . .	305	<b>Faba</b>		aureum . . .	384
sativa . . .	306	vulgaris . . .	346	treviricum . . .	385
falcato-sativa . . .	307	<b>Pisum</b>		album . . .	386
minima . . .	308	sativum . . .	347	<b>Cerasus</b>	
Echinus . . .	309	arvense . . .	348	Mahaleb . . .	400
maculata . . .	310	<b>Lathyrus</b>		<b>Spiraea</b>	
denticulata . . .	311	Aphaca . . .	349	Filipendula . . .	402
<b>Trifolium</b>		Nissolia . . .	350	Ulmaria . . .	403
filiforme . . .	312	sativus . . .	351	salicifolia . . .	404
procumbens . . .	313	hirsutus . . .	352	hypericifolia . . .	405
aureum . . .	314	tuberosus . . .	353	prunifolia . . .	406
agrarium . . .	315	pratensis . . .	354	<b>Kerria</b>	
majus $\alpha$ . . .	315	silvestris . . .	355	japonica . . .	407
minus $\beta$ . . .	315	<b>Orobus</b>		<b>Rubus</b>	
pratense . . .	316	tuberosus . . .	358	fruticosus . . .	408
sativum $\beta$ . . .	316	niger . . .	359	caesius . . .	431
medium . . .	317	<b>Coronilla</b>		saxatilis . . .	432
alpestre . . .	318	Emerus . . .	361	Idæus . . .	433
ochroleucum . . .	319	varia . . .	362	odoratus . . .	434
rubens . . .	320	<b>Ornithopus</b>		<b>Geum</b>	
incarnatum . . .	321	perpusillus . . .	363	urbanum . . .	435
striatum . . .	323	<b>Hippocrepis</b>		rivale . . .	436
montanum . . .	324	comosa . . .	365	rivali-urbanum. . .	437
repens . . .	325	<b>Onobrychis</b>		urbano-rivale . . .	438
hybridum . . .	326	viciaefolia . . .	366	<b>Fragaria</b>	
fragiferum. . .	327	<b>Peplis</b>		vesca . . .	439
<b>Phaseolus</b>		Portula . . .	369	moschata . . .	440
vulgaris . . .	328	<b>Portulaca</b>		viridis . . .	441
multiflorum . . .	329	oleracea . . .	370	virginiana . . .	442
<b>Vicia</b>		sativa . . .	371	grandiflora . . .	443
pisiformis . . .	331	<b>Montia</b>		chilensis . . .	444
Cracca . . .	332	minor . . .	372	<b>Comarum</b>	
tenuifolia . . .	333	rivularis . . .	373	palustre . . .	445
onobrychioides . . .	334	<b>Corrigiola</b>		<b>Potentilla</b>	
sepium . . .	336	litoralis . . .	374	alpestris . . .	449
lutea . . .	337	<b>Herniaria</b>		Anserina . . .	450
sativa . . .	338	glabra . . .	375	rupestris . . .	451

<b>Potentilla</b>		<b>Epilobium</b>		<b>Heracleum</b>	
supina . . . . .	452	hirsutum . . . . .	496	Spondylium. . . . .	552
argentea . . . . .	453	parviflorum . . . . .	497	<b>Tordylium</b>	
recta . . . . .	454	lanceolatum . . . . .	498	maximum . . . . .	553
<b>Tormentilla</b>		montanum . . . . .	499	<b>Laserpitium</b>	
procumbens . . . . .	455	nutans $\beta$ . . . . .	499	latifolium . . . . .	554
silvestris . . . . .	456	roseum . . . . .	500	<b>Daucus</b>	
<b>Rosa</b>		tetragonum . . . . .	501	Carota . . . . .	555
pimpinellifolia. . . . .	457	palustre . . . . .	503	<b>Oriaya</b>	
cinnamomea . . . . .	458	decumbens $\beta$ . . . . .	503	grandiflora . . . . .	556
gallica . . . . .	459	<b>Oenanthera</b>		<b>Turgenia</b>	
centifolia . . . . .	460	biennis . . . . .	504	latifolia . . . . .	557
pomifera . . . . .	461	<b>Clelea</b>		<b>Caucalis</b>	
tomentosa . . . . .	462	lutetiana . . . . .	506	daucoides . . . . .	558
lutea . . . . .	463	alpina . . . . .	507	Leptophylla. . . . .	559
rubiginosa. . . . .	464	<b>Myriophyllum</b>		<b>Torilis</b>	
mierantha . . . . .	465	verticillatum . . . . .	509	Anthriscus . . . . .	561
tomentella. . . . .	466	spicatum . . . . .	510	nodosa . . . . .	562
campestris. . . . .	467	alternifolium . . . . .	511	<b>Anthriscus</b>	
canina . . . . .	468	<b>Sanicula</b>		Cerefolium . . . . .	563
arvensis . . . . .	469	europæa . . . . .	513	silvestris . . . . .	564
<b>Agrimonia</b>		<b>Astrantia</b>		<b>Chærophyllum</b>	
Eupatoria . . . . .	470	major . . . . .	514	temulum . . . . .	565
canescens $\beta$ . . . . .	470	<b>Duplecurum</b>		<b>Myrrhis</b>	
aculifolia $\gamma$ . . . . .	470	rotundifolium. . . . .	516	odorata . . . . .	568
odorata . . . . .	471	<b>Aegopodium</b>		<b>Scandix</b>	
<b>Alchemilla</b>		Podagraria . . . . .	519	Pecten-Veneris. . . . .	569
vulgaris . . . . .	472	<b>Cerum</b>		<b>Conium</b>	
arvensis . . . . .	473	Bulbocastanum . . . . .	520	maculatum . . . . .	570
<b>Sanguisorba</b>		Carvi . . . . .	521	<b>Coriandrum</b>	
officinalis . . . . .	474	<b>Petroselinum</b>		sativum . . . . .	571
<b>Poterium</b>		sativum . . . . .	522	<b>Cornus</b>	
dietyocarpum . . . . .	475	<b>Heloschiadum</b>		sanguinea . . . . .	573
muricatum . . . . .	476	nodiflorum. . . . .	524	<b>Saxifraga</b>	
<b>Cratæus</b>		inundatum. . . . .	525	granulata . . . . .	581
monogyna . . . . .	479	<b>Pimpinella</b>		sponhemica $\beta$ . . . . .	582
<b>Cydonia</b>		magna . . . . .	528	hypnoides . . . . .	583
japonica . . . . .	484	<b>Oenante</b>		<b>Chrysosplenium</b>	
<b>Sorbus</b>		fistulosa . . . . .	532	alternifolium . . . . .	584
domestica . . . . .	489	peucedanifolia. . . . .	533	oppositifolium . . . . .	585
aucuparia . . . . .	490	<b>Meum</b>		<b>Erica</b>	
<b>Phlædiphus</b>		athamanticum. . . . .	539	Tetralix . . . . .	586
coronarius. . . . .	493	<b>Levisticum</b>		<b>Lysimachia</b>	
<b>Calycanthus</b>		officinale . . . . .	541	Nummularia . . . . .	592
floridus . . . . .	494	<b>Peucedanum</b>		nemorosum. . . . .	593
<b>Epilobium</b>		Chabræi . . . . .	545	vulgaris . . . . .	595
angustifolium . . . . .	495				

<b>Centunculus</b>		<b>Myosotis</b>		<b>Veronica</b>	
minimus . . .	596	versicolor . . .	643	Anagallis . . .	679
<b>Anagallis</b>		stricta . . .	644	Beccabunga . . .	680
arvensis . . .	597	sparsiflora . . .	645	Chamedrys . . .	681
<b>Armeria</b>		<b>Lithospermum</b>		montana . . .	682
elongata . . .	598	officinale . . .	646	officinalis . . .	683
<b>Plantago</b>		purpureo-cœruleum	647	prostrata . . .	684
major . . .	599	arvense . . .	648	Teucrium . . .	685
intermedia $\beta$ . . .	599	<b>Pulmonaria</b>		serpyllifolia . . .	686
minima $\gamma$ . . .	599	angustifolia . . .	650	peregrina . . .	687
media . . .	600	<b>Echium</b>		arvensis . . .	689
lanceolata . . .	601	vulgare . . .	652	triphyllis . . .	691
<b>Flex</b>		<b>Echinospermum</b>		agrestis . . .	693
aquifolium . . .	603	Lappula . . .	653	hederæfolia . . .	697
<b>Ligustrum</b>		<b>Cynoglossum</b>		<b>Limosella</b>	
vulgare . . .	604	officinale . . .	654	aquatica . . .	698
<b>Syringa</b>		<b>Asperugo</b>		<b>Scrophularia</b>	
vulgaris . . .	607	procumbens . . .	656	nodosa . . .	699
persica . . .	608	<b>Heliotropium</b>		Erharti . . .	700
<b>Vinca</b>		europæum . . .	657	Neesii . . .	701
minor . . .	610	<b>Solanum</b>		aquatica . . .	702
<b>Vincetoxicum</b>		Dulcamara . . .	658	vernalis . . .	703
officinale . . .	612	nigrum . . .	659	<b>Gnaphalium</b>	
<b>Clethra</b>		tuberosum . . .	660	officinale . . .	704
filiformis . . .	623	<b>Capsicum</b>		<b>Digitalis</b>	
<b>Polemonium</b>		annuum . . .	661	purpurea . . .	705
cœruleum . . .	626	<b>Lycopersicum</b>		lutea . . .	706
<b>Convolvulus</b>		esculentum . . .	662	purpureo-lutea . . .	707
arvensis . . .	627	<b>Physalis</b>		ambigua . . .	708
sepium . . .	628	Alkekengi . . .	663	ambiguo-lutea . . .	709
pubescens . . .	628b	<b>Atropa</b>		<b>Anthriscum</b>	
<b>Cuscuta</b>		Belladonna . . .	664	Orontium . . .	710
major . . .	631	<b>Lycium</b>		majus . . .	711
<b>Borago</b>		barbarum . . .	665	<b>Linaria</b>	
officinalis . . .	633	<b>Nyctaginia</b>		arvensis . . .	714
<b>Achusa</b>		niger . . .	668	Cymbalaria . . .	717
officinalis . . .	634	<b>Verbascum</b>		<b>Pedicularis</b>	
<b>Lycopsis</b>		Thapsus . . .	669	palustris . . .	720
arvensis . . .	635	thapsiforme . . .	670	silvatica . . .	721
<b>Symphytum</b>		phlomidoides . . .	671	<b>Rhinanthus</b>	
officinale . . .	636	montanum . . .	672	major . . .	722
<b>Myosotis</b>		pulverulentum . . .	673	minor . . .	723
palustris . . .	637	Lychnitis . . .	675	Alectorolophus . . .	724
strigulosa . . .	638	nigrum . . .	676	<b>Melampyrum</b>	
caespitosa . . .	639	nigro-floccosum . . .	677	eristatum . . .	726
silvatica . . .	640	<b>Veronica</b>		arvense . . .	727
intermedia . . .	641	scutellata . . .	678	pratense . . .	728
hispida . . .	642				

<b>Odontites</b>		<b>Hetonica</b>		<b>Cucurbita</b>	
<i>rubra</i> . . . . .	731	<i>officinalis</i> . . . . .	794	<i>maxima</i> . . . . .	837
<b>Utricularia</b>		<b>Marrubium</b>		<i>Pepo</i> . . . . .	838
<i>vulgaris</i> . . . . .	734	<i>vulgare</i> . . . . .	795	<b>Sambucus</b>	
<b>Phellipæa</b>		<b>Ballota</b>		<i>nigra</i> . . . . .	841
<i>cœrulea</i> . . . . .	735	<i>nigra</i> . . . . .	796	<b>Viburnum</b>	
<b>Orobunche</b>		<b>Leonurus</b>		<i>Opulus</i> . . . . .	844
<i>Rapum</i> . . . . .	737	<i>Cardiaca</i> . . . . .	797	<b>Lonicera</b>	
<i>elatior</i> . . . . .	738	<i>Marrubiastrum</i> . . . . .	798	<i>Xylosteum</i> . . . . .	845
<i>Galii</i> . . . . .	739	<b>Scutellaria</b>		<i>Periclymenum</i> . . . . .	846
<i>Epithymum</i> . . . . .	740	<i>galericulata</i> . . . . .	802	<i>caprifolium</i> . . . . .	847
<i>Teucriti</i> . . . . .	741	<b>Ajuga</b>		<b>Sherardia</b>	
<i>alsatica</i> . . . . .	742	<i>reptans</i> . . . . .	804	<i>arvensis</i> . . . . .	849
<i>minor</i> . . . . .	743	<i>pyramidalis</i> . . . . .	805	<b>Asperula</b>	
<b>Lavandula</b>		<i>genevensis</i> . . . . .	806	<i>arvensis</i> . . . . .	850
<i>vera</i> . . . . .	745	<i>Chamæpitys</i> . . . . .	807	<i>odorata</i> . . . . .	851
<b>Ocimum</b>		<b>Teucrium</b>		<i>Cynanchica</i> . . . . .	852
<i>Basilicum</i> . . . . .	746	<i>Scordium</i> . . . . .	810	<b>Gallium</b>	
<b>Mentha</b>		<i>montanum</i> . . . . .	812	<i>Cruciata</i> . . . . .	854
<i>gentilis</i> . . . . .	750	<b>Verbena</b>		<i>verum</i> . . . . .	855
<b>Salvia</b>		<i>officinalis</i> . . . . .	813	<i>sylvaticum</i> . . . . .	856
<i>pratensis</i> . . . . .	758	<b>Vaccinium</b>		<i>Mollugo</i> . . . . .	857
<i>officinalis</i> . . . . .	760	<i>Vitis-idaea</i> . . . . .	814	<i>erectum</i> . . . . .	858
<b>Thymus</b>		<b>Oxycoccus</b>		<i>silvestre</i> . . . . .	859
<i>Serpyllum</i> . . . . .	763	<i>palustris</i> . . . . .	816	<i>palustre</i> . . . . .	861
<i>Chamædrys</i> . . . . .	764	<b>Campanula</b>		<i>uliginosum</i> . . . . .	862
<i>vulgaris</i> . . . . .	765	<i>Rapunculus</i> . . . . .	817	<i>Aparine</i> . . . . .	863
<b>Calamultha</b>		<i>persicæfolia</i> . . . . .	818	<b>Centranthus</b>	
<i>Acinos</i> . . . . .	767	<i>glomerata</i> . . . . .	824	<i>ruber</i> . . . . .	865
<i>grandiflora</i> . . . . .	769	<i>patula</i> . . . . .	826	<b>Valeriana</b>	
<b>Melissa</b>		<b>Specularia</b>		<i>Phu</i> . . . . .	867
<i>officinalis</i> . . . . .	771	<i>speculum</i> . . . . .	827	<i>dioica</i> . . . . .	868
<b>Nepeta</b>		<i>hybrida</i> . . . . .	828	<b>Valerianella</b>	
<i>Cataria</i> . . . . .	773	<b>Phyteuma</b>		<i>olitoria</i> . . . . .	869
<b>Lamium</b>		<i>orbiculare</i> . . . . .	829	<i>carinata</i> . . . . .	870
<i>amplexicaule</i> . . . . .	775	<i>spicatum</i> . . . . .	830	<i>auricula</i> . . . . .	871
<i>incisum</i> . . . . .	776	<b>Jasione</b>		<i>Morisonii</i> . . . . .	872
<i>purpureum</i> . . . . .	777	<i>montana</i> . . . . .	831	<i>eriocarpa</i> . . . . .	873
<i>album</i> . . . . .	778	<i>perennis</i> . . . . .	832	<i>vesicaria</i> . . . . .	875
<i>maculatum</i> . . . . .	779	<b>Wahlenbergia</b>		<b>Knautia</b>	
<b>Galchobdolon</b>		<i>hederacea</i> . . . . .	833	<i>arvensis</i> . . . . .	879
<i>luteum</i> . . . . .	780	<b>Bryonia</b>		<i>silvatica</i> . . . . .	880
<b>Galcopsis</b>		<i>dioica</i> . . . . .	834	<b>Dipsacus</b>	
<i>ochroleuca</i> . . . . .	783	<b>Cucumis</b>		<i>pilosus</i> . . . . .	883
<b>Stachys</b>		<i>sativa</i> . . . . .	835	<b>Onopordon</b>	
<i>silvatica</i> . . . . .	788	<i>Melo</i> . . . . .	836	<i>Acanthium</i> . . . . .	884
<i>recta</i> . . . . .	793				

<b>Cirsium</b>		<b>Arnosolis</b>		<b>Hieracium</b>	
lanceolatum . . .	887	minima . . .	988	vulgatum . . .	1035
palustre . . .	889	<b>Hypochoeris</b>		tridentatum . . .	1036
arvense . . .	891	maculata . . .	993	<b>Polycnemum</b>	
<b>Carduus</b>		<b>Leontodon</b>		arvense . . .	1045
tenuiflorus . . .	893	hispidus . . .	995	<b>Spinaea</b>	
multiflorus . . .	894	hastilis . . .	996	glabra . . .	1051
nutans . . .	896	<b>Tragopogon</b>		oleracea . . .	1052
acanthoides . . .	897	porrifolius . . .	1000	<b>Chenopodium</b>	
<b>Silybum</b>		major . . .	1001	polyspermum . . .	1054
marianum . . .	898	orientalis . . .	1002	<b>Rumex</b>	
<b>Centaurea</b>		pratensis . . .	1003	scutatus . . .	1066
Cyanus . . .	906	<b>Scorzonera</b>		Acetosa . . .	1067
Scabiosa . . .	908	humilis . . .	1004	Acetosella . . .	1068
<b>Achillea</b>		hispanica . . .	1005	obtusifolius . . .	1069
Millefolium . . .	921	<b>Podospermum</b>		sanguineus . . .	1073
<b>Anthemis</b>		laciniatum . . .	1006	crispus . . .	1074
arvensis . . .	924	calceitrapifolium . . .	1007	Patientia . . .	1075
Cotula . . .	925	muricatum . . .	1008	<b>Polygonum</b>	
<b>Matricaria</b>		<b>Taraxacum</b>		cuspidatum . . .	1078
Chamomilla . . .	927	officinale . . .	1009	Bistorta . . .	1079
inodora . . .	928	paludosum . . .	1010	amphibium . . .	1080
<b>Pyrethrum</b>		<b>Chondrilla</b>		laphathifolium . . .	1081
Leucanthemum . . .	929	juncea . . .	1011	aviculare . . .	1086
Parthenium . . .	930	<b>Lactuca</b>		Bellardi . . .	1087
corymbosum . . .	931	muralis . . .	1013	<b>Fagopyrum</b>	
<b>Chrysanthemum</b>		perennis . . .	1014	esculentum . . .	1090
segetum . . .	933	saligna . . .	1015	tataricum . . .	1091
<b>Bellis</b>		Scariola . . .	1016	<b>Urtica</b>	
perennis . . .	934	saliva . . .	1017	dioica . . .	1098
<b>Arthemisia</b>		<b>Sonchus</b>		urens . . .	1099
Dracunculus . . .	935	oleraceus . . .	1019	<b>Parietaria</b>	
<b>Calendula</b>		<b>Barkhausia</b>		officinalis . . .	1100
arvensis . . .	943	fœtida . . .	1022	ramiflora . . .	1101
<b>Micropus</b>		taraxacifolia . . .	1023	<b>Eleagnus</b>	
ereclus . . .	945	<b>Crepis</b>		angustifolius . . .	1104
<b>Antennaria</b>		præmorsa . . .	1024	<b>Hippuris</b>	
dioica . . .	950	pulehra . . .	1025	vulgaris . . .	1106
<b>Inula</b>		paludosa . . .	1026	<b>Thesium</b>	
salicina . . .	958	biennis . . .	1027	pratense . . .	1107
<b>Arnica</b>		tectorum . . .	1028	<b>Aristolochia</b>	
montana . . .	971	virens . . .	1029	Clematitis . . .	1109
<b>Senecio</b>		<b>Hieracium</b>		Sipho . . .	1110
vulgaris . . .	973	Pilosella . . .	1030	<b>Euphorbia</b>	
viscosus . . .	974	Auricula . . .	1031	Lathyris . . .	1111
aquaticus . . .	978	præaltum . . .	1032	amygdaloides . . .	1112
<b>Lampsana</b>		caespitosum . . .	1033	helioscopia . . .	1114
communis . . .	987	murorum . . .	1034	exigua . . .	1115

<b>Euphorbia</b>	<b>Muscari</b>	<b>Gymnadenia</b>
dulcis . . . 1116	comosum . . . 1218	conopsea . . . 1261
verrucosa . . . 1117	<b>Phalangium</b>	odoratissima . . . 1262
stricta . . . 1119	ramosum . . . 1219	albida . . . 1263
Gerardiana. . . 1120	Liliago . . . 1220	viridis . . . 1264
Cyparissias . . . 1121	<b>Memecallis</b>	<b>Plantanthera</b>
Esuta . . . 1122	flava . . . 1222	bifolia . . . 1265
<b>Mercurialis</b>	<b>Asparagus</b>	chlorantha . . . 1266
annua . . . 1123	officinalis . . . 1224	<b>Limodorum</b>
<b>Callitriche</b>	<b>Convallaria</b>	abortivum . . . 1268
stagnalis . . . 1126	maialis . . . 1225	<b>Cephalanthera</b>
vernalis . . . 1127	<b>Polygonatum</b>	grandiflora . . . 1269
hamulata . . . 1128	verticillatum . . . 1226	Xylophyllum . . . 1270
<b>Castanea</b>	multiflorum . . . 1227	rubra . . . 1271
sativa . . . 1133	officinale . . . 1228	<b>Epipactis</b>
<b>Salix</b>	<b>Haianthemum</b>	palustris . . . 1273
pentandra . . . 1141	bifolium . . . 1229	<b>Neottia</b>
<b>Pinus</b>	<b>Leucocium</b>	Nidus-avis . . . 1274
silvestris . . . 1171	vernum . . . 1237	<b>Listera</b>
<b>Picea</b>	<b>Aceras</b>	ovata . . . 1275
excelsa . . . 1176	anthropophora . . . 1239	<b>Cypripedium</b>
<b>Juniperus</b>	<b>Loroglossum</b>	Calceolus . . . 1277
Sabina . . . 1181	hircinum . . . 1240	<b>Triglochin</b>
<b>Allium</b>	<b>Anacamptis</b>	palustris . . . 1278
Plantago . . . 1185	pyramidalis . . . 1241	<b>Potamogeton</b>
natans . . . 1186	<b>Orehis</b>	natans . . . 1279
<b>Sagittaria</b>	ustulata . . . 1242	polygonifolius . . . 1280
sagittifolia . . . 1187	tridentata . . . 1243	alpinus . . . 1282
<b>Rutoms</b>	purpurea . . . 1244	gramineus . . . 1283
umbellatus . . . 1188	militaris . . . 1245	heterophyllus $\beta$ . . . 1283
<b>Tulipa</b>	Simia . . . 1246	lucens . . . 1284
silvestris . . . 1190	coriophora. . . 1247	perfoliatus . . . 1285
Gesneriana. . . 1191	Morio . . . 1248	erispus . . . 1286
<b>Lilium</b>	pallens . . . 1249	densus . . . 1287
candidum . . . 1194	mascula . . . 1250	obtusifolius. . . 1289
<b>Ornithogalum</b>	laxiflora . . . 1251	pusillus . . . 1290
pyrenaicum . . . 1195	maculata . . . 1252	pectinatus . . . 1291
umbellatum . . . 1196	latifolia . . . 1253	<b>Zannichellia</b>
<b>Allium</b>	sambucina. . . 1254	palustris . . . 1292
Porrum . . . 1207	incarnata . . . 1255	<b>Lemna</b>
vineale . . . 1210	<b>Ophrys</b>	minor . . . 1295
oleraceum. . . 1211	muscifera . . . 1256	gibba . . . 1296
complanatum . . . 1212	aranifera . . . 1257	polyrrhiza . . . 1297
Schoenoprasum . . . 1214	fusciflora . . . 1258	<b>Arum</b>
Asealonieum . . . 1215	apifera . . . 1259	maculatum . . . 1298
Cepa . . . 1216	<b>Hernium</b>	<b>Calla</b>
fistulosum. . . 1217	Monorchis. . . 1260	palustris . . . 1299

<b>Acorus</b>		<b>Carex</b>		<b>Phleum</b>	
Calamus . . .	1300	fulva . . .	1356	Boehmeri . . .	1403
<b>Thypha</b>		binervis . . .	1357	<b>Agrostis</b>	
latifolia . . .	1301	lexigata . . .	1358	vulgaris . . .	1404
angustifolia . . .	1302	silvatica . . .	1359	alba . . .	1405
<b>Sparganium</b>		Pseudo-Cyperus	1360	canina . . .	1406
ramosum . . .	1303	rostrata . . .	1361	<b>Apera</b>	
simplex . . .	1304	vesicaria . . .	1362	Spica-venti . . .	1407
<b>Juncus</b>		riparia . . .	1364	interrupta . . .	1408
conglomeratus	1305	hirta . . .	1365	<b>Milium</b>	
effusus . . .	1306	<b>Helicocharis</b>		effusum . . .	1413
glaucus . . .	1307	palustris . . .	1367	<b>Stipa</b>	
filiformis . . .	1308	acicularis . . .	1368	pinnata . . .	1414
silvaticus . . .	1309	<b>Scirpus</b>		<b>Alra</b>	
obtusiflorus . . .	1311	pauciflorus. . .	1369	caryophyllea . . .	1417
squarrosus. . .	1313	caespitosus. . .	1370	praecox . . .	1418
compressus . . .	1314	setaceus . . .	1371	<b>Deschampsia</b>	
Tenageia . . .	1315	lacustris . . .	1372	caespitosa . . .	1419
bufonius . . .	1316	maritimus. . .	1374	flexuosa . . .	1420
<b>Luzula</b>		silvaticus . . .	1375	<b>Avena</b>	
angustifolia . . .	1318	compressus . . .	1376	sativa . . .	1423
silvatica . . .	1319	<b>Eriophorum</b>		fatua . . .	1427
<b>Carex</b>		gracile . . .	1380	barbata . . .	1428
pulicaris . . .	1322	<b>Zea</b>		pubescens . . .	1429
disticha . . .	1323	Mays . . .	1383	pratensis . . .	1430
vulpina . . .	1324	<b>Anthoxanthum</b>		flavescens . . .	1431
muricata . . .	1325	odoratum . . .	1385	<b>Arrhenantherum</b>	
divulsa . . .	1326	<b>Hierochloa</b>		elatius . . .	1432
teretiusecula . . .	1327	odorata . . .	1386	<b>Holcus</b>	
paniculata. . .	1328	<b>Phalaris</b>		lanatus . . .	1433
paradoxa . . .	1329	canariensis . . .	1387	mollis . . .	1434
brizoides . . .	1331	<b>Baldingera</b>		<b>Sieglingia</b>	
remota . . .	1332	arundinacea . . .	1388	decumbens . . .	1436
echinata . . .	1333	<b>Oplismenus</b>		<b>Koeleria</b>	
leporina . . .	1334	Crus-galli . . .	1389	cristata . . .	1437
elongata . . .	1335	<b>Digitaria</b>		<b>Cynosurus</b>	
canescens . . .	1336	sanguinalis . . .	1390	cristatus . . .	1440
stricta . . .	1337	<b>Setaria</b>		<b>Veltea</b>	
Goodenoughii . . .	1339	viridis . . .	1393	ciliata . . .	1441
tomentosa . . .	1342	<b>Alopecurus</b>		uniflora . . .	1442
pænicea . . .	1348	agrestis . . .	1397	nutans . . .	1443
pendula . . .	1350	pratensis . . .	1398	<b>Catabrosa</b>	
pallescens . . .	1351	utriculatus. . .	1399	aquatica . . .	1445
flava . . .	1352	fulvus . . .	1400	<b>Glyceria</b>	
Oederi . . .	1353	geniculatus . . .	1401	fluitans . . .	1446
distans . . .	1354	<b>Phleum</b>		plicata . . .	1447
Hornschuchiana	1355	pratense . . .	1402	aquatica . . .	1448



<b>Glyceria</b>		<b>Bromus</b>		<b>Lolium</b>	
maritima . . .	1449	patulus . . .	1468	perenne . . .	1491
<b>Briza</b>		mollis . . .	1469	italicum . . .	1492
media . . .	1450	racemosus . . .	1470	multiflorum . . .	1493
maxima . . .	1451	commutatus . . .	1471	temulentum . . .	1494
<b>Sclerochloa</b>		secalinus . . .	1472	remotum . . .	1495
dura . . .	1452	grossus . . .	1473	<b>Hordeum</b>	
<b>Poa</b>		arduennensis . . .	1474	murinum . . .	1496
annua . . .	1453	Schraderi . . .	1475	secalinum . . .	1497
bulbosa . . .	1454	<b>Festuca</b>		distichum . . .	1498
nemoralis . . .	1455	rigida . . .	1476	zeoerithon . . .	1499
serotina . . .	1456	bromoides . . .	1477	vulgare . . .	1500
Chaixii . . .	1457	sciuroides . . .	1478	hexastichon . . .	1501
trivialis . . .	1458	Pseudo-Myuros	1479	<b>Elymus</b>	
pratensis . . .	1459	rubra . . .	1480	europæus . . .	1502
compressus . . .	1460	heterophylla . . .	1481	<b>Secale</b>	
<b>Dactylis</b>		duriuscula . . .	1482	cereale . . .	1503
glomerata . . .	1461	ovina . . .	1483	<b>Triticum</b>	
<b>Bromus</b>		elatior . . .	1484	turgidum . . .	1506
sterilis . . .	1462	loliacea . . .	1485	monococcum . . .	1508
tectorum . . .	1463	arundinacea . . .	1486	repens . . .	1509
asper . . .	1464	silvatica . . .	1487	caninum . . .	1510
erectus . . .	1465	gigantea . . .	1488	<b>Nardus</b>	
inermis . . .	1466	<b>Brachypodium</b>		stricta . . .	1511
arvensis . . .	1467	pinnatum . . .	1490		

## JUILLET.

<b>Clematis</b>		<b>Ranunculus</b>		<b>Delphinium</b>	
Vitalba . . .	1	fluitans . . .	19	Consolida . . .	44
recta . . .	2	divaricatus . . .	20	Ajacis . . .	45
<b>Talictrum</b>		sceleratus . . .	21	<b>Aconitum</b>	
minus . . .	3	Flammula . . .	23	lycoctonum . . .	46
saxatile $\beta$ . . .	3	Lingua . . .	24	Napellus . . .	47
majus . . .	4	aeris . . .	26	<b>Gypsophila</b>	
elatum $\beta$ . . .	4	repens . . .	29	murais . . .	52
flavum . . .	5	bulbosus . . .	30	<b>Dianthus</b>	
<b>Adonis</b>		sardous . . .	31	prolifer . . .	53
autumnalis . . .	11	parvulus $\beta$ . . .	31	diminutus $\beta$ . . .	53
æstivalis . . .	12	arvensis . . .	33	Armeria . . .	51
flava $\beta$ . . .	12	inermis $\beta$ . . .	33	Carthusianorum	52
flammea . . .	13	<b>Nigella</b>		Caryophyllus . . .	56
<b>Ranunculus</b>		arvensis . . .	40	deltoides . . .	58
hederaceus . . .	15	damascena . . .	41	glaucus $\beta$ . . .	58
aquatilis . . .	16	saliva . . .	42	cæsius . . .	59
tripartitus . . .	17	<b>Aquilegia</b>		plumarius . . .	60
trichophyllus . . .	18	vulgaris . . .	43		

<b>Saponaria</b>		<b>Malacchium</b>		<b>Ampelopsis</b>	
Vaccaria . . . . .	61	arenaria $\beta$ . . . . .	104	hederacea . . . . .	151
officinalis . . . . .	62	<b>Elatine</b>		<b>Monotropa</b>	
<b>Cucubalus</b>		Alsinastrum . . . . .	105	hypopitys . . . . .	151
baccifer . . . . .	63	<b>Linum</b>		<b>Hypericum</b>	
<b>Silene</b>		catarticum . . . . .	106	perforatum . . . . .	153
inflata . . . . .	64	tenuifolium . . . . .	107	humifusum . . . . .	156
conica . . . . .	65	usitatissimum . . . . .	108	quadrangulum . . . . .	157
conoidea . . . . .	66	<b>Rudifolia</b>		tetrapterum . . . . .	158
gallica . . . . .	68	linoides . . . . .	109	pulehrum . . . . .	159
noctiflora . . . . .	69	<b>Oxalis</b>		montanum . . . . .	160
Armeria . . . . .	70	stricta . . . . .	111	hirsutum . . . . .	161
<b>Melaudryum</b>		<b>Ruta</b>		<b>Drosera</b>	
silvestre . . . . .	71	graveolens. . . . .	112	rotundifolia. . . . .	162
pratense . . . . .	72	<b>Impatiens</b>		longifolia . . . . .	163
<b>Lychuis</b>		noli-tangere . . . . .	114	<b>Pyrola</b>	
chalcedonica . . . . .	73	Balsamina . . . . .	115	rotundifolia. . . . .	165
Flos-Cuculi . . . . .	74	<b>Geranium</b>		minor . . . . .	166
tomentosa . . . . .	75	pratense . . . . .	118	<b>Roseda</b>	
Githago . . . . .	77	palustre . . . . .	119	luteola . . . . .	167
<b>Spergularia</b>		sanguineum . . . . .	120	lutea . . . . .	168
segetalis . . . . .	78	columbinum . . . . .	121	odorata . . . . .	169
rubra . . . . .	79	dissectum . . . . .	122	<b>Nuphar</b>	
<b>Spergula</b>		molle . . . . .	123	luteum . . . . .	170
arvensis . . . . .	80	pusillum . . . . .	124	<b>Nymphaea</b>	
<b>Sagina</b>		rotundifolium . . . . .	125	alba . . . . .	171
procumbens . . . . .	82	Robertianum . . . . .	126	<b>Papaver</b>	
apetala . . . . .	83	<b>Erodium</b>		somniferum. . . . .	172
saxatilis $\beta$ . . . . .	83	Cicutarium . . . . .	127	setigerum $\beta$ . . . . .	172
ciliata . . . . .	84	pimpinellæfolium . . . . .	128	Rheas . . . . .	173
depressa $\beta$ . . . . .	84	<b>Malva</b>		Argemone . . . . .	175
<b>Alsine</b>		Alcea . . . . .	129	dubium . . . . .	176
tenuifolia . . . . .	85	moschata . . . . .	130	Lecoquii . . . . .	177
viscosa . . . . .	86	silvestris . . . . .	131	<b>Chelidonium</b>	
<b>Arenaria</b>		rotundifolia . . . . .	132	majus . . . . .	178
serpyllifolia . . . . .	89	crispa . . . . .	133	<b>Glaucium</b>	
<b>Stellaria</b>		<b>Alcea</b>		flavum . . . . .	179
media . . . . .	91	officinalis . . . . .	134	<b>Eschscholtzia</b>	
Holostea . . . . .	92	hirsuta . . . . .	135	californica . . . . .	180
glauca . . . . .	93	rosea . . . . .	136	<b>Corydalis</b>	
graminea . . . . .	94	<b>Hibiscus</b>		lutea . . . . .	182
uliginosa . . . . .	95	Trionum . . . . .	137	<b>Fumaria</b>	
<b>Cerastium</b>		<b>Tilia</b>		officinalis . . . . .	183
cæspitosum . . . . .	96	platyphyllos . . . . .	139	tenuifolia . . . . .	184
brachypetalum . . . . .	100	silvestris . . . . .	140	parviflora . . . . .	186
<b>Malacchium</b>		<b>Polygala</b>		capreolata . . . . .	187
aquaticum. . . . .	104	comosa . . . . .	142		

<b>Barbarea</b>		<b>Conoclinium</b>		<b>Trigonella</b>	
striata . . .	193	silvestris . . .	241	Foeniculum-graecum . . .	292
<b>Arabis</b>		sativa . . .	242	<b>Roblula</b>	
hirsuta . . .	195	dentata . . .	243	pseudo-acacia . . .	293
sagittata . . .	196	<b>Triblaspi</b>		umbraclifera $\beta$ . . .	293
arenosa . . .	197	arvense . . .	245	<b>Galega</b>	
<b>Cordamlic</b>		<b>Theris</b>		officinalis . . .	295
silvatica . . .	202	amara . . .	249	<b>Astragalus</b>	
<b>Nasturtium</b>		<b>Capsella</b>		glycyphyllos . . .	297
officinale . . .	204	Bursa pastoris . . .	250	<b>Mellilotus</b>	
silvestre . . .	205	<b>Lepidium</b>		arvensis . . .	298
amphibium . . .	206	sativum . . .	251	macrorrhiza . . .	299
palustre . . .	207	campestre . . .	252	leucantha . . .	300
<b>Turritis</b>		graminifolium . . .	253	alba . . .	301
glabra . . .	208	rudérale . . .	254	parviflora . . .	302
<b>Sisymbrium</b>		<b>Senecio</b>		caerulea . . .	303
officinale . . .	211	Coronopus . . .	256	<b>Medicago</b>	
Sophia . . .	212	<b>Hellanthemum</b>		lupulina . . .	304
<b>Braya</b>		Chamaecistus . . .	260	Willdenowii $\beta$ . . .	304
supina . . .	213	polifolium . . .	261	falcata . . .	305
<b>Erysimum</b>		<b>Viola</b>		sativa . . .	306
cheiranthoides . . .	214	tricolor . . .	270	minima . . .	308
hieracifolium . . .	215	Altaica . . .	271	Echinus . . .	309
virgatum . . .	216	elatior . . .	272	maculata . . .	310
<b>Diploxys</b>		rothomagensis . . .	273	<b>Trifolium</b>	
tenuifolia . . .	219	intermedia . . .	274	filiforme . . .	312
muralis . . .	220	<b>Rhamnus</b>		procumbens . . .	313
<b>Erucastrum</b>		frangula . . .	276	aureum . . .	314
obtusangulum . . .	221	<b>Cytisus</b>		agrarium . . .	315
<b>Brassica</b>		laburnum . . .	278	majus $\alpha$ . . .	315
nigra . . .	225	<b>Genista</b>		minus $\beta$ . . .	315
<b>Sinapis</b>		anglica . . .	279b	pratense . . .	316
arvensis . . .	226	sagittalis . . .	280	sativum $\beta$ . . .	316
alba . . .	227	tinctoria . . .	281	medium . . .	317
Cheiranthus . . .	228	pilosa . . .	282	alpestre . . .	318
<b>Raphanus</b>		juncea . . .	283	ochroleucum . . .	319
Raphanistrum . . .	229	<b>Lupinus</b>		rubens . . .	320
<b>Lunaria</b>		luteus . . .	284	incarnatum . . .	321
rediviva . . .	231	angustifolius . . .	285	arvense . . .	322
<b>Alyssum</b>		<b>Ononis</b>		striatum . . .	323
campestre . . .	234	spinosa . . .	287	montanum . . .	324
<b>Berteroa</b>		repens . . .	288	repens . . .	325
incana . . .	236	<b>Anthyllis</b>		hybridum . . .	326
<b>Cochlearia</b>		vulneraria . . .	289	fragiferum . . .	327
Armoracia . . .	239	<b>Lotus</b>		<b>Phaseolus</b>	
officinalis . . .	240	corniculatus . . .	290	vulgaris . . .	328
		uliginosus . . .	291	multiflorum . . .	329

<b>Vicia</b>		<b>Portulaca</b>		<b>Potentilla</b>	
Cracca . . .	332	sativa . . .	371	Anserina . . .	450
tenuifolia . . .	333	<b>Montia</b>		rupestris . . .	451
onobrychioides	334	rivularis . . .	373	supina . . .	452
scopium . . .	335	<b>Corrigiola</b>		argentea . . .	453
sativa . . .	337	litoralis . . .	374	recta . . .	454
angustifolia . . .	338	<b>Herularia</b>		<b>Tormentilla</b>	
<b>Ervum</b>		glabra . . .	375	procumbens . . .	455
hirsutum . . .	340	hirsuta . . .	376	silvestris . . .	456
tetraspermum . . .	341	<b>Scleranthus</b>		<b>Rosa</b>	
gracile . . .	342	annuus . . .	377	pimpinellifolia . . .	457
monanthos . . .	343	perennis . . .	378	arvensis . . .	469
Ervilia . . .	344	<b>Crassula</b>		<b>Agrimonia</b>	
Lens . . .	345	rubens . . .	379	Eupatoria . . .	470
<b>Faba</b>		<b>Sedum</b>		canescens $\beta$ . . .	470
vulgaris . . .	346	acre . . .	380	acutifolia $\gamma$ . . .	470
<b>Pisum</b>		sexangulare . . .	381	odorata . . .	471
sativum . . .	347	boloniense . . .	382	<b>Achemilla</b>	
arvense . . .	348	reflexum . . .	383	vulgaris . . .	472
<b>Lathyrus</b>		glaucescens $\beta$ . . .	383	arvensis . . .	473
Aphaca . . .	349	aureum . . .	384	<b>Sanguisorba</b>	
Nissolia . . .	350	treviricum . . .	385	officinalis . . .	474
sativus . . .	351	album . . .	386	<b>Poterium</b>	
hirsutus . . .	352	maximum . . .	387	dictyocarpum . . .	475
tuberosus . . .	353	purpurascens . . .	388	muricatum . . .	476
pratensis . . .	354	<b>Sempervivum</b>		<b>Calycanthus</b>	
silvestris . . .	355	tectorum . . .	389	floridus . . .	494
odoratus . . .	356	<b>Spiraea</b>		<b>Epilobium</b>	
latifolius . . .	357	Filipendula . . .	402	angustifolium . . .	495
<b>Orobis</b>		Ulmaria . . .	403	hirsutum . . .	496
tuberosus . . .	358	salicifolia . . .	404	parviflorum . . .	497
niger . . .	359	hypericifolia . . .	405	lanceolatum . . .	498
<b>Coronilla</b>		<b>Kerria</b>		montanum . . .	499
Emerus . . .	361	japonica . . .	407	nutans $\beta$ . . .	499
varia . . .	362	<b>Rubus</b>		roseum . . .	500
<b>Ornithopus</b>		fruticosus . . .	408	tetragonum . . .	501
perpusillus . . .	363	cæsius . . .	431	obscurum . . .	502
sativus . . .	364	Idæus . . .	433	palustre . . .	503
<b>Hippocrepis</b>		odoratus . . .	434	decumbens $\beta$ . . .	503
comosa . . .	365	<b>Geum</b>		<b>Oenanthera</b>	
<b>Lythrum</b>		urbanum . . .	435	biennis . . .	504
salicaria . . .	367	rivale . . .	436	<b>Isuardia</b>	
hyssopifolia . . .	368	rivali-urbanum . . .	437	palustris . . .	505
<b>Peplys</b>		urbano-rivale . . .	438	<b>Circæa</b>	
Portula . . .	369	<b>Potentilla</b>		lutetiana . . .	506
<b>Portulaca</b>		reptans . . .	448	intermedia . . .	507
oleracea . . .	370	alpestris . . .	449	alpina . . .	508

<b>Myriophyllum</b>		<b>Silaus</b>		<b>Conium</b>	
verticillatum . . .	509	pratensis . . .	540	maculatum . . .	570
spicatum . . .	510	<b>Levisticum</b>		<b>Corlaudrum</b>	
alternifolium . . .	511	officinale . . .	541	sativum . . .	571
<b>Hydracotyle</b>		<b>Sellium</b>		<b>Erica</b>	
vulgaris . . .	512	carvifolium . . .	542	Tetralix . . .	586
<b>Eryngium</b>		<b>Angelica</b>		<b>Calluna</b>	
campestris. . .	515	silvestris . . .	543	vulgaris . . .	587
<b>Bupleurum</b>		<b>Archangelica</b>		<b>Lysimachia</b>	
rotundifolium. . .	516	officinalis . . .	544	Nummularia . . .	592
falcatum . . .	517	<b>Peucedanum</b>		nemorum . . .	593
<b>Falcaria</b>		Chabraei . . .	545	punctata . . .	594
vulgaris . . .	518	Cervaria . . .	546	vulgaris . . .	595
<b>Aegopodium</b>		palustre . . .	547	<b>Centunculus</b>	
Podagraria . . .	519	Oreoselinum . . .	548	minimus . . .	596
<b>Carum</b>		<b>Anethum</b>		<b>Anagallis</b>	
Bulbocastanum	520	graveolens. . .	549	arvensis . . .	597
<b>Petroselinum</b>		<b>Pastinaca</b>		<b>Armeria</b>	
sativum . . .	522	silvestris . . .	550	elongata . . .	598
<b>Aplum</b>		sativa . . .	551	<b>Plantago</b>	
graveolens. . .	523	<b>Herncleum</b>		major . . .	599
<b>Helioscladum</b>		Spondylium . . .	552	intermedia $\beta$ . . .	599
nodiflorum. . .	524	<b>Tordylium</b>		minima $\gamma$ . . .	599
inundatum. . .	525	maximum . . .	553	media . . .	600
<b>Slum</b>		<b>Laserpitium</b>		lanceolata . . .	601
latifolium . . .	526	latifolium . . .	554	Arenaria . . .	602
angustifolium. . .	527	<b>Daucus</b>		<b>Ligustrum</b>	
<b>Plimphella</b>		Carota . . .	555	vulgare . . .	604
magna . . .	528	<b>Orlana</b>		<b>Ulcetoxticum</b>	
saxifraga . . .	529	grandiflora . . .	556	officinale . . .	612
Anisum . . .	530	<b>Turgenia</b>		<b>Aselepias</b>	
<b>Aethusa</b>		latifolia . . .	557	syriaca . . .	613
cynapium . . .	531	<b>Caucalis</b>		<b>Limnanthemum</b>	
<b>Oenanthe</b>		daucoides . . .	558	nymphæoides . . .	615
fistulosa . . .	532	Leptophylla . . .	559	<b>Gentiana</b>	
peucedanifolia. . .	533	<b>Torilis</b>		cruciata . . .	616
Phellandrium . . .	534	Anthriscus. . .	560	Pneumonanthe . . .	617
<b>Libanotis</b>		infesta . . .	561	ciliata . . .	621
montana . . .	535	nodosa . . .	562	acaulis . . .	622
<b>Seseli</b>		<b>Anthriscus</b>		<b>Cleodtia</b>	
annuum . . .	536	Cerefolium . . .	563	filiformis . . .	623
montanum. . .	537	<b>Cherophyllum</b>		<b>Erithraea</b>	
<b>Feniculum</b>		temulum . . .	565	Centaurium. . .	624
officinale . . .	538	bulbosum . . .	566	pulchella . . .	625
<b>Meum</b>		hirsutum . . .	567	<b>Polemonium</b>	
athananticum. . .	539	<b>Myrrhis</b>		cœrulum . . .	626
		odorata . . .	568		

<b>Convolvulus</b>		<b>Verbascum</b>		<b>Melampyrum</b>	
arvensis . . .	627	Thapsus . . .	669	cristatum . . .	726
sepium . . .	628	thapsiforme . .	670	arvense . . .	727
<b>Cuscuta</b>		phlomoïdes . .	671	pratense . . .	728
Epilinum . . .	630	montanum. . .	672	<b>Euphrasia</b>	
major . . .	631	pulverulentum	673	officinalis . . .	729
Epilymum. . .	632	floccosum . . .	674	nemorosa . . .	730
<b>Horago</b>		Lychnitis . . .	675	<b>Odontites</b>	
officinalis . . .	633	nigrum . . .	676	rubra . . .	731
<b>Lycopsis</b>		nigro-floccosum	677	serotina . . .	732
arvensis . . .	635	<b>Veronica</b>		lutea . . .	733
<b>Myosotis</b>		scutellata . . .	678	<b>Utricularia</b>	
palustris . . .	637	Anagallis . . .	679	vulgaris . . .	734
strigulosa . . .	638	Beccabunga . .	680	<b>Phelipca</b>	
cæspitosa . . .	639	montana . . .	682	cœrulea . . .	735
silvatica . . .	640	officinalis . . .	683	ramosa . . .	736
intermedia. . .	641	prostrata . . .	684	<b>Orobanchæ</b>	
<b>Lithospermum</b>		Teucrium . . .	685	Galii . . .	739
officinale . . .	646	serpyllifolia . .	686	Epithymum. . .	740
purpureo-cœruleum	647	arvensis . . .	689	Teucrii . . .	741
arvense . . .	648	agrestis . . .	690	minor . . .	743
<b>Echlum</b>		<b>Limosella</b>		<b>Lavandula</b>	
vulgare . . .	652	aquatica . . .	698	vera . . .	745
<b>Echinospermum</b>		<b>Scrophularia</b>		<b>Ocimum</b>	
Lappula . . .	653	nodosa . . .	699	Basilicum . . .	746
<b>Cynoglossum</b>		Erharti . . .	700	<b>Mentha</b>	
officinale . . .	654	Neesii . . .	701	silvestris . . .	747
<b>Asperugo</b>		aquatica . . .	702	rotundifolia. . .	748
procumbens . .	656	vernalis . . .	703	viridis . . .	749
<b>Heliotropium</b>		<b>Gratiola</b>		gentilis . . .	750
europæum. . .	657	officinalis . . .	704	pubescens . . .	751
<b>Solanum</b>		<b>Digitallis</b>		piperita . . .	752
Dulcamara. . .	658	purpurea . . .	705	aquatica . . .	753
nigrum . . .	659	lutea . . .	706	arvensis . . .	754
tuberosum. . .	660	purpureo-lutea	707	Pulegium . . .	755
<b>Physalis</b>		ambigua . . .	708	<b>Lycopus</b>	
Alkekengi . . .	663	ambiguo-lutea	709	europæus . . .	756
<b>Atropa</b>		<b>Anthriscinum</b>		<b>Salvia</b>	
Belladonna . . .	664	Orontium . . .	710	pratensis . . .	758
<b>Lycium</b>		majus . . .	711	Scalaria . . .	759
barbarum . . .	665	<b>Linaria</b>		officinalis . . .	760
<b>Nicotiana</b>		vulgaris . . .	712	<b>Origanum</b>	
rustica . . .	666	minor . . .	713	vulgare . . .	761
<b>Datura</b>		arvensis . . .	714	Majorana . . .	762
Stramonium . .	667	simplex . . .	715	<b>Thymus</b>	
<b>Hyoscyamus</b>		striata . . .	716	Serpyllum . . .	763
niger . . .	668			Chamædrys. . .	764

<b>Thymus</b>		<b>Brunella</b>		<b>Symphoria</b>	
vulgaris . . .	765	vulgaris . . .	799	racemosa . . .	848
<b>Hyssopus</b>		grandiflora . .	800	<b>Sherardia</b>	
officinalis . . .	766	alba . . .	801	arvensis . . .	849
<b>Calamintha</b>		<b>Scutellaria</b>		<b>Asperula</b>	
Acinos . . .	767	galericulata . .	802	arvensis . . .	850
officinalis . . .	768	minor . . .	803	Cynanchica . . .	852
grandiflora . .	769	<b>Ajuga</b>		galioides . . .	853
<b>Chenopodium</b>		genevensis. . .	806	<b>Callunum</b>	
vulgare . . .	770	Chamæpitys . .	807	verum . . .	855
<b>Melissa</b>		<b>Teucrium</b>		silvaticum . . .	856
officinalis . . .	771	Scorodonia. . .	808	silvestre . . .	859
<b>Satureia</b>		Botrys . . .	809	saxatile . . .	860
hortensis . . .	772	Scordium . . .	810	uliginosum . . .	862
<b>Nepeta</b>		Chamædryas . .	811	Aparine . . .	863
Cataria . . .	773	montanum. . .	812	tricorne . . .	864
<b>Lamium</b>		<b>Verbena</b>		<b>Centranthus</b>	
amplexicaule . .	775	officinalis . . .	813	ruber . . .	865
incisum . . .	776	<b>Vaccinium</b>		<b>Valeriana</b>	
purpureum . . .	777	Vitis-idea . . .	814	officinalis . . .	866
album . . .	778	<b>Oxycoccus</b>		<b>Valerianella</b>	
maculatum . . .	779	palustris . . .	816	auricula . . .	871
<b>Galeopsis</b>		<b>Campanula</b>		Morisonii . . .	872
Tetrahit . . .	781	Rapunculus . . .	817	coronata . . .	874
speciosa . . .	782	persicæfolia . .	818	vesicaria . . .	875
ochroleuca. . .	783	pyramidalis . .	819	<b>Scabiosa</b>	
intermedia. . .	784	rotundifolia . .	820	Columbaria. . .	876
Ladanum . . .	785	rapunculoides. .	821	Succisa . . .	877
<b>Stachys</b>		Trachelium . . .	822	atropurpurea . .	878
germanica. . .	786	Medium . . .	823	<b>Knautia</b>	
alpina . . .	787	glomerata . . .	824	arvensis . . .	879
silvatica . . .	788	Cerriaria. . .	825	silvatica . . .	880
ambigua . . .	789	patula . . .	826	<b>Dipsacus</b>	
palustris . . .	790	<b>Specularia</b>		silvestris . . .	881
arvensis . . .	791	speculum . . .	827	Fullonum . . .	882
annua . . .	792	hybrida . . .	828	pilosus . . .	883
recta . . .	793	<b>Phyteuma</b>		<b>Opopordon</b>	
<b>Betonica</b>		orbiculare . . .	829	Acanthium . . .	884
officinalis . . .	794	<b>Jasione</b>		<b>Carlina</b>	
<b>Marrubium</b>		montana . . .	831	vulgare . . .	885
vulgare . . .	795	perennis . . .	832	<b>Cirsium</b>	
<b>Ballota</b>		<b>Wahnenbergia</b>		lanceolatum. . .	887
nigra . . .	796	hederacea . . .	833	eriphorum. . .	888
<b>Leonurus</b>		<b>Lonicera</b>		palustre . . .	889
Cardiaca . . .	797	Periclymenum. .	846	acaule . . .	890
Marrubiastrum .	798	caprifolium . . .	847	arvense . . .	891
				oleraceum . . .	892

<b>Carduus</b>		<b>Pyrethrum</b>		<b>Stenactis</b>	
tenuiflorus. . .	893	Leucanthemum	929	arvensis . . .	964
multiflorus . . .	894	Parthenium . . .	930	<b>Aster</b>	
crispus . . .	895	corymbosum . . .	931	Amellus . . .	965
nutans . . .	896	<b>Chrysanthemum</b>		leucanthemus . . .	967
acanthoides . . .	897	segetum . . .	933	<b>Arnica</b>	
<b>Silybum</b>		<b>Bellis</b>		montana . . .	971
marianum . . .	898	perennis . . .	934	<b>Senecio</b>	
<b>Lappa</b>		<b>Artemisia</b>		vulgaris . . .	973
officinalis . . .	899	vulgaris . . .	936	viscosus . . .	974
glabra . . .	900	Absinthium . . .	937	silvaticus . . .	975
racemosa . . .	901	campestris. . .	938	Jacobæa . . .	977
tomentosa . . .	902	pontica . . .	939	aquaticus . . .	978
<b>Serratula</b>		<b>Tanacetum</b>		nemorensis . . .	979
tinctoria . . .	903	vulgare . . .	940	Sarracenicus . . .	980
<b>Centaurea</b>		Balsamita . . .	941	Fuchsii . . .	981
Calcitrapa . . .	904	<b>Tajetes</b>		ovatus . . .	982
solsittialis . . .	905	patula . . .	942	<b>Eupatorium</b>	
Cyanus . . .	906	<b>Calendula</b>		cannabinum. . .	984
montana . . .	907	arvensis . . .	943	<b>Lampsana</b>	
Scabiosa . . .	908	officinalis . . .	944	communis . . .	987
maculosa . . .	909	<b>Micropus</b>		<b>Arnoscris</b>	
Jacea . . .	910	erectus . . .	945	minima . . .	988
nigrescens. . .	911	<b>Helichrysum</b>		<b>Cichorium</b>	
phrygia . . .	912	arenarium. . .	946	Intybus . . .	989
nigra . . .	913	<b>Gnaphalium</b>		Endivia . . .	990
<b>Echinops</b>		silvaticum. . .	947	<b>Hypochaeris</b>	
speroccephalus. . .	914	luteo-album . . .	948	glabra . . .	991
<b>Bidens</b>		uliginosum . . .	949	radicata . . .	992
tripartitus. . .	915	<b>Filago</b>		maculata . . .	993
<b>Helianthus</b>		germanica. . .	951	<b>Thrincla</b>	
annuus . . .	917	gallica . . .	952	hirta . . .	994
<b>Madia</b>		minima . . .	953	<b>Leontodon</b>	
sativa . . .	920	arvensis . . .	954	hispidus . . .	995
<b>Achillea</b>		<b>Pulicaria</b>		hastilis . . .	996
Millefolium . . .	921	dysenterica . . .	955	autumnalis . . .	997
Parnica . . .	922	vulgaris . . .	956	<b>Pteris</b>	
<b>Ornithis</b>		<b>Inula</b>		hieracioides. . .	998
nobilis . . .	923	Conyza . . .	957	<b>Helminthia</b>	
<b>Anthemis</b>		salicina . . .	958	echioides . . .	999
arvensis . . .	924	britannica . . .	959	<b>Trugopogon</b>	
Cotula . . .	925	<b>Solidago</b>		porrifolius . . .	1000
tinctoria . . .	926	Virga-aurea . . .	960	major . . .	1001
<b>Matricaria</b>		<b>Erigeron</b>		orientalis . . .	1002
Chamomilla . . .	927	acre . . .	962	pratensis . . .	1003
inodora . . .	928	canadense . . .	963	<b>Scorzonera</b>	
				hispanica . . .	1005



<b>Podospermum</b>	<b>Polycnemum</b>	<b>Polygonum</b>
laciniatum . . . 1006	arvense . . . 1045	Hydropiper . . . 1083
calcitrapifolium 1007	<b>Atriplex</b>	aviculare . . . 1086
muricatum . . . 1008	hortense . . . 1046	Bellardi . . . 1087
<b>Taraxacum</b>	nitens . . . 1047	Convulvulus . . . 1088
officinale . . . 1009	tataricum . . . 1048	dumetorum . . . 1089
paludosum . . . 1010	hastatum . . . 1049	<b>Fagopyrum</b>
<b>Chondrilla</b>	patulum . . . 1050	esculentum . . . 1090
juncea . . . 1011	<b>Spinacla</b>	tataricum . . . 1091
<b>Prenunthes</b>	glabra . . . 1051	<b>Cannabis</b>
purpurea . . . 1012	oleracea . . . 1052	sativa . . . 1094
<b>Lactuca</b>	<b>Beta</b>	<b>Humulus</b>
muralis . . . 1013	vulgaris . . . 1053	Lupulus . . . 1095
perennis . . . 1014	<b>Chenopodium</b>	<b>Crtica</b>
saligna . . . 1015	polyspermum . . . 1054	dioica . . . 1098
Scariola . . . 1016	Vulvaria . . . 1055	urens . . . 1099
sativa . . . 1017	album . . . 1056	<b>Parietaria</b>
virosa . . . 1018	hybridum . . . 1057	officinalis . . . 1100
<b>Sonchus</b>	glaucum . . . 1058	ramiflora . . . 1101
oleraceus . . . 1019	urbicum . . . 1059	<b>Thymelaea</b>
asper . . . 1020	murale . . . 1060	Passerina . . . 1103
arvensis . . . 1021	opulifolium . . . 1061	<b>Hippuris</b>
<b>Barkhausia</b>	ficifolium . . . 1062	vulgaris . . . 1106
fetida . . . 1022	Scoparium . . . 1063	<b>Thesium</b>
taraxacifolia . . . 1023	<b>Blitum</b>	pratense . . . 1107
<b>Crepis</b>	Bonus-Henricus 1064	<b>Aristolochia</b>
paludosa . . . 1026	rubrum . . . 1065	Clematitis . . . 1109
biennis . . . 1027	<b>Rumex</b>	<b>Euphorbia</b>
virens . . . 1029	scutatus . . . 1066	Lalbyris . . . 1111
<b>Hieracium</b>	Acetosella . . . 1068	Peplus . . . 1113
Pilosella . . . 1030	obtusifolius . . . 1069	helioscopia . . . 1114
Auricula . . . 1031	maritimus . . . 1070	exigua . . . 1115
præaltum . . . 1032	palustris . . . 1071	platyphyllos . . . 1118
cæspitosum . . . 1033	conglomeratus 1072	stricta . . . 1119
murorum . . . 1034	sanguineus . . . 1073	Gerardiana . . . 1120
vulgatum . . . 1035	crispus . . . 1074	Esula . . . 1122
tridentatum . . . 1036	Patentia . . . 1075	<b>Mercurialis</b>
boreale . . . 1038	hydrolapathum 1076	annua . . . 1123
umbellatum . . . 1039	maximus . . . 1077	<b>Callitriche</b>
<b>Xanthium</b>	<b>Polygonum</b>	slagnalis . . . 1126
strumarium . . . 1040	cuspidatum . . . 1078	vernalis . . . 1127
<b>Amaranthus</b>	Bistorta . . . 1079	hamulata . . . 1128
Blitum . . . 1041	amphibium . . . 1080	<b>Ceratophyllum</b>
retroflexus . . . 1042	lapathifolium . . . 1081	demersum . . . 1129
caudatus . . . 1043	Persicaria . . . 1082	<b>Allisma</b>
paniculatus . . . 1044	mite . . . 1083	Plantago . . . 1185
	minus . . . 1084	natans . . . 1186

<b>Sagittaria</b>		<b>Cephalanthera</b>		<b>Juncus</b>	
sagittifolia . . .	1187	Xylophyllum . . .	1270	supinus . . .	1312
<b>Butomus</b>		rubra . . .	1271	squarrosus . . .	1313
umbellatus . . .	1188	<b>Epipactis</b>		compressus . . .	1314
<b>Allium</b>		latifolia . . .	1272	Tenageia . . .	1315
bulbiforme . . .	1193	palustris . . .	1273	bufonius . . .	1316
candidum . . .	1194	<b>Spiranthes</b>		<b>Luzula</b>	
<b>Allium</b>		æstivalis . . .	1276	angustifolia . . .	1318
sativum . . .	1203	<b>Triglochin</b>		<b>Carex</b>	
Ophioscorodon . . .	1206	palustris . . .	1278	pulicaris . . .	1322
Porum . . .	1207	<b>Potamogeton</b>		<b>Rhynchospora</b>	
rotundum . . .	1208	natans . . .	1279	alba . . .	1366
sphærocephalum . . .	1209	polygonifolius . . .	1280	<b>Helicoharis</b>	
vineale . . .	1210	fluitans . . .	1281	palustris . . .	1367
oleraceum . . .	1211	alpinus . . .	1282	acicularis . . .	1368
complanatum . . .	1212	gramineus . . .	1283	<b>Scirpus</b>	
carinatum . . .	1213	heterophyllus $\beta$ . . .	1283	pauciflorus . . .	1369
Schoenoprasum . . .	1214	lucens . . .	1284	cæspitosus . . .	1370
Ascalonicum . . .	1215	perfoliatus . . .	1285	setaceus . . .	1371
Cepa . . .	1216	crispus . . .	1286	lacustris . . .	1372
fistulosum . . .	1217	densus . . .	1287	Polichii . . .	1373
<b>Phalangium</b>		compressus . . .	1288	maritimus . . .	1374
ramosum . . .	1219	obtusifolius . . .	1289	silvaticus . . .	1375
<b>Narthecium</b>		pusillum . . .	1290	compressus . . .	1376
ossifragum . . .	1221	pectinatus . . .	1291	<b>Cyperus</b>	
<b>Hemerocallis</b>		<b>Zanulichella</b>		flavescens . . .	1381
fulva . . .	1223	palustris . . .	1292	fuscus . . .	1382
<b>Asparagus</b>		<b>Arum</b>		<b>Zea</b>	
officinalis . . .	1224	maculatum . . .	1298	Mays . . .	1383
<b>Loroglossum</b>		<b>Calla</b>		<b>Phalaris</b>	
hircinum . . .	1240	palustris . . .	1299	canariensis . . .	1387
<b>Orcis</b>		<b>Acorus</b>		<b>Baldingera</b>	
laxiflora . . .	1251	Calamus . . .	1300	arundinacea . . .	1388
latifolia . . .	1253	<b>Thypha</b>		<b>Opismenus</b>	
<b>Hernium</b>		latifolia . . .	1301	Crus-galli . . .	1389
Monorchis . . .	1260	angustifolia . . .	1302	<b>Digitaria</b>	
<b>Gymnadenia</b>		<b>Sparganium</b>		sanguinalis . . .	1390
conopsea . . .	1261	ramosum . . .	1303	filiiformis . . .	1391
albida . . .	1263	simplex . . .	1304	<b>Setaria</b>	
viridis . . .	1264	<b>Juncus</b>		verticillata . . .	1392
<b>Platanthera</b>		conglomeratus . . .	1305	viridis . . .	1393
chlorantha . . .	1266	effusus . . .	1306	glauca . . .	1394
<b>Epipogon</b>		glaucus . . .	1307	italica . . .	1395
aphyllus . . .	1267	filiiformis . . .	1308	<b>Panicum</b>	
<b>Limodorum</b>		silvaticus . . .	1309	miliacum . . .	1396
abortivum . . .	1268	lamprocarpus . . .	1310	<b>Alopecurus</b>	
		obtusiflorus . . .	1311	agrestis . . .	1397

<b>Alopecurus</b>		<b>Sieglingia</b>		<b>Bromus</b>	
fulvus . . .	1400	decumbens . . .	1435	arduennensis . . .	1474
geniculatus . . .	1401	<b>Koeleria</b>		Schraderi . . .	1475
<b>Phleum</b>		eristata . . .	1437	<b>Festuca</b>	
pratense . . .	1402	<b>Phragmites</b>		bræmoides . . .	1477
Boehmeri . . .	1403	communis . . .	1438	sciuroides . . .	1478
<b>Agrostis</b>		<b>Cyperium</b>		Pseudo-Myuros . . .	1479
vulgaris . . .	1404	argentum . . .	1439	rubra . . .	1480
alba . . .	1405	<b>Cynosurus</b>		heterophylla . . .	1481
canina . . .	1406	eristatus . . .	1440	duriuscula . . .	1482
<b>Apera</b>		<b>Melica</b>		ovina . . .	1483
Spica-venti . . .	1407	ciliata . . .	1441	elatior . . .	1484
interrupta . . .	1408	<b>Molinia</b>		loliacea . . .	1485
<b>Calamagrostis</b>		caerulea . . .	1444	arundinacea . . .	1486
lanceolata . . .	1409	<b>Catabrosa</b>		silvatica . . .	1487
epiguos . . .	1410	aqualica . . .	1445	gigantea . . .	1488
arundinacea . . .	1411	<b>Glyceria</b>		<b>Brachypodium</b>	
varia . . .	1412	fluitans . . .	1446	silvaticum . . .	1489
<b>Milium</b>		plicata . . .	1447	pinnatum . . .	1490
effusum . . .	1413	aquatica . . .	1448	<b>Lolium</b>	
<b>Wiegandtia</b>		maritima . . .	1449	perenne . . .	1491
canescens . . .	1416	<b>Briza</b>		italicum . . .	1492
<b>Deschampsia</b>		media . . .	1450	multiflorum . . .	1493
cæspitosa . . .	1419	<b>Poa</b>		temulentum . . .	1494
flexuosa . . .	1420	annua . . .	1453	remotum . . .	1495
discolor . . .	1421	memoralis . . .	1455	<b>Hordeum</b>	
<b>Avena</b>		serotina . . .	1456	murinum . . .	1496
brevis . . .	1422	Chaixii . . .	1457	secalinum . . .	1497
saliva . . .	1423	trivialis . . .	1458	distichum . . .	1498
orientalis . . .	1424	pratensis . . .	1459	zeocriton . . .	1499
strigosa . . .	1425	compressa . . .	1460	vulgare . . .	1500
nuda . . .	1426	<b>Dactylis</b>		hexastichon . . .	1501
fatua . . .	1427	glomerata . . .	1461	<b>Elymus</b>	
barbata . . .	1428	<b>Bromus</b>		europæus . . .	1502
pratensis . . .	1430	sterilis . . .	1462	<b>Triticum</b>	
flavescens . . .	1431	lectorum . . .	1463	vulgare . . .	1504
<b>Arrhenantherum</b>		asper . . .	1464	durum . . .	1505
elatius . . .	1432	inermis . . .	1466	turgidum . . .	1506
<b>Holcus</b>		arvensis . . .	1467	Spelta . . .	1507
lanatus . . .	1433	patulus . . .	1468	monococcum . . .	1508
mollis . . .	1434	secalinus . . .	1472	repens . . .	1509
saccharatus . . .	1435	grossus . . .	1473	caninum . . .	1510

## AOUT.

<b>Clematis</b>		<b>Thalictrum</b>		<b>Thalictrum</b>	
Vitalba . . .	1	saxatile $\beta$ . . .	3	majus . . .	4

<b>Thalicttrum</b>		<b>Spergula</b>		<b>Malva</b>	
elatum $\beta$ . . . . .	4	arvensis . . . . .	80	Alcea . . . . .	129
flavum . . . . .	5	<b>Sagina</b>		moschata . . . . .	130
<b>Adonis</b>		procumbens . . . . .	82	silvestris . . . . .	131
flammea . . . . .	13	apetala . . . . .	83	rotundifolia . . . . .	132
<b>Ranunculus</b>		saxatilis $\beta$ . . . . .	83	crispa . . . . .	133
hederaceus . . . . .	15	ciliata . . . . .	84	<b>Altea</b>	
trichophyllus . . . . .	18	depressa $\beta$ . . . . .	84	officinalis . . . . .	134
fluitans . . . . .	19	<b>Alsine</b>		hirsuta . . . . .	135
sceleratus . . . . .	21	tenuifolia . . . . .	85	rosea . . . . .	136
Flammula . . . . .	23	<b>Arenaria</b>		<b>Hibiscus</b>	
Lingua . . . . .	24	serpyllifolia . . . . .	89	Trionum . . . . .	137
repens . . . . .	29	<b>Stellaria</b>		<b>Monotropa</b>	
bulbosus . . . . .	30	media . . . . .	91	hypopitys . . . . .	154
sardous . . . . .	31	graminea . . . . .	94	<b>Hypericum</b>	
parvulus $\beta$ . . . . .	31	uliginosa . . . . .	95	perforatum . . . . .	155
<b>Nigella</b>		<b>Cerastium</b>		humifusum . . . . .	156
arvensis . . . . .	40	cæspitosum . . . . .	96	tetrapterum . . . . .	158
<b>Delphinium</b>		<b>Malachium</b>		pulchrum . . . . .	159
Consolida . . . . .	44	aquaticum . . . . .	104	montanum . . . . .	160
<b>Gypsophila</b>		<b>Linum</b>		hirsutum . . . . .	161
muralis . . . . .	52	catharticum . . . . .	106	<b>Drosera</b>	
<b>Dianthus</b>		tenuifolium . . . . .	107	rotundifolia . . . . .	162
prolifer . . . . .	53	usitatissimum . . . . .	108	longifolia . . . . .	163
Armeria . . . . .	54	<b>Radiola</b>		<b>Parnassia</b>	
Carthusianorum . . . . .	55	linoides . . . . .	109	palustris . . . . .	164
Caryophyllus . . . . .	56	<b>Oxalis</b>		<b>Reseda</b>	
deltoides . . . . .	58	stricta . . . . .	111	luteola . . . . .	167
glaucus $\beta$ . . . . .	58	<b>Ruta</b>		lutea . . . . .	168
plumarius . . . . .	60	graveolens . . . . .	112	odorata . . . . .	169
<b>Cucubalus</b>		<b>Impatiens</b>		<b>Nuphar</b>	
baccifer . . . . .	63	noli-tangere . . . . .	114	luteum . . . . .	170
<b>Silene</b>		Balsamina . . . . .	115	<b>Nymphaea</b>	
inflata . . . . .	64	<b>Geranium</b>		alba . . . . .	171
noctiflora . . . . .	69	pratense . . . . .	118	<b>Papaver</b>	
Armeria . . . . .	70	palustre . . . . .	119	somniaferum . . . . .	172
<b>Melandryum</b>		sanguineum . . . . .	120	Rheas . . . . .	173
silvestre . . . . .	71	columbinum . . . . .	121	Argemone . . . . .	175
pratense . . . . .	72	dissectum . . . . .	122	dubium . . . . .	176
<b>Lychnis</b>		molle . . . . .	123	Lecoquii . . . . .	177
chalconica . . . . .	73	pusillum . . . . .	124	<b>Chelidonium</b>	
Flos-Cuculi . . . . .	74	rotundifolium . . . . .	125	majus . . . . .	178
tomentosa . . . . .	75	Robertianum . . . . .	126	<b>Glaucium</b>	
Githago . . . . .	77	<b>Erodium</b>		flavum . . . . .	179
<b>Spergularia</b>		Cicutarium . . . . .	127	<b>Eschscholtzia</b>	
rubra . . . . .	79	pimpinellaefolium . . . . .	128	californica . . . . .	180

<b>Corydalis</b>		<b>Viola</b>		<b>Eryum</b>	
<i>lutea</i> . . . . .	182	<i>tricolor</i> . . . . .	270	<i>hirsutum</i> . . . . .	340
<b>Fumaria</b>		<i>Altaica</i> . . . . .	271	<i>tetraspermum</i> . . . . .	341
<i>officinalis</i> . . . . .	183	<i>elatior</i> . . . . .	272	<i>gracile</i> . . . . .	342
<i>tenuifolia</i> . . . . .	184	<i>rothomagensis</i> , . . . . .	273	<b>Faba</b>	
<i>parviflora</i> . . . . .	186	<i>intermedia</i> , . . . . .	274	<i>vulgaris</i> . . . . .	346
<i>capreolata</i> , . . . . .	187	<b>Lupinus</b>		<b>Lathyrus</b>	
<b>Nasturtium</b>		<i>luteus</i> . . . . .	284	<i>Aphaca</i> . . . . .	349
<i>officinale</i> . . . . .	204	<i>angustifolius</i> . . . . .	285	<i>Nissolia</i> . . . . .	350
<i>silvestre</i> . . . . .	205	<b>Ononis</b>		<i>sativus</i> . . . . .	351
<i>palustre</i> . . . . .	207	<i>spinosa</i> . . . . .	287	<i>hirsutus</i> . . . . .	352
<b>Sisymbrium</b>		<i>repens</i> . . . . .	288	<i>tuberosus</i> . . . . .	353
<i>officinale</i> . . . . .	211	<b>Lotus</b>		<i>pratensis</i> . . . . .	354
<i>Sophia</i> . . . . .	212	<i>corniculatus</i> . . . . .	290	<i>silvestris</i> . . . . .	355
<b>Braya</b>		<i>uliginosus</i> . . . . .	291	<i>odoratus</i> . . . . .	356
<i>supina</i> . . . . .	213	<b>Galega</b>		<i>latifolius</i> . . . . .	357
<b>Erysimum</b>		<i>officinalis</i> . . . . .	295	<b>Coronilla</b>	
<i>cheiranthoides</i> , . . . . .	214	<b>Mellilotus</b>		<i>varia</i> . . . . .	362
<b>Diploxys</b>		<i>arvensis</i> . . . . .	298	<b>Ornithopus</b>	
<i>tenuifolia</i> . . . . .	219	<i>macrorrhiza</i> . . . . .	299	<i>perpusillus</i> . . . . .	363
<b>Brassica</b>		<i>leucantha</i> . . . . .	300	<i>sativus</i> . . . . .	364
<i>nigra</i> . . . . .	225	<i>alba</i> . . . . .	301	<b>Lythrum</b>	
<b>Sinapis</b>		<b>Medicago</b>		<i>salicaria</i> . . . . .	367
<i>arvensis</i> . . . . .	226	<i>lupulina</i> . . . . .	304	<i>hyssopifolia</i> . . . . .	368
<i>Cheiranthus</i> . . . . .	228	<i>Willdenowii</i> $\beta$ . . . . .	304	<b>Peplis</b>	
<b>Raphanus</b>		<i>falcata</i> . . . . .	305	<i>Portula</i> . . . . .	369
<i>Raphanistrum</i> , . . . . .	229	<i>sativa</i> . . . . .	306	<b>Portulaca</b>	
<b>Berteroa</b>		<i>falcato-sativa</i> , . . . . .	307	<i>oleracea</i> . . . . .	370
<i>incana</i> . . . . .	236	<i>Echinus</i> . . . . .	309	<i>sativa</i> . . . . .	371
<b>Camellina</b>		<b>Trifolium</b>		<b>Montia</b>	
<i>dentata</i> . . . . .	243	<i>filiforme</i> . . . . .	312	<i>rivularis</i> . . . . .	373
<b>Thlaspi</b>		<i>procumbens</i> . . . . .	313	<b>Corrigiola</b>	
<i>arvense</i> . . . . .	245	<i>pratense</i> . . . . .	316	<i>litoralis</i> . . . . .	374
<b>Iberis</b>		<i>sativum</i> $\beta$ , . . . . .	316	<b>Herniaria</b>	
<i>amara</i> . . . . .	249	<i>medium</i> . . . . .	317	<i>glabra</i> . . . . .	375
<b>Capsella</b>		<i>alpestre</i> . . . . .	318	<i>hirsuta</i> . . . . .	376
<i>Bursa pastoris</i> , . . . . .	250	<i>arvense</i> . . . . .	322	<b>Scleranthus</b>	
<b>Lepidium</b>		<i>repens</i> . . . . .	325	<i>annuus</i> . . . . .	377
<i>sativum</i> . . . . .	251	<i>hybridum</i> . . . . .	326	<i>perennis</i> . . . . .	378
<i>graminifolium</i> , . . . . .	253	<i>fragiferum</i> , . . . . .	327	<b>Sedum</b>	
<i>ruderales</i> . . . . .	254	<b>Phaseolus</b>		<i>boloniense</i> . . . . .	382
<b>Senebiera</b>		<i>vulgaris</i> . . . . .	328	<i>reflexum</i> . . . . .	383
<i>Coronopus</i> , . . . . .	256	<i>multiflorum</i> . . . . .	329	<i>glaucescens</i> $\beta$ , . . . . .	383
<b>Helianthemum</b>		<b>Viola</b>		<i>album</i> . . . . .	386
<i>Chamaecistus</i> . . . . .	260	<i>Cracca</i> . . . . .	332	<i>maximum</i> . . . . .	387
<i>serpyllifolium</i> $\gamma$ . . . . .	260	<i>tenuifolia</i> . . . . .	333	<i>purpurascens</i> . . . . .	388
<i>polifolium</i> . . . . .	261	<i>sativa</i> . . . . .	337		

<b>Sempervivum</b>		<b>Hydrocotyle</b>		<b>Anethum</b>	
tectorum . . .	389	vulgaris . . .	512	graveolens . . .	549
<b>Spiraea</b>		<b>Eryngium</b>		<b>Pastinaca</b>	
salicifolia . . .	404	campestris. . .	515	silvestris . . .	550
hypericifolia . . .	405	<b>Bupleurum</b>		sativa . . .	551
<b>Kerria</b>		rotundifolium. . .	516	<b>Heracleum</b>	
japonica . . .	407	falcatum . . .	517	Spondylium. . .	552
<b>Potentilla</b>		<b>Falcaria</b>		<b>Tordylium</b>	
reptans . . .	448	vulgaris . . .	518	maximum . . .	553
alpestris . . .	449	<b>Aegopodium</b>		<b>Laserpitium</b>	
Anserina . . .	450	Podagraria . . .	519	latifolium . . .	554
supina . . .	452	<b>Petroselinum</b>		<b>Daucus</b>	
<b>Tormentilla</b>		sativum . . .	522	Carota . . .	555
silvestris . . .	456	<b>Apium</b>		<b>Oxleya</b>	
<b>Agrimonia</b>		graveolens. . .	523	grandiflora . . .	556
Eupatoria . . .	470	<b>Sium</b>		<b>Torilis</b>	
canescens $\beta$ . . .	470	latifolium . . .	526	Anthriscus . . .	560
odorata . . .	471	angustifolium. . .	527	infesta . . .	561
<b>Alchemilla</b>		<b>Pimpinella</b>		nodosa . . .	562
arvensis . . .	473	magna . . .	528	<b>Anthriscus</b>	
<b>Sanguisorba</b>		saxifraga . . .	529	Cerefolium . . .	563
officinalis . . .	474	Anisum . . .	530	<b>Cherophyllum</b>	
<b>Poterium</b>		<b>Achusa</b>		bulbosum . . .	566
dictyocarpum . . .	475	cynapium . . .	531	hirsutum . . .	567
<b>Calycanthus</b>		<b>Oenanthe</b>		<b>Myrrhis</b>	
floridus . . .	494	Phellandrium . . .	534	odorata . . .	568
<b>Epilobium</b>		<b>Libanotis</b>		<b>Conium</b>	
angustifolium . . .	495	montana . . .	535	maculatum . . .	570
hirsutum . . .	496	<b>Seseli</b>		<b>Erica</b>	
parviflorum . . .	497	annuum . . .	536	Tetralix . . .	586
montanum . . .	499	montanum. . .	537	<b>Calluna</b>	
roseum . . .	500	<b>Feniculum</b>		vulgaris . . .	587
tetragonum . . .	501	officinale . . .	538	<b>Lysimachia</b>	
obscurum . . .	502	<b>Silaus</b>		Nummularia . . .	592
palustre . . .	503	pratensis . . .	540	punctata . . .	594
<b>Oenanthera</b>		<b>Selinum</b>		<b>Centunculus</b>	
biennis . . .	504	carvifolium . . .	542	minimus . . .	596
<b>Isardella</b>		<b>Angelica</b>		<b>Anagallis</b>	
palustris . . .	505	silvestris . . .	543	arvensis . . .	597
<b>Circea</b>		<b>Archangelica</b>		<b>Armeria</b>	
lutetiana . . .	506	officinalis . . .	544	elongata . . .	598
intermedia. . .	507	<b>Peucedanum</b>		<b>Plantago</b>	
<b>Myriophyllum</b>		Chabraei . . .	545	major . . .	599
verticillatum . . .	509	Cervaria . . .	546	intermedia $\beta$ . . .	599
spicatum . . .	510	palustre . . .	547	minima $\gamma$ . . .	599
alternifolium . . .	511	Oreoselinum . . .	548	media . . .	600
				lanceolata . . .	601

<b>Plantago</b>		<b>Solanum</b>		<b>Linaria</b>	
areuaria . . .	602	Dulcamara . . .	658	minor . . .	713
<b>Vincetoxicum</b>		nigrum . . .	659	arvensis . . .	714
officinale . . .	612	tuberosum . . .	660	simplex . . .	715
<b>Aselepias</b>		<b>Physalis</b>		striata . . .	716
syriaca . . .	613	Alkekengi . . .	663	<b>Cymbalaria.</b>	717
<b>Limnanthemum</b>		<b>Atropa</b>		Elatine . . .	718
nymphæoides .	615	Belladona . . .	664	spuria . . .	719
<b>Gentiana</b>		<b>Lycium</b>		<b>Pedicularis</b>	
eruciata . . .	616	barbarum . . .	665	palustris . . .	720
Pneumonanthe	617	<b>Nicotiana</b>		silvatica . . .	721
campestris . .	618	rustica . . .	666	<b>Rhinanthus</b>	
germanica . . .	619	<b>Datura</b>		major . . .	722
Amarella . . .	620	Stramonium . .	667	Alectorolophus.	724
ciliata . . .	621	<b>Verbascum</b>		angustifolius .	725
acaulis . . .	622	Thapsus . . .	669	<b>Melampyrum</b>	
<b>Cicendia</b>		thapsiforme . .	670	cristatum . . .	726
filiformis . . .	623	phlomidoides . .	671	arvense . . .	727
<b>Eriothrea</b>		pulverulentum .	673	pratense . . .	728
Centaurium . .	624	floccosum . . .	674	<b>Euphrasia</b>	
pulehella . . .	625	Lychnitis . . .	675	officinalis . . .	729
<b>Convolvulus</b>		nigrum . . .	676	nemorosa . . .	730
arvensis . . .	627	nigro-floccosum	677	<b>Odontites</b>	
sepium . . .	628	<b>Veronica</b>		serotina . . .	732
<b>Cuscuta</b>		scutellata . . .	678	<b>Utricularia</b>	
suaveoleus . .	629	Anagallis . . .	679	vulgaris . . .	734
Epilinum . . .	630	Beccabunga . . .	680	<b>Phelipæa</b>	
major . . .	631	serpyllifolia . .	686	ramosa . . .	736
Epitymum . . .	632	arvensis . . .	689	<b>Lavandula</b>	
<b>Borago</b>		agrestis . . .	690	vera . . .	745
officinalis . . .	633	<b>Limosella</b>		<b>Ocimum</b>	
<b>Lycopsis</b>		aquatica . . .	698	Basilicum . . .	746
arvensis . . .	635	<b>Scrophularia</b>		<b>Mentha</b>	
<b>Myosotis</b>		nodosa . . .	699	silvestris . . .	747
palustris . . .	637	Neesii . . .	701	rotundifolia . .	748
cæspitosa . . .	639	aquatica . . .	702	viridis . . .	749
intermedia . .	641	<b>Gratiola</b>		pubescens . . .	751
<b>Lithospermum</b>		officinalis . . .	704	piperita . . .	752
purpureo-cæruleum	647	<b>Digitalis</b>		aquatica . . .	753
arvense . . .	648	purpurea . . .	705	arvensis . . .	754
<b>Pulmonaria</b>		purpureo-lutea .	707	Pulegium . . .	755
angustifolia . .	650	ambigua . . .	708	<b>Lycopus</b>	
<b>Echium</b>		<b>Anthirrhium</b>		europæus . . .	756
vulgare . . .	652	Orontium . . .	710	<b>Salvia</b>	
<b>Heliotropium</b>		majus . . .	711	pratensis . . .	758
europæum . . .	657	<b>Linaria</b>		Sclarea . . .	759
		vulgaris . . .	712		

<b>Origanum</b>		<b>Leonurus</b>		<b>Sherardia</b>	
vulgare . . .	761	Cardiaca . . .	797	arvensis . . .	849
Majorana . . .	762	Marrubiastrum	798	<b>Asperula</b>	
<b>Thymus</b>		<b>Brunella</b>		arvensis . . .	850
Serpyllum . . .	763	vulgaris . . .	799	Cynanchica . . .	852
Chamædrys . . .	764	grandiflora . . .	800	<b>Galium</b>	
<b>Hyssopus</b>		alba . . .	801	verum . . .	855
officinalis . . .	766	<b>Scutellaria</b>		silvaticum . . .	856
<b>Calamintha</b>		galericulata . . .	802	saxatile . . .	860
Acinos . . .	767	minor . . .	803	uliginosum . . .	862
officinalis . . .	768	<b>Ajuga</b>		Aparine . . .	863
grandiflora . . .	769	genevensis . . .	806	tricorne . . .	864
<b>Clinopodium</b>		Chamæpitys . . .	807	<b>Centranthus</b>	
vulgare . . .	770	<b>Tencrium</b>		ruber . . .	865
<b>Melissa</b>		Scorodonia . . .	808	<b>Valeriana</b>	
officinalis . . .	771	Botrys . . .	809	officinalis . . .	866
<b>Satureia</b>		Scordium . . .	810	<b>Valerianella</b>	
hortensis . . .	772	Chamædrys . . .	811	auricula . . .	871
<b>Nepeta</b>		montanum . . .	812	Morisonii . . .	872
Cataria . . .	773	<b>Verbena</b>		coronata . . .	874
<b>Lamium</b>		officinalis . . .	313	<b>Scabiosa</b>	
amplexicaule . . .	775	<b>Campanula</b>		Columbaria . . .	876
incisum . . .	776	Rapunculus . . .	817	Succisa . . .	877
purpureum . . .	777	persicæfolia . . .	818	atropurpurea . . .	878
album . . .	778	pyramidalis . . .	819	<b>Knautia</b>	
maculatum . . .	779	rotundifolia . . .	820	arvensis . . .	879
<b>Galeopsis</b>		rapunculoides . . .	821	<b>Dipsacus</b>	
Tetrahit . . .	781	Trachelium . . .	822	silvestris . . .	881
speciosa . . .	782	Medium . . .	823	Fullonum . . .	882
ochroleuca . . .	783	glomerata . . .	824	pilosus . . .	883
intermedia . . .	784	Cervicaria . . .	825	<b>Onopordon</b>	
Ladanum . . .	785	<b>Specularia</b>		Acanthium . . .	884
<b>Stachys</b>		speculum . . .	827	<b>Carlina</b>	
germanica . . .	786	<b>Phyteuma</b>		vulgare . . .	885
alpina . . .	787	orbiculare . . .	829	<b>Cinara</b>	
silvatica . . .	788	<b>Jasione</b>		scolymus . . .	886
ambigua . . .	789	montana . . .	831	<b>Cirsium</b>	
palustris . . .	790	perennis . . .	832	lanceolatum . . .	887
arvensis . . .	791	<b>Cucurbita</b>		eriphorum . . .	888
annua . . .	792	maxima . . .	837	palustre . . .	889
recta . . .	793	Pepo . . .	838	acaule . . .	890
<b>Betonica</b>		<b>Sambucus</b>		arvense . . .	891
officinalis . . .	794	Ebulus . . .	840	oleraceum . . .	892
<b>Marrubium</b>		<b>Lonicera</b>		<b>Carduus</b>	
vulgare . . .	795	Periclymenum . . .	846	tenuiflorus . . .	893
<b>Ballota</b>		<b>Simphoria</b>		crispus . . .	895
nigra . . .	796	racemosa . . .	848	nutans . . .	896



<b>Silybum</b>		<b>Bellis</b>		<b>Einosyris</b>	
marianum . . .	898	perennis . . .	934	vulgaris . . .	970
<b>Lappa</b>		<b>Artemisia</b>		<b>Senecio</b>	
officinalis . . .	899	vulgaris . . .	936	vulgaris . . .	973
glabra . . .	900	Absinthium . . .	937	viscosus . . .	974
racemosa . . .	901	campestris. . .	938	silvaticus . . .	975
tomentosa . . .	902	pontica . . .	939	crucifolius . . .	976
<b>Serratula</b>		<b>Tanacetum</b>		Jacobaea . . .	977
lincetoria . . .	903	vulgare . . .	940	aquaticus . . .	978
<b>Centaurea</b>		Balsamita . . .	941	nemorensis . . .	979
Calcitrapa . . .	904	<b>Tajetes</b>		Sarracenicus . . .	980
solstitialis . . .	905	patula . . .	942	Fuchsii . . .	981
Cyanus . . .	906	<b>Calendula</b>		ovatus . . .	982
montana . . .	907	arvensis . . .	943	<b>Dahlia</b>	
Scabiosa . . .	908	officinalis . . .	944	variabilis . . .	983
maculosa . . .	909	<b>Micropus</b>		<b>Eupatorium</b>	
Jacea . . .	910	erectus . . .	945	cannabinum. . .	984
nigrescens . . .	911	<b>Helichrysum</b>		<b>Lampsana</b>	
phrygia . . .	912	arenarium. . .	946	communis . . .	987
nigra . . .	913	<b>Guaphallum</b>		<b>Arnoseris</b>	
<b>Echinops</b>		silvaticum. . .	947	minima . . .	988
spærocephalus. . .	914	luteo-album . . .	948	<b>Cichorium</b>	
<b>Bidens</b>		uliginosum . . .	949	Intybus . . .	989
tripartitus. . .	915	<b>Filago</b>		Endivia . . .	990
cernua . . .	916	germanica. . .	951	<b>Hypochoeris</b>	
<b>Helianthus</b>		gallica . . .	952	glabra . . .	991
annuus . . .	917	minima . . .	953	radicata . . .	992
<b>Madia</b>		arvensis . . .	954	<b>Thrinacia</b>	
sativa . . .	920	<b>Pulicaria</b>		hirta . . .	994
<b>Achillea</b>		dysenterica . . .	955	<b>Leontodon</b>	
Millefolium . . .	921	vulgaris . . .	956	hispidus . . .	995
Ptarmica . . .	922	<b>Inula</b>		autumnalis . . .	997
<b>Ormenis</b>		Conyza . . .	957	<b>Pieris</b>	
nobilis . . .	923	salicina . . .	958	hieracioides. . .	998
<b>Anthemis</b>		britannica . . .	959	<b>Helminthia</b>	
arvensis . . .	924	<b>Solidago</b>		echioides . . .	999
Cotula . . .	925	Virga-aurea . . .	960	<b>Tragopogon</b>	
tinctoria . . .	926	canadensis. . .	961	pratensis . . .	1003
<b>Matricaria</b>		<b>Erigeron</b>		<b>Podospermum</b>	
inodora . . .	928	acre . . .	962	laciniatum . . .	1006
<b>Pyrethrum</b>		canadense . . .	963	muricatum . . .	1008
Leucanthemum . . .	929	<b>Stenaetis</b>		<b>Taraxacum</b>	
Parthenium . . .	930	arvensis . . .	964	officinale . . .	1009
corymbosum . . .	931	<b>Aster</b>		paludosum . . .	1010
<b>Chrysanthemum</b>		Amellus . . .	965	<b>Chondrilla</b>	
segetum . . .	933	leucanthemus. . .	967	juncea . . .	1011
		sinensis . . .	969		

<b>Prenanthes</b>		<b>Chenopodium</b>		<b>Parietaria</b>	
<i>purpurea</i> . . .	1012	<i>hybridum</i> . . .	1057	<i>ramiflora</i> . . .	1101
<b>Lactuca</b>		<i>glaucum</i> . . .	1058	<b>Thymelæa</b>	
<i>muralis</i> . . .	1013	<i>urbicum</i> . . .	1059	<i>Passerina</i> . . .	1103
<i>Scariola</i> . . .	1016	<i>murale</i> . . .	1060	<b>Hippuris</b>	
<i>sativa</i> . . .	1017	<i>opulifolium</i> . . .	1061	<i>vulgaris</i> . . .	1106
<i>virosa</i> . . .	1018	<i>ficifolium</i> . . .	1062	<b>Aristolochia</b>	
<b>Sonchus</b>		<i>Scoparium</i> . . .	1063	<i>Clematitis</i> . . .	1109
<i>oleraceus</i> . . .	1019	<b>Rilium</b>		<b>Euphorbia</b>	
<i>asper</i> . . .	1020	<i>Bonus-Henricus</i> . . .	1064	<i>Peplus</i> . . .	1113
<i>arvensis</i> . . .	1021	<i>rubrum</i> . . .	1065	<i>helioscopia</i> . . .	1114
<b>Barkhausia</b>		<b>Rumex</b>		<i>exigua</i> . . .	1115
<i>fœtida</i> . . .	1022	<i>scutatus</i> . . .	1066	<i>platyphyllos</i> . . .	1118
<b>Crepis</b>		<i>Acetosella</i> . . .	1068	<i>Gerardiana</i> . . .	1120
<i>paludosa</i> . . .	1026	<i>obtusifolius</i> . . .	1069	<i>Esula</i> . . .	1122
<i>virens</i> . . .	1029	<i>maritimus</i> . . .	1070	<b>Mercurialis</b>	
<b>Hieracium</b>		<i>palustris</i> . . .	1071	<i>annua</i> . . .	1123
<i>Pilosella</i> . . .	1030	<i>conglomeratus</i> . . .	1072	<b>Callitriche</b>	
<i>Auricula</i> . . .	1031	<i>sanguineus</i> . . .	1073	<i>stagnalis</i> . . .	1126
<i>murorum</i> . . .	1034	<i>crispus</i> . . .	1074	<i>vernalis</i> . . .	1127
<i>sabaudum</i> . . .	1037	<i>Patientia</i> . . .	1075	<i>hamulata</i> . . .	1128
<i>boreale</i> . . .	1038	<i>hydrolpathum</i> . . .	1076	<b>Ceratophyllum</b>	
<i>umbellatum</i> . . .	1039	<i>maximus</i> . . .	1077	<i>demersum</i> . . .	1129
<b>Xanthium</b>		<b>Polygonum</b>		<b>Alisma</b>	
<i>strumarium</i> . . .	1040	<i>cuspidatum</i> . . .	1078	<i>Plantago</i> . . .	1185
<b>Amaranthus</b>		<i>amphibium</i> . . .	1080	<i>natans</i> . . .	1186
<i>Blitum</i> . . .	1041	<i>laphifolium</i> . . .	1081	<b>Sagittaria</b>	
<i>retroflexus</i> . . .	1042	<i>Persicaria</i> . . .	1082	<i>sagittæfolia</i> . . .	1187
<i>caudatus</i> . . .	1043	<i>mite</i> . . .	1083	<b>Butomus</b>	
<i>paniculatus</i> . . .	1044	<i>minus</i> . . .	1084	<i>umbellatus</i> . . .	1188
<b>Polycnemum</b>		<i>Hydropiper</i> . . .	1085	<b>Lilium</b>	
<i>aryense</i> . . .	1045	<i>aviculare</i> . . .	1086	<i>bulbiferum</i> . . .	1193
<b>Atriplex</b>		<i>Bellardi</i> . . .	1087	<b>Allium</b>	
<i>hortense</i> . . .	1046	<i>Convolvulus</i> . . .	1088	<i>sativum</i> . . .	1205
<i>nitens</i> . . .	1047	<i>dumetorum</i> . . .	1089	<i>Ophioscorodon</i> . . .	1206
<i>tataricum</i> . . .	1048	<b>Fagopyrum</b>		<i>rotundum</i> . . .	1208
<i>hastatum</i> . . .	1049	<i>esculentum</i> . . .	1090	<i>sphærocephalum</i> . . .	1209
<i>patulum</i> . . .	1050	<i>tataricum</i> . . .	1091	<i>carinatum</i> . . .	1213
<b>Spluacia</b>		<b>Cannabis</b>		<b>Nartheclum</b>	
<i>glabra</i> . . .	1051	<i>sativa</i> . . .	1094	<i>ossifragum</i> . . .	1221
<i>oleracea</i> . . .	1052	<b>Humulus</b>		<b>Hemeroallis</b>	
<b>Beta</b>		<i>Lupulus</i> . . .	1095	<i>fulva</i> . . .	1223
<i>vulgaris</i> . . .	1053	<b>Urtica</b>		<b>Epipogon</b>	
<b>Chenopodium</b>		<i>dioica</i> . . .	1098	<i>aphyllus</i> . . .	1267
<i>polyspermum</i> . . .	1054	<i>urens</i> . . .	1099	<b>Epipactis</b>	
<i>Vulvaria</i> . . .	1055	<b>Parietaria</b>		<i>latifolia</i> . . .	1272
<i>album</i> . . .	1056	<i>officinalis</i> . . .	1100		

<b>Spiranthes</b>		<b>Scirpus</b>		<b>Holcus</b>	
<i>æstivalis</i> . . .	1276	<i>setaceus</i> . . .	1371	<i>lanatus</i> . . .	1433
<b>Potamogeton</b>		<i>Polichii</i> . . .	1373	<i>mollis</i> . . .	1434
<i>natans</i> . . .	1279	<i>maritimus</i> . . .	1374	<b>Phragmites</b>	
<i>polygonifolius</i> . . .	1280	<b>Cyperus</b>		<i>communis</i> . . .	1438
<i>fluitans</i> . . .	1281	<i>flavescens</i> . . .	1381	<b>Gynerium</b>	
<i>alpinus</i> . . .	1282	<i>fuscus</i> . . .	1382	<i>argentum</i> . . .	1439
<i>gramineus</i> . . .	1283	<b>Zea</b>		<b>Cynosurus</b>	
<i>heterophyllus</i> $\beta$	1283	<i>Mays</i> . . .	1383	<i>cristatus</i> . . .	1440
<i>lucens</i> . . .	1284	<b>Oryza</b>		<b>Molinia</b>	
<i>perfoliatus</i> . . .	1285	<i>clandestina</i> . . .	1384	<i>cœrulea</i> . . .	1444
<i>crispus</i> . . .	1286	<b>Phalaris</b>		<b>Catabrosa</b>	
<i>densus</i> . . .	1287	<i>canariensis</i> . . .	1387	<i>aqualica</i> . . .	1445
<i>compressus</i> . . .	1288	<b>Opismenus</b>		<b>Glyceria</b>	
<i>obtusifolius</i> . . .	1289	<i>Crus-galli</i> . . .	1389	<i>fluitans</i> . . .	1446
<i>pusillus</i> . . .	1290	<b>Digitaria</b>		<i>aqualica</i> . . .	1448
<i>pectinatus</i> . . .	1291	<i>sanguinalis</i> . . .	1390	<i>maritima</i> . . .	1449
<b>Zannichellia</b>		<i>filiformis</i> . . .	1391	<b>Poa</b>	
<i>palustris</i> . . .	1292	<b>Setaria</b>		<i>annua</i> . . .	1453
<b>Najas</b>		<i>verticillata</i> . . .	1392	<i>nemorialis</i> . . .	1455
<i>major</i> . . .	1293	<i>viridis</i> . . .	1393	<i>serotina</i> . . .	1456
<b>Thypha</b>		<i>glauca</i> . . .	1394	<i>compressa</i> . . .	1460
<i>latifolia</i> . . .	1301	<i>italica</i> . . .	1395	<b>Bromus</b>	
<i>angustifolia</i> . . .	1302	<b>Panicum</b>		<i>tectorum</i> . . .	1463
<b>Sparganium</b>		<i>miliaceum</i> . . .	1396	<b>Brachypodium</b>	
<i>ramosum</i> . . .	1303	<b>Alopecurus</b>		<i>silvaticum</i> . . .	1489
<i>simplex</i> . . .	1304	<i>agrestis</i> . . .	1397	<i>pinnatum</i> . . .	1490
<b>Juncus</b>		<i>fulvus</i> . . .	1400	<b>Lolium</b>	
<i>conglomeratus</i> . . .	1305	<i>geniculatus</i> . . .	1401	<i>perenne</i> . . .	1491
<i>effusus</i> . . .	1306	<b>Calamagrostis</b>		<i>italicum</i> . . .	1492
<i>glaucus</i> . . .	1307	<i>lanceolata</i> . . .	1409	<i>remotum</i> . . .	1495
<i>filiformis</i> . . .	1308	<i>epigeios</i> . . .	1410	<b>Hordeum</b>	
<i>silvaticus</i> . . .	1309	<i>arundinacea</i> . . .	1411	<i>murinum</i> . . .	1496
<i>lamprocarpus</i> . . .	1310	<i>varia</i> . . .	1412	<i>distichum</i> . . .	1498
<i>obtusiflorus</i> . . .	1311	<b>Wingertueria</b>		<i>zeocrithon</i> . . .	1499
<i>supinus</i> . . .	1312	<i>canescens</i> . . .	1416	<i>hexastichon</i> . . .	1501
<i>squarrosus</i> . . .	1313	<b>Deschampsia</b>		<b>Triticum</b>	
<i>compressus</i> . . .	1314	<i>discolor</i> . . .	1421	<i>vulgare</i> . . .	1504
<i>Tenageia</i> . . .	1315	<b>Avena</b>		<i>durum</i> . . .	1505
<i>bufonius</i> . . .	1316	<i>brevis</i> . . .	1422	<i>Spelta</i> . . .	1507
<b>Rhynchospora</b>		<i>sativa</i> . . .	1423	<i>repens</i> . . .	1509
<i>alba</i> . . .	1366	<i>orientalis</i> . . .	1424		
<b>Helicoharis</b>		<i>strigosa</i> . . .	1425		
<i>acicularis</i> . . .	1368	<i>nuda</i> . . .	1426		

## SEPTEMBRE.

<b>Ranunculus</b>		<b>Geranium</b>		<b>Fumaria</b>	
trichophyllus . . .	18	molle . . .	123	capreolata . . .	187
secleratus . . .	21	pusillum . . .	124	<b>Nasturtium</b>	
Flammula . . .	23	rotundifolium . . .	125	officinale . . .	204
repens . . .	29	Robertianum . . .	126	silvestre . . .	205
<b>Gypsophila</b>		<b>Erodium</b>		palustre . . .	207
muralis . . .	52	Cicutarium . . .	127	<b>Sisymbrium</b>	
<b>Dianthus</b>		pimpinellæfolium . . .	128	officinale . . .	211
prolifer . . .	53	<b>Malva</b>		Sophia . . .	212
diminutus $\beta$ . . .	53	Alcea . . .	129	<b>Erysimum</b>	
Armeria . . .	54	moschata . . .	130	cheiranthoides . . .	214
Carthusianorum . . .	55	silvestris . . .	131	<b>Diplotaxis</b>	
deltoides . . .	58	rotundifolia . . .	132	lenuifolia . . .	219
glaucus $\beta$ . . .	58	<b>Altea</b>		<b>Thlaspi</b>	
<b>Saponaria</b>		hirsuta . . .	135	arvense . . .	245
officinalis . . .	61	rosea . . .	136	<b>Iberis</b>	
<b>Silene</b>		<b>Hibiscus</b>		amara . . .	249
inflata . . .	64	Trionum . . .	137	<b>Capsella</b>	
noctiflora . . .	69	syriacus . . .	138	Bursa pastoris . . .	250
Armeria . . .	70	<b>Hypericum</b>		<b>Lepidium</b>	
<b>Melandrym</b>		humifusum . . .	156	graminifolium . . .	253
pratense . . .	72	pulchrum . . .	159	ruderales . . .	254
<b>Spergularia</b>		<b>Parnassia</b>		<b>Senecio</b>	
rubra . . .	79	palustris . . .	164	Coronopus . . .	256
<b>Spergula</b>		<b>Reseda</b>		<b>Hellanthemum</b>	
arvensis . . .	80	luteola . . .	167	Chamaecistus . . .	260
<b>Sagina</b>		lutea . . .	168	<b>Viola</b>	
ciliata . . .	84	odorata . . .	169	tricolor . . .	270
<b>Stellaria</b>		<b>Nuphar</b>		Altaica . . .	271
media . . .	91	luteum . . .	170	elatior . . .	272
uliginosa . . .	95	<b>Nymphaea</b>		rothomagensis . . .	273
<b>Cerastium</b>		alba . . .	171	<b>Ononis</b>	
caespitosum . . .	96	<b>Papaver</b>		spinosa . . .	287
<b>Malachium</b>		sommiferum . . .	172	repens . . .	288
aquaticum . . .	104	Rhoëas . . .	173	<b>Lotus</b>	
<b>Oxalis</b>		dubium . . .	176	corniculatus . . .	290
stricta . . .	111	<b>Chelidonium</b>		uliginosus . . .	291
<b>Ruta</b>		majus . . .	178	<b>Melilotus</b>	
graveolens . . .	112	<b>Eschscholtzia</b>		arvensis . . .	298
<b>Impatiens</b>		californica . . .	180	macrorrhiza . . .	299
Balsamina . . .	115	<b>Corydalis</b>		leucantha . . .	300
<b>Geranium</b>		lutea . . .	182	alba . . .	301
sanguineum . . .	120	<b>Fumaria</b>		<b>Medicago</b>	
columbinum . . .	121	officinalis . . .	183	Iupulina . . .	304
dissectum . . .	122	tenuifolia . . .	184	Willdenowii $\beta$ . . .	304

<b>Medicago</b>		<b>Sanguisorba</b>		<b>Daucus</b>	
falcata . . . . .	305	officinalis . . . . .	474	Carota . . . . .	555
sativa . . . . .	306	<b>Epilobium</b>		<b>Torilis</b>	
falcato-sativa . . . . .	307	parviflorum . . . . .	497	Anthriscus . . . . .	560
<b>Trifolium</b>		roseum . . . . .	500	infesta . . . . .	561
filiforme . . . . .	312	obscurum . . . . .	502	<b>Hedera</b>	
pratense . . . . .	316	palustre . . . . .	503	Helix . . . . .	572
sativum $\beta$ . . . . .	316	<b>Oenanthera</b>		<b>Erica</b>	
repens . . . . .	325	biennis . . . . .	504	Tetralix . . . . .	586
hybridum . . . . .	326	<b>Myriophyllum</b>		<b>Calluna</b>	
fragiferum. . . . .	327	verticillatum . . . . .	509	vulgaris . . . . .	587
<b>Phaseolus</b>		<b>Eryngium</b>		<b>Anagallis</b>	
vulgaris . . . . .	328	campestris. . . . .	515	arvensis . . . . .	597
multiflorum . . . . .	329	<b>Bupleurum</b>		<b>Armeria</b>	
<b>Ervum</b>		falcatum . . . . .	517	elongata . . . . .	598
hirsutum . . . . .	340	<b>Fulcaria</b>		<b>Plantago</b>	
tetraspermum. . . . .	341	vulgaris . . . . .	518	major . . . . .	599
<b>Lathyrus</b>		<b>Apium</b>		intermedia $\beta$ . . . . .	599
hirsutus . . . . .	352	graveolens. . . . .	523	minima $\gamma$ . . . . .	599
odoratus . . . . .	356	<b>Sium</b>		media . . . . .	600
<b>Lythrum</b>		latifolium . . . . .	526	lanceolata . . . . .	601
salicaria . . . . .	367	angustifolium. . . . .	527	<b>Limnanthemum</b>	
<b>Peplis</b>		<b>Pimpinella</b>		nymphæoides . . . . .	615
Portula . . . . .	369	magna . . . . .	528	<b>Gentiana</b>	
<b>Portulaca</b>		saxifraga . . . . .	529	Pneumonanthe . . . . .	617
oleracea . . . . .	370	<b>Aethusa</b>		campestris . . . . .	618
<b>Montia</b>		cynapium . . . . .	531	germanica . . . . .	619
rivularis . . . . .	373	<b>Oenanthe</b>		Amarella . . . . .	620
<b>Corrigiola</b>		Phellandrium . . . . .	534	ciliata . . . . .	621
litoralis . . . . .	374	<b>Libanotis</b>		<b>Cicendia</b>	
<b>Herniaria</b>		montana . . . . .	535	filiformis . . . . .	623
glabra . . . . .	375	<b>Fœniculum</b>		<b>Eri-thræa</b>	
hirsuta . . . . .	376	officinale . . . . .	538	Centaurium. . . . .	624
<b>Scleranthus</b>		<b>Silaus</b>		pulchella . . . . .	625
annuus . . . . .	377	pratensis . . . . .	540	<b>Convolvulus</b>	
perennis . . . . .	378	<b>Selinum</b>		arvensis . . . . .	627
<b>Sedum</b>		carvifolium . . . . .	542	sæpium . . . . .	628
maximum . . . . .	387	<b>Angelica</b>		<b>Cuscuta</b>	
<b>Kerria</b>		silvestris . . . . .	543	suaveolens . . . . .	629
japonica . . . . .	407	<b>Pencedanum</b>		<b>Borago</b>	
<b>Potentilla</b>		Chabræi . . . . .	545	officinalis . . . . .	633
Anserina . . . . .	450	Cervaria . . . . .	546	<b>Lycopsis</b>	
supina . . . . .	452	<b>Pastinaca</b>		arvensis . . . . .	634
<b>Agrimonia</b>		sativa . . . . .	551	<b>Myosotis</b>	
Eupatoria . . . . .	470	<b>Heracleum</b>		intermedia . . . . .	641
<b>Alchemilla</b>		Spondylium . . . . .	552	<b>Echium</b>	
arvensis . . . . .	473			vulgare . . . . .	652

<b>Solanum</b>		<b>Mentha</b>		<b>Betonica</b>	
Dulcamara . . .	658	rotundifolia . . .	748	officinalis . . .	794
nigrum . . .	659	viridis . . .	749	<b>Marrubium</b>	
tuberosum . . .	660	pubescens . . .	750	vulgare . . .	795
<b>Physalis</b>		piperita . . .	751	<b>Ballota</b>	
Alkekengi . . .	663	aquatica . . .	753	nigra . . .	796
<b>Lycium</b>		arvensis . . .	754	<b>Leonurus</b>	
barbarum . . .	665	Pulegium . . .	755	Cardiaca . . .	797
<b>Nicotiana</b>		<b>Salvia</b>		<b>Brunella</b>	
rustica . . .	666	pratensis . . .	758	grandiflora . . .	800
<b>Datura</b>		<b>Origanum</b>		<b>Scutellaria</b>	
Stramonium . . .	667	vulgare . . .	761	galericulata . . .	802
<b>Veronica</b>		<b>Thymus</b>		minor . . .	803
scutellata . . .	678	Serpyllum . . .	763	<b>Teucrium</b>	
Anagallis . . .	679	Chamædrys . . .	764	Scorodonia . . .	808
Beccabunga . . .	680	<b>Hyssopus</b>		Botrys . . .	809
serpyllifolia . . .	686	officinalis . . .	766	Scordium . . .	810
arvensis . . .	689	<b>Calamintha</b>		Chamædrys . . .	811
agrestis . . .	693	grandiflora . . .	769	montanum . . .	812
<b>Limosella</b>		<b>Clinopodium</b>		<b>Verbena</b>	
aquatica . . .	698	vulgare . . .	770	officinalis . . .	813
<b>Scrophularia</b>		<b>Melissa</b>		<b>Campanula</b>	
Neesii . . .	701	officinalis . . .	771	rotundifolia . . .	820
<b>Gratiola</b>		<b>Satureia</b>		rapunculoides . . .	821
officinalis . . .	704	hortensis . . .	772	Trachelium . . .	822
<b>Anthriscinum</b>		<b>Nepeta</b>		Medium . . .	823
Orontium . . .	710	Cataria . . .	773	glomerata . . .	824
majus . . .	711	<b>Lamium</b>		<b>Jasione</b>	
<b>Linaria</b>		amplexicaule . . .	775	montana . . .	835
vulgaris . . .	712	incisum . . .	776	<b>Lonicera</b>	
minor . . .	713	purpureum . . .	777	Periclymenum . . .	846
arvensis . . .	714	album . . .	778	<b>Symphoria</b>	
Cymbalaria . . .	717	maculatum . . .	779	racemosa . . .	848
Elatine . . .	718	<b>Galeopsis</b>		<b>Sherardia</b>	
<b>Rhinanthus</b>		Tetrahit . . .	781	arvensis . . .	849
angustifolius . . .	725	speciosa . . .	782	<b>Asperula</b>	
<b>Euphrasia</b>		ochroleuca . . .	783	arvensis . . .	850
officinalis . . .	729	intermedia . . .	784	Cynanchica . . .	852
nemorosa . . .	731	Ladanum . . .	785	<b>Galium</b>	
<b>Odontites</b>		<b>Stachys</b>		verum . . .	855
serotina . . .	732	germanica . . .	786	uliginosum . . .	862
<b>Phelepea</b>		alpina . . .	787	Aparine . . .	863
ramosa . . .	736	ambigua . . .	789	tricornis . . .	864
<b>Lavandula</b>		palustris . . .	790	<b>Valeriana</b>	
vera . . .	745	arvensis . . .	791	officinalis . . .	866
<b>Ocimum</b>		annua . . .	792	<b>Valerianella</b>	
Basilicum . . .	746	recta . . .	793	Morisonii . . .	872

<b>Scabiosa</b>		<b>Artemisia</b>		<b>Dahlia</b>	
Columbaria . . .	876	vulgaris . . .	936	variabilis . . .	983
Succisa . . .	877	Absinthium . . .	937	<b>Eupatorium</b>	
atropurpurea . . .	878	campestris. . .	938	cannabinum. . .	984
<b>Dipsacus</b>		<b>Tanacetum</b>		<b>Clethrum</b>	
silvestris . . .	881	vulgare . . .	940	Endivia . . .	990
<b>Oenopordon</b>		Balsamita . . .	941	<b>Hypochaeris</b>	
Acanthium. . .	882	<b>Tajetes</b>		radicata . . .	992
<b>Carlina</b>		patula . . .	942	<b>Thrinia</b>	
vulgaris . . .	883	<b>Calendula</b>		hirta . . .	994
<b>Cinara</b>		arvensis . . .	943	<b>Leontodon</b>	
Scolymus . . .	886	officinalis . . .	944	hispidus . . .	993
<b>Cirsium</b>		<b>Helichrysum</b>		autumnalis . . .	997
lanceolatum . . .	887	arenarium. . .	946	<b>Picris</b>	
acaule . . .	890	<b>Guaphallum</b>		hieracioides. . .	998
arvense . . .	891	silvaticum. . .	947	<b>Helminthia</b>	
<b>Carduus</b>		luteo-album . . .	948	echioides . . .	999
crispus . . .	893	uliginosum . . .	949	<b>Tragopogon</b>	
<b>Lappa</b>		<b>Elago</b>		pratensis . . .	1003
glabra . . .	900	germanica. . .	951	<b>Taraxacum</b>	
<b>Serratula</b>		minima . . .	953	officinale . . .	1009
linetoria . . .	903	arvensis . . .	954	paludosum . . .	1010
<b>Centaura</b>		<b>Pulicaria</b>		<b>Lactuca</b>	
Calcitrapa. . .	904	dysenterica . . .	955	marialis . . .	1013
solstitialis . . .	905	vulgaris . . .	956	saliva . . .	1017
maeulosa . . .	909	<b>Enula</b>		<b>Sonchus</b>	
Jacea . . .	910	Conyza . . .	957	Oleraccus . . .	1019
<b>Bidens</b>		britannica . . .	959	asper . . .	1020
tripartita . . .	913	<b>Solidago</b>		arvensis . . .	1021
cernua . . .	916	Virga-aurea . . .	960	<b>Crepis</b>	
<b>Hellanthus</b>		canadensis. . .	961	virens . . .	1029
annuus . . .	917	<b>Erigeron</b>		<b>Hieracium</b>	
luberosus . . .	918	acre . . .	962	Pilosella . . .	1030
rigidus . . .	919	canadense. . .	963	Auricula . . .	1031
<b>Achillea</b>		<b>Aster</b>		sabaudum . . .	1037
Millefolium . . .	921	Amellus . . .	965	boreale . . .	1038
Ptarmica . . .	922	dumorum . . .	966	<b>Xanthum</b>	
<b>Anthemis</b>		leucanthemus. . .	967	strumarium. . .	1040
arvensis . . .	924	floribundus . . .	968	<b>Amaranthus</b>	
Cotula . . .	925	sinensis . . .	969	Blitum . . .	1041
tinctoria . . .	926	<b>Linosyris</b>		retroflexus . . .	1042
<b>Matricaria</b>		vulgaris . . .	970	caudatus . . .	1043
inodora . . .	928	<b>Senecio</b>		paniculatus. . .	1044
<b>Chrysanthemum</b>		vulgaris . . .	973	<b>Atriplex</b>	
segetum . . .	933	erucæfolius . . .	976	hortense . . .	1046
<b>Bellis</b>		Jacobæa . . .	977	patulum . . .	1050
perennis . . .	934				

<b>Spinacia</b>		<b>Parietaria</b>		<b>Zea</b>	
glabra . . .	1051	officinalis . . .	1100	Mays . . .	1383
oleracea . . .	1052	ramiflora . . .	1101	<b>Oryza</b>	
<b>Beta</b>		<b>Thymelaea</b>		clandestina . . .	1384
vulgaris . . .	1053	Passerina . . .	1103	<b>Phalaris</b>	
<b>Chenopodium</b>		<b>Euphorbia</b>		canariensis . . .	1387
polyspermum . . .	1054	Peplus . . .	1113	<b>Oplismenus</b>	
Vulvaria . . .	1055	helioscopia . . .	1114	Crus-galli . . .	1389
album . . .	1056	exigua . . .	1115	<b>Digitaria</b>	
hybridum . . .	1057	platyphyllos . . .	1118	filiformis . . .	1391
glaucum . . .	1058	<b>Mercurialis</b>		<b>Setaria</b>	
urbicum . . .	1059	annua . . .	1123	verticillata . . .	1392
murale . . .	1060	<b>Callitriche</b>		viridis . . .	1393
opulifolium . . .	1061	stagnalis . . .	1126	italica . . .	1395
ficifolium . . .	1062	vernalis . . .	1127	<b>Panicum</b>	
Scoparium . . .	1063	hamulata . . .	1128	miliaceum . . .	1396
<b>Elitum</b>		<b>Ceratophyllum</b>		<b>Beschampsia</b>	
Bonus-Henricus	1064	demersum . . .	1129	discolor . . .	1421
rubrum . . .	1065	<b>Alisma</b>		<b>Phragmites</b>	
<b>Rumex</b>		Plantago . . .	1185	communis . . .	1438
maritimus . . .	1070	natans . . .	1186	<b>Cyperium</b>	
palustris . . .	1071	<b>Colchicum</b>		argentum . . .	1439
conglomeratus	1072	autumnale . . .	1189	<b>Molinia</b>	
<b>Polygonum</b>		<b>Potamogeton</b>		cœrulea . . .	1444
cuspidatum . . .	1078	erispus . . .	1285	<b>Glyceria</b>	
amphibium . . .	1080	densus . . .	1287	aquatica . . .	1448
lapathifolium . . .	1081	pusillus . . .	1290	<b>Poa</b>	
Persicaria . . .	1082	<b>Zannichella</b>		annua . . .	1453
mite . . .	1083	palustris . . .	1292	<b>Lolium</b>	
minus . . .	1084	<b>Najas</b>		perenne . . .	1491
Hydropiper . . .	1085	major . . .	1293	italicum . . .	1492
aviculare . . .	1086	<b>Juncus</b>		<b>Hordeum</b>	
Convolvulus . . .	1088	bufonius . . .	1316	murinum . . .	1496
dumetorum . . .	1089	<b>Heleocharis</b>		<b>Triticum</b>	
<b>Fagopyrum</b>		acicularis . . .	1368	repens . . .	1509
tataricum . . .	1091	<b>Scirpus</b>			
<b>Urtica</b>		maritimus . . .	1374		
dioica . . .	1098	<b>Cyperus</b>			
urens . . .	1099	fuscus . . .	1382		

## OCTOBRE.

<b>Ranunculus</b>		<b>Spergularia</b>		<b>Sagina</b>	
Flammula . . .	23	rubra . . .	79	ciliata . . .	84
<b>Silene</b>		<b>Spergula</b>		<b>Stellaria</b>	
noctiflora . . .	69	arvensis . . .	80	media . . .	91
				uliginosa . . .	95



<b>Oxalis</b>		<b>Scleranthus</b>		<b>Mentha</b>	
stricta . . .	111	perennis . . .	378	viridis . . .	749
<b>Geranium</b>		<b>Potentilla</b>		arvensis . . .	754
dissectum . . .	122	Anserina . . .	450	Pulegium . . .	755
rotundifolium . . .	125	supina . . .	452	<b>Thymus</b>	
<b>Erodium</b>		<b>Alchemilla</b>		Serpyllum . . .	763
Cicutarium . . .	127	arvensis . . .	473	Chamaedrys . . .	764
pimpinellae-folium . . .	128	<b>Aethusa</b>		<b>Clinopodium</b>	
<b>Molva</b>		cynapium . . .	531	vulgare . . .	770
silvestris . . .	131	<b>Daucus</b>		<b>Lamium</b>	
rotundifolia . . .	132	Carota . . .	555	amplexicaule . . .	775
<b>Hibiscus</b>		<b>Medera</b>		incisum . . .	776
syriacus . . .	138	Helix . . .	572	purpureum . . .	777
<b>Reseda</b>		<b>Anagallis</b>		album . . .	778
odorata . . .	169	arvensis . . .	597	maculatum . . .	779
<b>Eschscholtzia</b>		<b>Plantago</b>		<b>Galopsis</b>	
californica . . .	180	major . . .	599	intermedia . . .	784
<b>Corydalis</b>		intermedia $\beta$ . . .	599	Ladanum . . .	785
lutea . . .	182	minima $\gamma$ . . .	599	<b>Stachys</b>	
<b>Nasturtium</b>		lanceolata . . .	601	arvensis . . .	791
silvestre . . .	205	<b>Gentiana</b>		annua . . .	792
patustre . . .	207	Pneumonanthe . . .	617	<b>Marrubium</b>	
<b>Sisymbrium</b>		germanica . . .	619	vulgare . . .	795
Sophia . . .	212	Amarella . . .	620	<b>Teucrium</b>	
<b>Diploxys</b>		<b>Cicendia</b>		Botrys . . .	809
tenuifolia . . .	219	filiformis . . .	623	Scordium . . .	810
<b>Capsella</b>		<b>Borago</b>		<b>Verbena</b>	
Bursa pastoris . . .	250	officinalis . . .	633	officinalis . . .	813
<b>Senecio</b>		<b>Lycopsis</b>		<b>Sherardia</b>	
Coronopus . . .	256	arvensis . . .	634	arvensis . . .	849
<b>Viola</b>		<b>Solanum</b>		<b>Scabiosa</b>	
tricolor . . .	270	nigrum . . .	659	Columbaria . . .	876
rothomagensis . . .	273	<b>Nicotiana</b>		Succisa . . .	877
<b>Lotus</b>		rustica . . .	666	atropurpurea . . .	878
corniculatus . . .	290	<b>Veronica</b>		<b>Centaurea</b>	
<b>Medicago</b>		arvensis . . .	689	Jacea . . .	910
lupulina . . .	304	agrestis . . .	693	<b>Hellanthus</b>	
Willdenowii $\beta$ . . .	304	<b>Linaria</b>		tuberosus . . .	918
<b>Trifolium</b>		minor . . .	713	rigidus . . .	919
repens . . .	325	Elatine . . .	718	<b>Achillea</b>	
fragiferum . . .	327	<b>Euphrasia</b>		Millefolium . . .	921
<b>Portulaca</b>		officinalis . . .	729	<b>Pyrethrum</b>	
oleracea . . .	370	memorosa . . .	731	sinensis . . .	932
<b>Herniaria</b>		<b>Odontites</b>		<b>Bellis</b>	
glabra . . .	375	serotina . . .	732	perennis . . .	934
<b>Scleranthus</b>		<b>Ocimum</b>		<b>Arthemisia</b>	
annuus . . .	377	Basilicum . . .	746	vulgaris . . .	936

<b>Arthemisia</b>		<b>Chenopodium</b>		<b>Anemone</b>	
campestris . . .	938	Vulvaria . . .	1055	silvestris . . .	7
<b>Calendula</b>		album . . .	1056	<b>Ranunculus</b>	
officinalis . . .	944	<b>Polygonum</b>		nemorosus . . .	28
<b>Helichrysum</b>		Persicaria . . .	1082	<b>Alyssum</b>	
arenarium . . .	946	mite . . .	1083	calycinum . . .	233
<b>Gnaphalium</b>		minus . . .	1084	<b>Viola</b>	
uliginosum . . .	949	aviculare . . .	1086	odorata . . .	262
<b>Erigeron</b>		<b>Urtica</b>		hirta . . .	263
canadense . . .	963	dioica . . .	1098	canina . . .	265
<b>Aster</b>		urens . . .	1099	<b>Anthyllis</b>	
dumosus . . .	966	<b>Parietaria</b>		vulneraria . . .	289
floribundus . . .	968	officinalis . . .	1100	<b>Hippocrepis</b>	
<b>Senecio</b>		<b>Euphorbia</b>		comosa . . .	365
vulgaris . . .	973	Peplus . . .	1113	<b>Fragaria</b>	
<b>Dahlia</b>		helioscopia . . .	1114	vesca . . .	439
variabilis . . .	983	<b>Mercurialis</b>		viridis . . .	441
<b>Clethrum</b>		annua . . .	1123	<b>Potentilla</b>	
Endivia . . .	990	<b>Callitriche</b>		verna . . .	447
<b>Leontodon</b>		stagnalis . . .	1126	<b>Rosa</b>	
autumnalis . . .	997	vernalis . . .	1127	canina . . .	488
<b>Helminthia</b>		hamulata . . .	1128	<b>Cornus</b>	
echioides . . .	999	<b>Colchicum</b>		sanguinea . . .	573
<b>Taraxacum</b>		autumnale . . .	1189	<b>Myosotis</b>	
officinale . . .	1009	<b>Oryza</b>		palustris . . .	637
<b>Crepis</b>		clandestina . . .	1384	<b>Veronica</b>	
virens . . .	1029	<b>Digitaria</b>		opaca . . .	695
<b>Hieracium</b>		filiformis . . .	1392	hederæfolium . . .	697
Pilosella . . .	1030	<b>Poa</b>		<b>Ajuga</b>	
sabaudum . . .	1037	annua . . .	1453	Chamæpitys . . .	807
boreale . . .	1038	<b>Lolium</b>		<b>Sambucus</b>	
<b>Xanthium</b>		italicum . . .	1492	nigra . . .	841
strumarium . . .	1040			<b>Centaurea</b>	
<b>Atriplex</b>				Cyanus . . .	906
patulum . . .	1050				

## NOVEMBRE.

<b>Spergularia</b>		<b>Salvia</b>		<b>Aster</b>	
rubra . . .	79	arvensis . . .	758	floribunda . . .	968
<b>Stellaria</b>		<b>Pyrethrum</b>		<b>Senecio</b>	
media . . .	91	sinense . . .	932	vulgaris . . .	973
<b>Capsula</b>		<b>Bellis</b>		<b>Poa</b>	
Bursa pastoris . . .	250	perennis . . .	934	annua . . .	1453

## Additions et corrections.

Page 8 Famille 1. Renonculaceæ lisez Ranunculaceæ.

» 8 n° 3<sup>a</sup>. *T. aquilegifolium*. (*L. Sp.* 770.)

‡ Mai-Juin.

R. Prés, pelouses boisées. Wasserbillig. BL. !

Page 22 n° 120. *G. sanguinum* lisez *sanguineum*.

» 28 » 64. 5<sup>e</sup> ligne ajoutez : Ahle Weyer. Bois de Berg. Kz.

» 32 » 204. *N. officinalis* lisez *officinale*.

» 38 » 251. A effacer le synonyme.

» 38 » 98. Ajoutez Feldkresse.

» 42 » 279<sup>2</sup>. *G. Anglica*. (*L. Sp.* 999.) Sch. suppl. 24. 1038.

‡ Mai-Août.

AC. Bois arides, pâturages, bruyères de la Haute-Sûre. (Sch.)

Page 45 n° 310. 5<sup>e</sup> ligne, n° 305 lisez 306.

» 48 » 124. Lein lisez Linse.

» 52 » 374. *C. littoralis* lisez *litoral*.

» 58 » 415. *R. Schlechtendalii*.

‡ Juin-Juillet.

Page 62 n° 444. Ajoutez ‡ Mai-Juin.

» 72 » 512. » ‡ Juillet-Août.

» 75. Tribu IV. Sileneæ lisez Selinee.

» 76 n° 200. *Peucedanum* lisez **Peucedanum**.

» 78 » 560. *F.* lisez *T.*

» 82 » 588 au lieu de 288.

» 83 Fam. L. Plombagineæ lisez Plumbagineæ.

» 86 n° 615. *L. nymphoides* lisez *nymphæoides*.

» 88 » 628<sup>bis</sup>. † *C. pubescens*. (*Lindl.*) *Calystegia*.

‡ Juin-Septembre.

C. Cultivé et quelquefois spontané. Clausen. !

Page 89 n° 248. Ajoutez : Buglose. — Ochsenzunge.

» 90 » 647. *S.* lisez *L.*

» 92 » 261. **Capsicum**. (*L. Sp.* 269) lisez (*Tournf. Inst.* 62).

» 92 » 661. *C. annuum*. (*L. Sp.* 269.)

» 92 » 662. Lisez *L. esculentum*. (*Mill. Dict.* n° 2.)

» 95 » 687. 3 lignes : Haies lisez Ham.

Page 99 n° 717. 2 lignes : Juin lisez Avril.

» 101 » 739. 3 » vernum lisez verum.

» 102 » 744. 6 » ajoutez :

Peuplier déversoir du moulin de Bastendorf. EF. ! C. Saulsaies des bords de la Bles vers Tandel. Kz.

Page 109 n° 801. (*M. Bub. fl. Taur. cam.*), lisez (*M. Bieb. fl. Taur. cauc.*)

» 110 n° 312. Germander lisez Gamander.

» 111 » 814. 3 lignes : BL. lisez R.

» 112 » 819. 3 » cultivé lisez cultivée.

» 126 » 930 lisez 940.

» 129 » 970. P. lisez L.

» 132 » 998. O. » P.

» 133 » 1004. 7 lignes : Var.  $\beta$  lisez Var.  $\gamma$ .

» 139 » 1050. Var.  $\gamma$ . oppositifolia lisez oppositifolium.

» 144 » 1096. Après la 6<sup>e</sup> ligne à ajouter :

Var.  $\gamma$ . corylifolia. (*Host. pl. Aust. 1. 329.*)

C. Planté en avenue.

Page 144 n° 1096bis. *U. montana*. (*Smith. Engl. Fl. 2. 22.*)

‡ Mars-Avril. Fr. Mai.

AR. Bois et taillis des Ardennes. C. Environs de Luxembourg.

Page 145 n° 418. **Thymleæa** lisez **Thymelæa**.

» 160 » 1218. Ajoutez T. n° 521.

» 173 » 1292. E. lisez Z.

## Table des familles, des genres, des espèces et des synonymes. <sup>1)</sup>

Les noms des familles sont en PETITES CAPITALES, ceux des genres sont en lettres grasses et ceux des espèces sont en petite. Les synonymes sont en italique. Les chiffres indiquent les numéros d'ordre. Les espèces non suivies de nom d'auteur sont de Linné.

<b>Abies</b> Trn. . . . . 444	<b>Adoxa</b> . . . . . 324	<b>Aira</b> . . . . . 526
<i>alba</i> Mill. . . . . 1178	Moschatellina. . . . . 839	<i>caespitosa</i> . . . . . 1420
balsamea . . . . . 1179	<b>Aegopodium</b> . . . . . 182	<i>canescens</i> . . . . . 1416
<i>excelsa</i> P. Lk. . . . . 1176	Podagraria . . . . . 519	caryophyllea. . . . . 1417
<i>Larix</i> Lmk. . . . . 1175	<b>Aesculus</b> . . . . . 52	<i>carulea</i> . . . . . 1444
pectinata DC. . . . . 1178	hippocastanum . . . . . 148	<i>discolor</i> Thuil. . . . . 1421
<i>picca</i> DR. . . . . 1176	rubicunda . . . . . 149	<i>flexuosa</i> . . . . . 1420
<b>ABIETINEÆ</b> . . . p. 154	<b>Actinosa</b> . . . . . 189	multiculmis Dtr. <i>b.</i> 1417
<b>Acer</b> . . . . . 51	Cynapium . . . . . 531	præcox . . . . . 1418
campestre . . . . . 145	<b>Agathophytum</b> Moq.	<i>utiginosa</i> Weihe. . . . . 1421
platanoides . . . . . 146	<i>Bonus Hewicus</i> . . . . . 1064	<b>Ajuga</b> . . . . . 311
pseudo-platanus . . . . . 147	<i>rubrum</i> . . . . . 1065	alpina Vill. . . <i>b.</i> 804
<b>ACERINEÆ</b> . . . p. 25	<b>Agriemonia</b> . . . . . 157	Chamæpitys Sch. . . . . 807
<b>Aceras</b> R. Br. . . . . 473	acutifolia Dmtr. <i>c.</i> 470	genevensis . . . . . 806
anthrophophora R. . . . . 1239	canescens Dmtr. <i>b.</i> 470	pyramidalis . . . . . 805
<i>hircinia</i> Ldley . . . . . 1240	Eupatoria . . . . . 470	reptans . . . . . 804
<i>pyramidalis</i> Kbb. . . . . 1241	odorata Mill. . . . . 471	<b>Alabama</b>
<b>Achillea</b> . . . . . 351	<i>procera</i> Wlr. . . . . 470	<i>ossifraga</i> . . . . . 1221
Millefolium . . . . . 921	<b>Agropyrum</b> P. B.	<b>Alchemilla</b> Trn. . . . . 158
Plarmica . . . . . 922	<i>caninum</i> R. S. . . . . 1510	Aphanes Leers. . . . . 473
setacea W. K. <i>b.</i> . . . . . 921	<i>repens</i> P. B. . . . . 1509	arvensis Scop. . . . . 473
<b>Actinos</b>	<b>Agrostemma</b>	<i>montana</i> Willd. <i>b.</i> . . . . . 472
<i>thymoides</i> M. . . . . 767	Coronaria . . . . . 75	subsericea Koch. <i>b.</i> 472
<b>Aconitum</b> Trn. . . . . 14	<i>Flos-Cuculi</i> Don. . . . . 74	vulgaris . . . . . 472
<i>intermedium</i> . . . . . 47	<i>Githago</i> . . . . . 77	<b>Alectorolophus</b> H.
Lycocotum . . . . . 46	<b>Agrostis</b> . . . . . 519	<i>angustifolius</i> Gml. . . . . 725
Napellus . . . . . 47	<i>alba</i> . . . . . 1405	<i>grandiflorus</i> Wlr. . . . . 722
<i>Telyphonum</i> Rb. . . . . 46	<i>arundinacea</i> . . . . . 1411	<i>major</i> Rehb. . . . . 722
<b>Acorus</b> . . . . . 496	canina . . . . . 1406	<i>minor</i> W. et G. . . . . 723
Calamus . . . . . 1300	diffusa Host. <i>b.</i> . . . . . 1405	<i>parviflorus</i> Wlr. . . . . 723
<b>Actea</b> . . . . . 15	gigantea M. . . <i>c.</i> 1465	<b>Alisma</b> . . . . . 448
spicata . . . . . 48	<i>interrupta</i> . . . . . 1408	lanceolatum Wth. <i>b.</i> 1185
<b>Adonis</b> . . . . . 4	mutica Th. . . <i>b.</i> 1416	natans . . . . . 1186
æstivalis . . . . . 12	pumila . . . . . <i>c.</i> 1404	Plantago . . . . . 1185
<i>anomala</i> Wld. . . . . 13	<i>Spica-Venti</i> . . . . . 1407	<b>ALISMACEÆ</b> Juss. p. 156
autumnalis . . . . . 11	stolonifera . . <i>b.</i> 1404	<b>Alliaria</b> Adans.
<i>citrinus</i> Hoff. <i>b.</i> . . . . . 12	stolonifera . . . . . 1405	<i>officinalis</i> Andr. . . . . 209
flammea Jacq. . . . . 13	<i>varians</i> Th. . . <i>c.</i> 1404	<b>Allium</b> . . . . . 458
flava DC. . . . . <i>b.</i> 12	vulgaris With. . . . . 1404	arenarium . . . . . 1210
<i>maculatus</i> Wallr. . . . . 12	<b>Aira</b> . . . . . 526	Ascalonicum . . . . . 1215
<i>minutus</i> Jacq. . . . . 12	<i>aquatica</i> . . . . . 1445	Cepa . . . . . 1216

1) La nomenclature princeps adoptée n'étant pas celle en usage chez nous; la table tient compte de cette circonstance en donnant les principaux synonymes qui ne purent entrer dans le corps de l'ouvrage.

<b>Allium</b> . . . . .	458	<b>Ampelopsis</b> Mx. . . . .	54	<b>Aparagia</b> Wld	
<i>carinalatum</i> . . . . .	1213	<i>quinquefolia</i> R. Sch. . . . .	151	<i>autumnalis</i> Wld. . . . .	997
<i>complanatum</i> Bor. . . . .	1212	AMYGDALÆE . . . . .	p. 54	<i>hastilis</i> . . . . .	996
<i>fistulosum</i> . . . . .	1217	<b>Amygdalus</b> . . . . .	144	<i>hispida</i> . . . . .	995
<i>moly</i> . . . . .	1204	<i>communis</i> . . . . .	391	<b>Apera</b> Adans. . . . .	520
<i>oleraceam</i> . . . . .	1211	<i>Persica</i> . . . . .	390	<i>interrupta</i> . . . . .	1408
<b>Ophioscorodon</b> D. . . . .	1206	<b>Anacamptis</b> Rich . . . . .	475	<i>Spica-Venti</i> . . . . .	1407
<i>Porrum</i> . . . . .	1207	<i>pyramidalis</i> Rich. . . . .	1241	<b>Aphacae</b> Perh. . . . .	
<i>rotundum</i> . . . . .	1208	<b>Anagallis</b> . . . . .	228	<i>vulgaris</i> Perh . . . . .	349
<i>sativum</i> . . . . .	1205	<i>arvensis</i> . . . . .	597	<b>Aphanes</b>	
<i>Schœnoprasum</i> . . . . .	1212	<i>carnea</i> Schrak. . . . .	d. 598	<i>arvensis</i> . . . . .	473
<i>sphærocephalum</i> . . . . .	1209	<i>cœrulea</i> Schreb. . . . .	b. 598	<b>Apium</b> . . . . .	185
<i>ursinum</i> . . . . .	1203	<i>phœnicea</i> Lmk. . . . .	c. 593	<i>graveolens</i> . . . . .	523
<i>vineale</i> . . . . .	1210	<b>Anchusa</b> . . . . .	248	<i>Petroselinum</i> . . . . .	522
<b>Alnus</b> Trn. . . . .	439	<i>arvensis</i> M. B. . . . .	635	APOCYNÆE . . . . .	p. 85
<i>glutinosa</i> Gærtn. . . . .	1166	<i>officinalis</i> Gk. . . . .	634	<b>Aquilegia</b> Trn. . . . .	12
<i>incana</i> DC. . . . .	1167	<b>Anemone</b> Trn. . . . .	3	<i>vulgaris</i> . . . . .	43
<b>Alopecurus</b> . . . . .	517	<i>Hepatica</i> . . . . .	10	<b>Arabis</b> . . . . .	74
<i>agrestis</i> . . . . .	1397	<i>nemorosa</i> . . . . .	8	<i>arenosa</i> Scop. . . . .	197
<i>aquaticus</i> Dmtr. . . . .	b. 1398	<i>Pulsatilla</i> . . . . .	6	<i>hirsuta</i> Sep. . . . .	195
<i>fulvus</i> Sm. . . . .	1400	<i>ranunculoides</i> . . . . .	9	<i>sagittata</i> DC. . . . .	196
<i>geniculatus</i> . . . . .	1401	<i>silvestris</i> . . . . .	7	<i>Thaliana</i> . . . . .	210
<i>pallidus</i> Dmtr. . . . .	c. 1398	<b>Anethum</b> Trn. . . . .	201	<i>Turrita</i> . . . . .	198
<i>pratensis</i> . . . . .	1398	<i>Feniculum</i> . . . . .	538	<b>Archangelica</b> Hoff. . . . .	199
<i>utriculatus</i> Pers. . . . .	1399	<i>graveolens</i> . . . . .	549	<i>officinatis</i> Hoff. . . . .	544
<b>Alsiac</b> Whlb. . . . .	29	<b>Angelica</b> . . . . .	198	<b>Arctium</b>	
<i>media</i> . . . . .	91	<i>Archangelica</i> . . . . .	544	<i>Bardana</i> Willd. . . . .	902
<i>rubra</i> Whlb. . . . .	79	<i>Carrifolia</i> Spr. . . . .	542	<i>Lappa</i> . . . . .	899
<i>segetalis</i> . . . . .	78	<i>silvestris</i> . . . . .	543	<i>memorosum</i> Lej. . . . .	901
<i>tenuifolia</i> Whlb. . . . .	85	<b>Antennaria</b> Grtn. . . . .	365	<b>Artemisia</b>	
<i>viscosa</i> Schreb. . . . .	86	<i>dioica</i> Grtn. . . . .	959	<i>arvensis</i> Willr. . . . .	80
<b>Althœa</b> . . . . .	47	<b>Anthemis</b> . . . . .	353	<i>rubra</i> . . . . .	79
<i>hirsuta</i> . . . . .	135	<i>agrestis</i> Willr. . . . .	924	<i>segetalis</i> Lk. . . . .	78
<i>officinalis</i> . . . . .	134	<i>aivensis</i> . . . . .	924	<i>sepyllifolia</i> . . . . .	89
<i>rosea</i> Cav . . . . .	136	<i>Cotula</i> . . . . .	925	<i>trinervia</i> . . . . .	87
<i>silvestris</i> Alfd. . . . .	131	<i>nobilis</i> . . . . .	923	<b>Aristolochia</b> Trn. . . . .	424
<b>Alyssum</b> . . . . .	88	<i>tinctoria</i> . . . . .	926	<i>Clematitis</i> . . . . .	1109
<i>calycinum</i> . . . . .	233	<b>Anthericum</b>		<i>Sipho L'hérit.</i> . . . .	1110
<i>campestre</i> . . . . .	234	<i>Liliago</i> . . . . .	1220	ARISTOLOCHIÆE p. . . . .	146
<i>incanum</i> . . . . .	236	<i>ossifragum</i> . . . . .	1221	<b>Armeniaca</b> Thf. . . . .	145
<i>saxatile</i> . . . . .	235	<i>ranosum</i> . . . . .	1219	<i>vulgaris</i> Lk. . . . .	592
AMARANTACEÆ. p. . . . .	138	<b>Anthoxanthum</b> . . . . .	508	<b>Armeria</b> Willd. . . . .	229
<b>Amarantus</b> . . . . .	401	<i>odoratum</i> . . . . .	1385	<i>elongata</i> Hoffm. . . . .	598
<i>Blitum</i> . . . . .	1041	<i>villosum</i> Dmtr. . . . .	b. 1385	<b>Armoracia</b>	
<i>candatus</i> . . . . .	1043	<b>Anthriscus</b> Hoff. . . . .	211	<i>amphibia</i> . . . . .	206
<i>paniculatus</i> . . . . .	1044	<i>Cerefolium</i> Hoffm. . . . .	563	<i>rusticana</i> F. W. . . . .	239
<i>retroflexus</i> . . . . .	1042	<i>silvestris</i> Hoffm. . . . .	564	<b>Arnica</b> . . . . .	374
<i>sanguinosus</i> . . . . .	b. 1044	<b>Anthyllis</b> . . . . .	111	<i>montana</i> . . . . .	971
AMARYLLIDÆE. p. . . . .	162	<i>vulneraria</i> . . . . .	289	<b>Arnoseris</b> Gtn. . . . .	382
AMEROSIACEÆ. p. . . . .	137	<b>Antirrhinum</b> L. . . . .	275	<i>minima</i> Lk. . . . .	988
<b>Ameianchier</b> Mch. . . . .	164	<i>arvense</i> . . . . .	714	<i>pusilla</i> Gtn. . . . .	988
<i>vulgaris</i> Mch. . . . .	482	<i>Cymbalaria</i> . . . . .	717	AROIDÆE . . . . .	p. 174
<b>Ameilia</b> Alfd. . . . .		<i>Elatine</i> . . . . .	718	<b>Arthenantherum</b> P. . . . .	529
<i>major</i> Alfd. . . . .	165	<i>Linaria</i> . . . . .	712	<i>elatius</i> . . . . .	1432
<i>minor</i> Alfd. . . . .	166	<i>majus</i> . . . . .	711	<b>Artemisia</b> . . . . .	358
AMPELIDÆE . . . . .	p. 26	<i>minor</i> . . . . .	713	<i>Absinthium</i> . . . . .	937
<b>Ampelopsis</b> Mx. . . . .	54	<i>Orontium</i> . . . . .	710	<i>campestris</i> . . . . .	938
<i>hederacea</i> Mx. . . . .	151	<i>repens</i> Desf. . . . .	716	<i>Dracunculus</i> . . . . .	935

<b>Artemisia</b> . . . 358	<b>Atropa</b> . . . 264	<b>Betonica</b> . . . 305
<i>pontica</i> . . . 939	<i>Belladonna</i> . . . 664	<i>stricta</i> At. . <i>b.</i> 794
<i>vulgaris</i> . . . 936	<b>Avena</b> . . . 528	<b>Betula</b> Trn. . . 438
<b>Arum</b> . . . 494	<i>barbata</i> Br. . . 1428	<i>alba</i> . . . 1165
<i>maculatum</i> . . . 1298	<i>brevis</i> Rth. . . 1422	<i>Alnus</i> . . . 1166
<b>Arundo</b>	<i>caryophylla</i> Wb. 1417	<i>carpatica</i> Wld. <i>c.</i> 1165
<i>Calamagrostis</i> . . 1409	<i>clatior</i> . . . 1432	<i>pubescens</i> Ehr. <i>b.</i> 1165
<i>colorata</i> . . . 1389	<i>fatua</i> . . . 1427	<i>verrucosa</i> Ehr. <i>d.</i> 1165
<i>epigeios</i> . . . 1410	<i>flavescens</i> . . . 1431	BETULINEE . . . p. 154
<i>Phragmites</i> . . . 1438	<i>hirsuta</i> Rth. . . 1428	<b>Bidens</b> . . . 348
<i>sibirica</i> Schd. . . 1411	<i>nuda</i> . . . 1426	<i>cernua</i> . . . 916
<i>varia</i> Schd. . . 1412	<i>orientalis</i> Schb. . 1424	<i>minimus</i> . . . <i>c.</i> 916
<b>Asarum</b> Trn. . . 423	<i>pratense</i> P. B. . . 1419	<i>radiata</i> DC. . . <i>b.</i> 916
<i>europaeum</i> . . . 1108	<i>pratensis</i> . . . 1430	<i>tripartita</i> . . . 916
ASCLEPIADEE . . . p. 85	<i>pubescens</i> . . . 1429	<b>Bitum</b> Trn. . . 407
<b>Asclepias</b> . . . 238	<i>sativa</i> . . . 1423	<i>Bonus-Henricus</i> Rh. 1064
<i>syriaca</i> . . . 613	<i>strigosa</i> Schb. . . 1425	<i>rubrum</i> Reh. . . 1065
<i>Vincetoxicum</i> . . . 612	<b>Baldingera</b> Gr. . . 511	BORAGINEE . . . p. 88
ASPARAGINEE . . . p. 161	<i>arundinacea</i> Dmtr. 1388	<b>Borago</b> Trn. . . 247
<b>Asparagus</b> . . . 463	<b>Ballota</b> . . . 307	<i>officinalis</i> . . . 633
<i>officinalis</i> . . . 1224	<i>alba</i> . . . 796	<b>Brachypodium</b> P. B 546
<b>Asperugo</b> Trn. . . 258	<i>felida</i> Lk. . . . 796	<i>gracile</i> . . . <i>b.</i> 1490
<i>procumbens</i> . . . 656	<i>nigra</i> . . . 796	<i>pinnatum</i> P. B. . . 1490
<b>Asperula</b> Trn. . . 330	<i>ruderalis</i> Kch. <i>b.</i> 796	<i>rupestre</i> R. et S. <i>b.</i> 1490
<i>Aparine</i> M. B. . . 863	<i>sapium</i> Lj. . . <i>c.</i> 796	<i>silvaticum</i> R. Sch. 1489
<i>arvensis</i> . . . 850	<i>vulgaris</i> Lk. <i>b.</i> 796	<b>Brassica</b> . . . 84
<i>Cynanchica</i> . . . 852	BALSAMINEE . . . p. 21	<i>Cheiranthus</i> . . . 228
<i>galioides</i> M. B. . 853	<b>Barbarea</b> R. Br. . 73	<i>esculenta</i> DC. <i>b.</i> 223
<i>glauca</i> Bess. . . 853	<i>arcuata</i> Rb. . . 192	<i>Napus</i> . . . 223
<i>odorata</i> . . . 831	<i>intermedia</i> Ber. . 194	<i>a oleifera</i> . . . —
<b>Aster</b> . . . 372	<i>lyrata</i> Aschersn. 191	† <i>biennis</i> . . . —
<i>Amellus</i> . . . 965	<i>parviflora</i> Fr. . . 193	† † <i>annua</i> . . . —
<i>dumosus</i> . . . 966	<i>striata</i> Andz. . . 193	<i>b Napo-brassica</i> <i>b.</i> 223
<i>floribundus</i> W. . . 968	<i>taurica</i> DC. . . . 192	<i>Nigra</i> Koch. . . . 225
<i>leucanthemus</i> Df. 967	<i>vulgaris</i> BB. . . 191	<i>orientalis</i> . . . 217
<i>Linosyris</i> Brnh. 970	<b>Barthansia</b> Mch. 397	<i>obtusangula</i> . . . 221
<i>sinensis</i> . . . 969	<i>foetida</i> DC. . . . 1022	<i>oleracea</i> . . . 222
<i>stenoctis</i> . . . 964	<i>gracilis</i> Lej. <i>c.</i> 1022	<i>a. acephala</i> DC. . . —
<b>Astragalus</b> . . . 117	<i>prostrata</i> Dmtr. <i>b.</i> 1022	† <i>vulgaris</i> . . . —
<i>glycyphyllos</i> . . . 297	<i>taraxacifolia</i> Th. 1023	† † <i>quercifolia</i> . . . —
<b>Astrantia</b> Trn. . . 178	<b>Batrachium</b> E. M. p 10	† † † <i>crispa</i> . . . —
<i>major</i> . . . 514	<i>Ranunculus</i> . . . 15	<i>b. capitata</i> DC. . . —
<b>Athamanta</b>	<b>Bellis</b> . . . 357	† <i>alba</i> . . . —
<i>Cervaria</i> . . . 516	<i>caulescens</i> Lej. <i>b.</i> 934	† † <i>rubra</i> . . . —
<i>Libanotis</i> . . . 535	<i>perennis</i> . . . 934	<i>c. sabauda</i> . . . —
<i>Meum</i> . . . 539	<i>silvestris</i> Cy. <i>b.</i> 934	† <i>gemmifera</i> DC. —
<i>Oreoselinum</i> . . . 548	BERBERIDEE . . . p. 14	<i>d. gonglioides</i> . . . —
<b>Atriplex</b> Trn. . . 403	<b>Berberis</b> . . . 17	<i>e. botrytis</i> DC. . . —
<i>erectum</i> Sm. <i>b.</i> 1050	<i>vulgaris</i> . . . 50	Rapa . . . 224
<i>hastatum</i> . . . 1049	<b>Berteroa</b> DC. . . 89	<i>a. oleifera</i> DC. . . —
<i>hortense</i> . . . 1046	<i>incana</i> DC. . . . 236	† <i>annua</i> . . . —
<i>latifolium</i> Whlb. 1049	<b>Bernia</b> Koch. . . 527	† † <i>biennis</i> . . . —
<i>nitens</i> Skr. . . . 1047	<i>angustifolium</i> . . . 405	<i>b. rapifera</i> Metz. . . —
<i>oblongifolium</i> W. K. 1048	<b>Beta</b> Trn. . . . 1053	† <i>oblonga</i> . . . —
<i>oppositifolium</i> <i>c.</i> 1050	<i>vulgaris</i> . . . . 1053	† † <i>depressa</i> . . . —
<i>patulum</i> . . . 1050	<b>Betonica</b> . . . 305	<b>Brya</b> Sternb. . . 79
<i>rubrum</i> DC. <i>b.</i> 1046	<i>officinalis</i> . . . 794	<i>supina</i> Koch. . . 213
<i>tataricum</i> . . . 1048		

<b>Briza</b> . . . . .	540	<b>Calamintha</b> Mch.	295	<b>Campanula</b> . . . . .	316
<i>maxima</i> . . . . .	1450	<i>Acinos</i> Clrr. . . . .	767	<i>urticifolia</i> Sch. b.	822
<i>media</i> . . . . .	1450	<i>grandiflora</i> Mch.	769	CAMPANULACEÆ. p.	111
<b>Bromus</b> . . . . .	545	<i>officinalis</i> Mch. . . . .	768	CANNABINEÆ . p.	144
<i>arduennensis</i> Kb.	1474	<b>Calendula</b> . . . . .	361	<b>Cannabis</b> Trn. . . . .	412
<i>arvensis</i> . . . . .	1467	<i>arvensis</i> . . . . .	943	<i>sativa</i> . . . . .	1094
<i>asper</i> Mrs. . . . . .	1464	<i>officinalis</i> . . . . .	944	CAPRIFOLIACEÆ. p	114
<i>commutatus</i> Schr.	1471	<b>Calepina</b> Adans. . . . .	101	<b>Capsella</b> Vent. . . . .	96
<i>elongatus</i> Gd. b.	1472	<i>Corvini</i> Desv. . . . .	259	<i>Bursa pastoris</i> Mch.	250
<i>erectus</i> Hds. . . . .	1465	<b>Calla</b> . . . . .	495	<b>Cardamine</b> . . . . .	75
<i>giganteus</i> . . . . .	1488	<i>palustris</i> . . . . .	1299	<i>amara</i> . . . . .	199
<i>grossus</i> DC. . . . .	1473	<b>Callitriche</b> . . . . .	428	<i>hirsuta</i> . . . . .	201
<i>hordeaceus</i> Gm. c.	1472	<i>angustifolia</i> Hop. e.	1127	<i>impatiens</i> . . . . .	203
<i>inermis</i> Lys. . . . .	1466	<i>autumnalis</i> T. . . . .	1128	<i>intermedia</i> Horn.	201
<i>mollis</i> . . . . .	1469	<i>cæspitosa</i> Sch. b.	1127	<i>multicaulis</i> Hpp.	201
<i>montanus</i> . . . . .	1464	<i>intermedia</i> Hpp. d.	1127	<i>pratensis</i> . . . . .	200
<i>nitidus</i> Dm. . c.	1473	<i>minima</i> Hpp. b.	1127	<i>silvatica</i> Lk. . . . .	202
<i>patulus</i> M. . . . .	1468	<i>stagnalis</i> Sep. . . . .	1126	<b>Capsicum</b> Tr. . . . .	261
<i>pinnatus</i> . . . . .	1490	<i>stellata</i> Hpp. c.	1127	<i>annuum</i> . . . . .	661
<i>pinnatus</i> var. b.	1489	<i>verna</i> . . . . .	1127	<b>Carduus</b> . . . . .	342
<i>pratensis</i> . . . . .	1471	<i>vernalis</i> Kütz. . . . .	2127	<i>acanthoides</i> . . . . .	897
<i>racemosus</i> . . . . .	1470	CALITRICHINEÆ p.	148	<i>crispus</i> . . . . .	895
<i>Schraderi</i> Kth. . . . .	1475	<b>Calluna</b> Sbg. . . . .	224	<i>eriphorus</i> . . . . .	888
<i>secalinus</i> . . . . .	1472	<i>vulgaris</i> Sbg. . . . .	587	<i>lanceolatus</i> . . . . .	887
<i>sterilis</i> . . . . .	1462	<b>Caltha</b> . . . . .	8	<i>marianus</i> . . . . .	898
<i>tectorum</i> . . . . .	1463	<i>minor</i> DC. . b.	35	<i>multiflorus</i> Gd. . . . .	894
<i>triflorus</i> Ehr. . . . .	1487	<i>palustris</i> . . . . .	35	<i>nutans</i> . . . . .	896
<i>velutinus</i> Schrd. b.	1473	CALYCANTHEÆ. p.	69	<i>palustris</i> . . . . .	889
<b>Brunella</b> . . . . .	309	<b>Calycanthus</b> Ldy.	170	<i>polyanthemos</i> Schl.	894
<i>alba</i> . . . . .	801	<i>floridus</i> Ldl. . . . .	494	<i>tenuiflorus</i> Crt. . . . .	893
<i>grandiflora</i> Jacq.	890	<b>Calystegia</b> Ldly.		<b>Carex</b> Mich. . . . .	501
<i>laciniata</i> . . . . .	801	<i>pubescens</i> . . . . .	628	<i>acuta</i> . . . . .	1340
<i>pinnatifida</i> Pers. b.	799	<i>Sepium</i> . . . . .	628bis	<i>acutiformis</i> Ehr.	1363
<i>surrecta</i> Dmtr. c.	799	<b>Camelina</b> Cntz. . . . .	92	<i>agastachys</i> Ehr.	1350
<i>vulgaris</i> . . . . .	799	<i>dentata</i> Pers. . . . .	243	<i>ampullacea</i> Good.	1361
<b>Bryonia</b> . . . . .	321	<i>microcarpa</i> Andz.	242	<i>biformis</i> Schltz.	1355
<i>dioica</i> Jacq. . . . .	834	<i>pinnatifida</i> Pers. b.	243	<i>bitigularis</i> DC. . . . .	1358
<b>Bunium</b> . . . . .		<i>sativa</i> Cntz. . . . .	242	<i>binervis</i> Sm. . . . .	1357
<i>Bulbocastanum</i> . . . . .	520	<i>silvestris</i> Willr. . . . .	241	<i>brizoides</i> . . . . .	1331
<b>Bupleurum</b> Trn. . . . .	180	<b>Campanula</b> . . . . .	316	<i>cæspitosa</i> . . . . .	1338
<i>falcatum</i> . . . . .	517	<i>aggregata</i> W. e.	824	<i>canescens</i> . . . . .	1336
<i>rotundifolium</i> . . . . .	516	<i>Cervicaria</i> . . . . .	825	<i>clandestina</i> Good.	1345
BUTOMEÆ . p.	157	<i>elliptica</i> Kit. c.	824	<i>collina</i> Willd. . . . .	1343
<b>Butomus</b> Trn. . . . .	450	<i>glomerata</i> . . . . .	824	<i>culta</i> Good. . . . .	1336
<i>umbellatus</i> . . . . .	1182	<i>hederaceæ</i> . . . . .	833	<i>diandra</i> Rth. . . . .	1327
<b>Buxus</b> Trn. . . . .	427	<i>hybrida</i> . . . . .	828	<i>digitata</i> . . . . .	1346
<i>sempervirens</i> . . . . .	1125	<i>Medium</i> . . . . .	823	<i>distans</i> . . . . .	1354
<i>suffruticosa</i> . b.	1125	<i>patula</i> . . . . .	826	<i>disticha</i> Hds. . . . .	1323
<b>Calamagrostis</b> Ad. . . . .	521	<i>persicæfolia</i> . . . . .	818	<i>divulsa</i> Good. . . . .	1326
<i>arundinacea</i> Rth. . . . .	1411	<i>pumila</i> . . . . .	824	<i>Drejeri</i> Lg. . . . .	1338
<i>contracta</i> Dmtr. b.	1411	<i>pyramidalis</i> . . . . .	819	<i>echinata</i> Mrr. . . . .	1333
<i>epigeios</i> Rth. . . . .	1410	<i>rapunculoides</i> . . . . .	821	<i>elongata</i> . . . . .	1335
<i>lanceolata</i> Rth. . . . .	1409	<i>Rapunculus</i> . . . . .	817	<i>flacca</i> Schlr. . . . .	1349
<i>montana</i> DC. . . . .	1412	<i>rotundifolia</i> . . . . .	820	<i>flava</i> . . . . .	1352
<i>silvatica</i> . . . . .	1441	<i>salviaefolia</i> Wall. d.	824	<i>fulva</i> Good. . . . .	1356
<i>subulata</i> Dmtr. . . . .	1412	<i>speciosa</i> Hrn. f.	824	<i>Gebhardi</i> Willd. . . . .	1335
<i>varia</i> Schr. . . . .	1412	<i>speculum</i> . . . . .	827	<i>glauca</i> Scop . . . . .	1349
		<i>Trachelium</i> . . . . .	822	<b>Goodenoughii</b> Gy.	1339



<b>Carex</b> Mich. . . . .	501	<b>Carum</b> . . . . .	183	<b>Cerastium</b> . . . . .	34
<i>gracilis</i> Grt. . . . .	1340	<i>Butyrocistanum</i> K. . . . .	520	<i>seimidecandrum</i> . . . . .	98
<i>hirta</i> . . . . .	1365	<i>Carvi</i> . . . . .	521	<i>tomentosum</i> . . . . .	99
<i>Hornschuchiana</i> H. . . . .	1355	<b>CARYOPHYLLEÆ</b> p. . . . .	14	<i>viscosum</i> . . . . .	96
<i>humilis</i> Lys. . . . .	1345	<b>Castalia</b> Lk. . . . .		<i>vulgalum</i> . . . . .	101
<i>intermedia</i> Good. . . . .	1323	<i>alba</i> . . . . .	171	<b>Cerasus</b> Juss. . . . .	147
<i>kevigata</i> Sm. . . . .	1358	<b>Castanea</b> Trin. . . . .	432	<i>avium</i> Mich. . . . .	398
<i>leporina</i> . . . . .	1334	<i>sativa</i> Mill. . . . .	1133	<i>brevipes</i> D. . . . .	<i>b.</i> 399
<i>lobacea</i> . . . . .	1325	<i>vesca</i> Gærtn. . . . .	1133	<i>duracina</i> DC. . . . .	<i>c.</i> 398
<i>Morisonii</i> And. . . . .	1352	<i>vulgaris</i> Lk. . . . .	1133	<i>Juliana</i> DC. . . . .	<i>b.</i> 398
<i>maritima</i> Sep. . . . .	1350	<b>Catabrosa</b> P. B. . . . .	538	<i>Mahaleb</i> Mill. . . . .	400
<i>montana</i> . . . . .	1343	<i>aquatica</i> P. B. . . . .	1445	<i>Padus</i> DC. . . . .	401
<i>muricata</i> . . . . .	1325	<b>Caucalis</b> . . . . .	209	<i>semperflorens</i> Ehr. <i>c.</i> . . . . .	399
<i>nigra</i> . . . . .	1310	<i>Anthriscus</i> . . . . .	550	<i>vulgaris</i> Mill. . . . .	<i>c.</i> 399
<i>obtusangula</i> Ehr. . . . .	1361	<i>daucoides</i> . . . . .	558	<b>CERATOPHYLLEÆ</b> p. . . . .	149
<i>Oederi</i> Ehr. . . . .	1353	<i>grandiflora</i> . . . . .	556	<b>Ceratophyllum</b> . . . . .	429
<i>ornithopoda</i> Willd. . . . .	1347	<i>infesta</i> . . . . .	561	<i>apiculatum</i> . . . . .	<i>b.</i> 1129
<i>ovatis</i> Good . . . . .	1334	<i>latifolia</i> . . . . .	557	<i>demersum</i> . . . . .	1129
<i>pacifica</i> Drj. . . . .	1338	<i>Leptophylla</i> . . . . .	559	<b>Cercis</b> . . . . .	122
<i>Paivai</i> T. Schlitz. . . . .	1326	<i>nodiflora</i> . . . . .	562	<i>siliquastrum</i> . . . . .	330
<i>pallescens</i> . . . . .	1351	<b>CELASTRINEÆ</b> . . . . .	p. 26	<b>Chærophyllum</b> . . . . .	212
<i>paludosa</i> Good. . . . .	1363	<b>Centaurea</b> . . . . .	346	<i>bulbosum</i> . . . . .	566
<i>panicea</i> . . . . .	1348	<i>angustifolia</i> . . . . .	910	<i>Cerofolium</i> . . . . .	563
<i>paniculata</i> Lightf. . . . .	1328	<i>Calcitrapa</i> . . . . .	904	<i>hirsutum</i> . . . . .	567
<i>paradoxa</i> Willd. . . . .	1329	<i>Cyanus</i> . . . . .	906	<i>odoratum</i> Lk. . . . .	568
<i>patula</i> . . . . .	1359	<i>decipiens</i> . . . . .	910	<i>silvestre</i> . . . . .	564
<i>pendula</i> Huds. . . . .	1350	<i>Duboisii</i> Bor. . . . .	910	<i>temulum</i> . . . . .	565
<i>pilosa</i> Sep. . . . .	1344	<i>Jacea</i> . . . . .	910	<b>Chaïturus</b> Willd. . . . .	
<i>pilulifera</i> . . . . .	1341	<i>maculosa</i> Lk. . . . .	909	<i>Murrubiastrum</i> . . . . .	798
<i>præcox</i> Sch. . . . .	1330	<i>montana</i> . . . . .	907	<b>Chamaepium</b> Willr. . . . .	
<i>præcox</i> Jeq. . . . .	1344	<i>nigra</i> . . . . .	913	<i>officinale</i> Willr. . . . .	211
<b>Pseudo-Cyperus</b> . . . . .	1360	<i>nigrescens</i> Willd. . . . .	611	<b>Chamomilla</b> Gy. . . . .	
<i>psyllosphora</i> Ehr. . . . .	1322	<i>paniculata</i> Jacq. . . . .	908	<i>officinalis</i> C. K. . . . .	927
<i>pulicaris</i> . . . . .	1322	<i>pratensis</i> Th. <i>b.</i> . . . . .	911	<b>Chæranthus</b> . . . . .	72
<i>recurva</i> Hds. . . . .	1349	<i>pseudo-pyrgia</i> My. . . . .	912	<i>eheiri</i> . . . . .	190
<i>remota</i> . . . . .	1332	<i>pyrgia</i> . . . . .	912	<b>Chelidonium</b> . . . . .	66
<i>reversa</i> . . . . .	1360	<i>Scabiosa</i> . . . . .	908	<i>laciniatum</i> . . . . .	<i>b.</i> 178
<i>riparia</i> Crt. . . . .	1364	<i>serotina</i> Bor. . . . .	910	<i>majus</i> . . . . .	178
<i>rostrata</i> Whit. . . . .	1361	<i>solstitialis</i> . . . . .	905	<b>Chenopodium</b> Trin. . . . .	406
<i>Schreberi</i> Schk. . . . .	1330	<b>Centranthus</b> DC. . . . .	332	<i>acutifolium</i> Vent. <i>b.</i> . . . . .	1054
<i>silvatica</i> Hds. . . . .	1359	<i>ruber</i> DC. . . . .	865	<i>album</i> . . . . .	1056
<i>stellulata</i> Good. . . . .	1333	<b>Centunculus</b> . . . . .	227	<i>Bonus Hænicus</i> . . . . .	1064
<i>stolonifera</i> Ehr. . . . .	1344	<i>minimus</i> . . . . .	596	<i>licifolium</i> Sm. . . . .	1062
<i>stricta</i> Good. . . . .	1337	<b>Cephalanthera</b> Reh. . . . .	483	<i>glaucum</i> . . . . .	1058
<i>teretiuscula</i> Good. . . . .	1327	<i>cusifolia</i> Rich. . . . .	1270	<i>hybridum</i> . . . . .	1057
<i>tomentosa</i> . . . . .	1342	<i>grandiflora</i> Bab. . . . .	1269	<i>intermedium</i> M. <i>b.</i> . . . . .	1059
<i>tricusata</i> Fr. . . . .	1340	<i>pallens</i> Rich. . . . .	1269	<i>lanceolatum</i> M. <i>c.</i> . . . . .	1056
<i>uliginosa</i> . . . . .	1376	<i>Xyrophyllum</i> Reh. . . . .	1270	<i>murale</i> . . . . .	1060
<i>vena</i> Vill. . . . .	1344	<b>Cerastium</b> . . . . .	34	<i>opulifolium</i> Schr. . . . .	1061
<i>vesicaria</i> . . . . .	1362	<i>apetalum</i> Dm. <i>b.</i> . . . . .	101	<i>polyspermum</i> . . . . .	1054
<i>vesicaria</i> . . . . .	1361	<i>aquaticum</i> . . . . .	104	<i>rubrum</i> . . . . .	1065
<i>virens</i> Schb. <i>b.</i> . . . . .	1325	<i>arvense</i> . . . . .	102	<i>Scoparium</i> . . . . .	1013
<i>vulgaris</i> F. . . . .	1339	<i>brachypetalum</i> D. . . . .	100	<i>urbicum</i> . . . . .	1059
<i>vulpina</i> . . . . .	1324	<i>cæspitosum</i> Lej. . . . .	96	<i>viride</i> . . . . .	<i>b.</i> 1056
<b>Carlina</b> Trin. . . . .	339	<i>erectum</i> . . . . .	103	<i>Vulvaria</i> . . . . .	1055
<i>vulgaris</i> . . . . .	885	<i>glomeratum</i> Th. . . . .	101	<b>Chironia</b> . . . . .	
<b>Carpinus</b> . . . . .	435	<i>obscurum</i> . . . . .	97	<i>Centaurium</i> . . . . .	624
<i>Betulus</i> . . . . .	1140	<i>pumilum</i> Cr. . . . .	97	<i>pulchella</i> . . . . .	625

<b>Chondrilla</b> Trn. . . . . 393	<b>Cochlearia</b> . . . . . 91	<b>Corynephorus</b> P. B. . . . .
<i>juacea</i> . . . . . 1011	<i>Linwei</i> Griew. . . . . 240	<i>cuneus</i> P. B. . . . . 1416
<i>muralis</i> Lk. . . . . 1013	<i>officinalis</i> . . . . . 240	<b>Cotoneaster</b> Md. . . . . 163
<b>Chrysanthemum</b> . . . . . 356	Colchicaceæ . p. . . . . 157	<i>integerrimus</i> Md. . . . . 481
<i>Chamomilla</i> Bhd. . . . . 927	<b>Colchicum</b> Trn. . . . . 451	<i>vulgare</i> Ldl. . . . . 481
<i>inodorum</i> . . . . . 928	<i>autumale</i> . . . . . 1189	<b>Cræva</b> Rev. . . . .
<i>Leucanthemum</i> . . . . . 929	<b>Colutea</b> . . . . . 116	<i>major</i> G. et Grn. . . . . 332
<i>segetum</i> . . . . . 933	<i>arborescens</i> . . . . . 296	<i>monanthos</i> God. . . . . 343
<i>vulgare</i> Bhd. . . . . 940	<b>Comarum</b> . . . . . 153	<i>tenuifolia</i> G. et Gm. . . . . 333
<b>Chrysocoma</b> . . . . .	<i>palustre</i> . . . . . 445	<b>Crassula</b> . . . . . 140
<i>Linosyris</i> . . . . . 970	<i>supinum</i> . . . . . 452	<i>rubens</i> . . . . . 379
<b>Chrysosplenium</b> Tr. . . . . 222	Compositæ . p. . . . . 119	Crassulacæ . p. . . . . 53
<i>alternifolium</i> . . . . . 584	<b>Comlingia</b> . . . . .	<b>Cratægus</b> . . . . . 162
<i>oppositifolium</i> . . . . . 585	<i>Thaliana</i> Rb. . . . . 210	<i>Aria</i> . . . . . 492
<b>Cleodan</b> Ad. . . . . 242	<i>orientalis</i> And. . . . . 217	<i>monogyna</i> Jacq. . . . . 479
<i>tilifloris</i> Del. . . . . 623	<b>Conium</b> . . . . . 215	<i>Oxyacantha</i> . . . . . 478
<b>Clethrum</b> Trn. . . . . 383	<i>maculatum</i> . . . . . 570	<i>Pyracantha</i> . . . . . 480
<i>Endivia</i> . . . . . 990	<b>Conopsidium</b> Wllr. . . . .	<i>torminialis</i> Crntz. . . . . 491
<i>Intybus</i> . . . . . 989	<i>platantheum</i> Wlr. . . . . 1266	<b>Crepis</b> . . . . . 398
<b>Cleuth</b> . . . . .	<i>stenantherum</i> Wlr. . . . . 1265	<i>biennis</i> . . . . . 1027
<i>major</i> . . . . . 570	<b>Convallaria</b> . . . . . 464	<i>diffusa</i> . . . . . 1029
<b>Cinara</b> Vail. . . . . 340	<i>bifolia</i> . . . . . 1229	<i>fulida</i> . . . . . 1022
<i>Scolymus</i> . . . . . 886	<i>maialis</i> . . . . . 1225	<i>gracilis</i> . . . . . 1022
<b>Cineraria</b> . . . . . 375	<i>multiflora</i> . . . . . 1227	<i>paludosa</i> . . . . . 1026
<i>spatulifolia</i> Gml. . . . . 972	<i>Polygonatum</i> . . . . . 1228	<i>pinnatifida</i> . . . . . 1029
<b>Circæa</b> . . . . . 174	<i>verticillata</i> . . . . . 1226	<i>præmorsa</i> . . . . . 1024
<i>alpina</i> . . . . . 508	Convulvulacæ . p. . . . . 88	<i>prostrata</i> . . . . . 1022
<i>intermedia</i> Ehr. . . . . 507	<b>Convolvulus</b> . . . . . 245	<i>pulchra</i> . . . . . 1025
<i>luteiana</i> . . . . . 506	<i>arvensis</i> . . . . . 627	<i>striata</i> . . . . . 1029
<i>lutetiano-alpina</i> Md . . . . . 507	<i>pubescens</i> Ldl. . . . . 628	<i>laxa-rucifolia</i> . . . . . 1023
CIRCEACEÆ . p. . . . . 71	<i>sepium</i> . . . . . 629	<i>tectorum</i> . . . . . 1028
<b>Cirsium</b> Trn. . . . . 341	<b>Conyza</b> . . . . .	<i>virens</i> . . . . . 1029
<i>acaule</i> All. . . . . 890	<i>squarrosa</i> . . . . . 957	Crucifere . p. . . . . 30
<i>arvense</i> Sep. . . . . 891	<b>Coreopsis</b> . . . . .	<b>Cucubalus</b> Trn. . . . . 22
<i>caulescens</i> . . . . . 890	<i>Bidens</i> . . . . . 916	<i>baccifer</i> . . . . . 63
<i>decoloratum</i> Koch. c. . . . . 890	<b>Coriandrium</b> . . . . . 216	<i>Behen</i> . . . . . 64
<i>dubium</i> Willd. . . . . 890	<i>sativum</i> . . . . . 571	<b>Cucumis</b> . . . . . 322
<i>eriphorum</i> Sep. . . . . 888	<b>Cornus</b> Trn. . . . . 218	<i>Melo</i> . . . . . 836
<i>lanceolatum</i> Sep. . . . . 887	<i>mas</i> . . . . . 574	<i>sativus</i> . . . . . 835
<i>nemorale</i> Rehb. . . . . 887	<i>sanguinea</i> . . . . . 573	<b>Cucurbita</b> . . . . . 323
<i>oleraceum</i> Sep. . . . . 892	<b>Corouaria</b> . . . . . 25	<i>maxima</i> Duch. . . . . 837
<i>palustre</i> Sep. . . . . 889	<i>Flos-Cuculi</i> A. . . . . 74	<i>Pepo</i> . . . . . 838
<i>setosum</i> M. E. . . . . 891	<i>tomentosa</i> A. . . . . 75	Cucurbitacæ . p. . . . . 114
CISTINEÆ . p. . . . . 39	<b>Coronilla</b> . . . . . 129	Cupressinæ . p. . . . . 156
<b>Cistus</b> . . . . .	<i>Emerus</i> . . . . . 361	Cupulifere . p. . . . . 150
<i>Helianthemum</i> . . . . . 260	<i>varia</i> . . . . . 362	<b>Cuscuta</b> Trn. . . . . 246
<b>Clematis</b> . . . . . 8	<b>Coronopus</b> Hall. . . . .	<i>densiflora</i> . . . . . 630
<i>erecta</i> Al. . . . . 2	<i>Senebiera</i> . . . . . 256	<i>Epilinum</i> Weih. . . . . 630
<i>recta</i> . . . . . 2	<i>squamatus</i> Asch. . . . . 256	<i>Epitymum</i> Mur. . . . . 632
<i>Vitalba</i> . . . . . 1	<b>Corrigiola</b> . . . . . 137	<i>europæa</i> pa. . . . . 631
<b>Clinopodium</b> . . . . . 296	<i>litoralis</i> . . . . . 274	<i>minor</i> . . . . . 632
<i>vulgare</i> . . . . . 770	<b>Corydalis</b> DC. . . . . 69	<i>major</i> Bl. . . . . 631
<b>Cnicus</b> Vail. . . . .	<i>bulbosa</i> . . . . . 181	<i>suaveolens</i> Ser. . . . . 629
<i>oleraceus</i> . . . . . 892	<i>digitata</i> Prs. . . . . 181	<i>trifolia</i> Bab. . . . . 632
<b>Cochlearia</b> . . . . . 91	<i>lutea</i> DC. . . . . 182	Cuscutæ . p. . . . . 88
<i>Armoracia</i> . . . . . 239	<i>solida</i> Sm. . . . . 181	<b>Cuscutina</b> Prs. . . . .
<i>Coronopus</i> . . . . . 256	<b>Corylus</b> . . . . . 434	<i>suaveolens</i> Prs. . . . . 629
<i>Draba</i> . . . . . 255	<i>Avellana</i> . . . . . 1139	

<b>Cydonia</b> . . . . .	165	<b>Digitalis</b> Trn. . . . .	274	<b>Epilobium</b> . . . . .	171
<i>japonica</i> . . . . .	484	<i>ambigua</i> Mrr. . . . .	708	<i>decumbens</i> DC. <i>b.</i>	503
<i>vulgaris</i> . . . . .	483	<i>ambiguo-lutea</i> . . . . .	709	<i>grandiflorum</i> W.	496
<b>Cynanchicum</b>		<i>grandiflora</i> Lk. . . . .	708	<i>hirsutum</i> . . . . .	496
<i>Vincetoxicum</i> Rb.	612	<i>Libertiana</i> Dmtr.	707	<i>intermedium</i> M. <i>b.</i>	497
<b>Cynoglossum</b> . . . . .	256	<i>lutea</i> . . . . .	706	<i>laucolatum</i> Sch.	498
<i>Lappula</i> Willr. . . . .	654	<i>media</i> Rth. . . . .	709	<i>molle</i> Lmk. . . . .	497
<i>officinale</i> . . . . .	654	<i>ochroleuca</i> Jacq. . . . .	708	<i>montanum</i> . . . . .	499
<b>Cynosurus</b> . . . . .	535	<i>parviflora</i> . . . . .	706	<i>nutans</i> Lej. <i>b.</i>	499
<i>curvulus</i> . . . . .	1415	<i>purpurascens</i> Rth.	707	<i>obscurum</i> Schr.	502
<i>eristatus</i> . . . . .	1440	<i>purpurea</i> . . . . .	705	<i>palustre</i> . . . . .	503
<i>divrus</i> . . . . .	1452	<i>purpureo-lutea</i> . . . . .	707	<i>parviflorum</i> Rtz.	497
CYPERACEÆ . . . . . p.	177	<b>Digitalaria</b> . . . . .	514	<i>pubescens</i> Rth. . . . .	497
<b>Cyperus</b> . . . . .	505	<i>filiformis</i> Koch. . . . .	1391	<i>roseum</i> Schr. . . . .	500
<i>flavescens</i> . . . . .	1381	<i>glabra</i> B. . . . .	1391	<i>sparsiflorum</i> . . . . .	498
<i>fuscus</i> . . . . .	1382	<i>linearis</i> . . . . .	1391	<i>spicatum</i> . . . . .	495
<b>Cypripedium</b> . . . . .	488	<i>sanguinalis</i> Sep.	1390	<i>tetragonum</i> . . . . .	501
<i>Calceolus</i> . . . . .	1277	<b>Dioscoree</b> . . . . . p.	162	<b>Epimedium</b> . . . . .	18
<b>Cytisus</b> . . . . .	106	<i>Diploaxis</i> DC. . . . .	82	<i>alpinum</i> . . . . .	51
<i>Laburnum</i> . . . . .	278	<i>muralis</i> DC. . . . .	220	<b>Epipactis</b> Rich. . . . .	484
<i>sagittalis</i> Koch . . . . .	280	<i>tenuifolia</i> DC. . . . .	219	<i>ensifolia</i> Schw. . . . .	1270
		<b>DIPSACEÆ</b> . . . . . p.	118	<i>Helleborine</i> Ctz. . . . .	1272
<b>Dactylis</b> . . . . .	543	<i>Dipseus</i> Trn. . . . .	337	<i>latifolia</i> . . . . .	1272
<i>glomerata</i> . . . . .	1461	<i>Fulmonum</i> Mill. . . . .	882	<i>lanceifolia</i> . . . . .	1269
<i>hispanica</i> Rth. <i>b.</i>	1461	<i>pilosus</i> . . . . .	881	<i>microphylla</i> Reh. <i>b.</i>	1272
<b>Dahlia</b> Cav. . . . .	377	<i>silvestris</i> . . . . .	883	<i>Nidus-avis</i> Crtz.	1274
<i>variabilis</i> Desf. . . . .	983	<b>Draba</b> . . . . .	90	<i>ovata</i> Crtz. . . . .	1275
<b>Danthonia</b>		<i>muralis</i> . . . . .	238	<i>palustris</i> Crtz. . . . .	1273
<i>decumbens</i> . . . . .	1436	<i>verna</i> . . . . .	237	<i>pallens</i> Willd. . . . .	1269
<b>Daphne</b> . . . . .	417	<b>Drosera</b> . . . . .	59	<i>rubra</i> All. . . . .	1271
<i>Mezereum</i> . . . . .	1102	<i>intermedia</i> Hayn.	163	<i>varians</i> Crtz. <i>c.</i>	1272
<b>Datura</b> . . . . .	267	<i>longifolia</i> . . . . .	163	<b>Epipogon</b> Gn. . . . .	481
<i>Stramonium</i> . . . . .	667	<i>rotundifolia</i> . . . . .	162	<i>aphyllus</i> Sw. . . . .	1267
<b>Daucus</b> Trn. . . . .	206	<b>DROSERACEÆ</b> . . . . . p.	27	<i>Gmelini</i> Rich. . . . .	1267
<i>Carota</i> . . . . .	553	<b>Ebulum</b> Pont.		<b>Eranthis</b> Slzb. . . . .	9
<i>saliva</i> . . . . . <i>b.</i>	553	<i>humile</i> Gk. . . . .	840	<i>hiemalis</i> Slzb. . . . .	36
<b>Delphinium</b> Trn.	13	<b>Echinops</b> . . . . .	347	<b>Erica</b> . . . . .	223
<i>Ajacis</i> . . . . .	45	<i>speriocephalus</i> . . . . .	914	<i>Tetralix</i> . . . . .	586
<i>consolida</i> . . . . .	44	<b>Echinosperrnum</b> Sm	255	<i>cutyaris</i> . . . . .	587
<b>Deschampsia</b> P. B. . . . .	527	<i>Lappula</i> Lhm. . . . .	653	<b>ERICINEÆ</b> . . . . . p.	82
<i>cæspitosa</i> P. B. . . . .	1419	<b>Echium</b> Trn. . . . .	259	<b>Erigeron</b> . . . . .	370
<i>discolor</i> . . . . .	1421	<i>vulgare</i> . . . . .	652	<i>acere</i> . . . . .	962
<i>flexuosa</i> . . . . .	1420	<b>ELEGNEÆ</b> . . . . . p.	146	<i>canadense</i> . . . . .	963
<i>parviflora</i> . . . . . <i>b.</i>	1421	<b>Elaeagnus</b> . . . . .	419	<i>serotinum</i> Wh. <i>b.</i>	962
<b>Dianthus</b> . . . . .	20	<i>angustifolia</i> . . . . .	1104	<b>Eriophorum</b> . . . . .	514
<i>Armeria</i> . . . . .	54	<b>ELATINEÆ</b> . . . . . p.	20	<i>angustifolium</i> Rth.	1378
<i>arrectus</i> Dmtr. . . . .	57	<b>Elatine</b> . . . . .	37	<i>gracile</i> Koch. . . . .	1380
<i>cæsius</i> Sm. . . . .	59	<i>Alsinastrum</i> . . . . .	105	<i>latifolium</i> Hpp. . . . .	1379
<i>Carthusianorum</i> . . . . .	53	<b>Elymus</b> . . . . .	550	<i>polystachium</i> . . . . .	1378
<i>Caryophyllus</i> . . . . .	56	<i>europæus</i> . . . . .	1502	<i>trigustrum</i> Hpp.	1380
<i>deltoides</i> . . . . .	58	<b>Erodium</b> L'hérit. . . . .	45	<b>Erodium</b> L'hérit. . . . .	45
<i>diminutus</i> . . . . .	53	<i>Cicutarium</i> L'hér.	127	<i>pimpinellifolium</i> id.	128
<i>glauucus</i> . . . . . <i>b.</i>	58	<i>evruleum</i> . . . . .	1444	<b>Erophila</b> DC.	
<i>plumarius</i> . . . . .	60	<b>Ephemerum</b>		<i>verna</i> DC. . . . .	237
<i>prolifer</i> . . . . .	53	<i>nenorum</i> . . . . .	593	<i>cutyaris</i> DC. . . . .	237
<b>Dictamnus</b> . . . . .	42	<b>Epilobium</b> . . . . .	171	<i>Erucastrum</i> Prd. . . . .	83
<i>albus</i> . . . . .	113	<i>adnatum</i> Geb. . . . .	501	<i>obtusangulum</i> Rb.	221
<i>Fraginella</i> Pers. . . . .	113	<i>angustifolium</i> . . . . .	495		

<b>Ervilia</b>		<b>Euphrasia</b> Trn.	280	<b>Flilago</b> Trn. . . .	366
<i>saliva</i> . . . .	344	<i>verna</i> Bld. . . .	731	<i>montana</i> DC. . . .	953
<b>Eryuan</b> Trn. . . .	124	<b>EUPHORBIAEAE</b> p.	147	<i>pyramidata</i> . . <i>b.</i>	951
<i>Ervilia</i> . . . .	344	<b>Eryonymus</b> Trn.	56	<b>Farniculum</b> Ad.	193
<i>gracile</i> DC. . . .	342	<i>europea</i> . . . .	153	<i>officinale</i> All.	538
<i>hirsutum</i> . . . .	340	<b>Exacum</b> W.		<b>Fragaria</b> . . . .	152
<i>lens</i> . . . .	345	<i>filiforme</i> W. . . .	621	<i>chitensis</i> Ehr. . . .	444
<i>monanthos</i> . . . .	343	<b>Faba</b> Nel. . . .	125	<i>collina</i> Ehr. . . .	441
<i>pisiforme</i> Trn. . . .	331	<i>vulgaris</i> Meh. . . .	346	<i>communis</i> Ehr. <i>b.</i>	440
<i>tetraspermum</i> . . . .	341	<i>equina</i> . . . <i>a.</i>	346	<i>efflagellis</i> Ehr. <i>c.</i>	439
<b>Eryngium</b> Trn. . . .	179	— . . . <i>b.</i>	346	<i>elatior</i> Ehr. . . .	440
<i>campestre</i> . . . .	515	<b>Eragopyrum</b> Trn.	410	<i>grandiflora</i> Ehr.	443
<b>Erysimum</b> . . . .	80	<i>esculentum</i> Meh.	1090	<i>heterophylla</i> Ehr. <i>c.</i>	440
<i>Altiaria</i> . . . .	147	<i>latacicum</i> Grtn. . . .	1091	<i>monophylla</i> Ehr. <i>d.</i>	439
<i>arenatum</i> Opz. . . .	192	<b>Eragus</b> Trn. . . .	431	<i>moschata</i> Dehn. . . .	440
<i>Barbarea</i> . . . .	191	<i>Castanea</i> . . . .	1133	<i>semperflorans</i> Ehr. <i>b.</i>	439
<i>cheiranthoides</i> . . . .	214	<i>silytica</i> . . . .	1132	<i>sterilis</i> . . . .	446
<i>hieracifolium</i> . . . .	215	<b>Palenaria</b> Rev. . . .	181	<i>vesca</i> . . . .	439
<i>longisiliquosum</i> Rb.	216	<i>Rivini</i> Hst. . . .	518	<i>viridis</i> D. . . .	441
<i>officinale</i> . . . .	211	<i>scioides</i> Bh. . . .	518	<i>virginiana</i> . . . .	442
<i>orientale</i> R. Br. . . .	217	<i>scioides</i> Bh. . . .	518	<b>Fraxinus</b> Trn. . . .	233
<i>perfoliatum</i> Crtz.	217	<b>Farsetia</b> R. Br.		<i>excelsior</i> . . . .	605
<i>pravoae</i> Sm. . . .	194	<i>incana</i> R. Br. . . .	236	<i>Ornus</i> . . . .	606
<i>strictum</i> Fl. Wett.	215	<b>Fedia</b>		<b>Fritillaria</b> . . . .	453
<i>virgatum</i> Rth. . . .	216	<i>olitoria</i> Vhl. . . .	869	<i>imperialis</i> . . . .	1192
<b>Erythraea</b> Rich. . . .	343	<b>Festuca</b> . . . .	545	<b>Fumaria</b> Trn. . . .	70
<i>Centaureum</i> Pers.	624	<i>arundinacea</i> Schb.	1486	<i>bulbosa</i> . . . .	181
<i>Gerardii</i> . . . <i>b.</i>	625	<i>bromoides</i> . . . .	1477	<i>capreolata</i> . . . .	187
<i>inaperta</i> Willd. . . .	625	<i>capillata</i> Lk. <i>d</i>	1483	<i>lutea</i> . . . .	182
<i>pulehella</i> Fr. . . .	625	<i>decumbens</i> . . . .	1436	<i>officinalis</i> . . . .	183
<i>ramosissima</i> Pers. <i>b.</i>	625	<i>distans</i> Kit. . . .	1419	<i>parviflora</i> Lk. . . .	186
<b>Eschscholtzia</b> Ch. . . .	68	<i>duriuscula</i> . . . .	1482	<i>tenuifolia</i> Fr. . . .	184
<i>californica</i> DC. . . .	180	<i>elatior</i> . . . .	1484	<i>Vaillantii</i> Lst. . . .	185
<b>Eupatorium</b> Trn. . . .	378	<i>gigantea</i> Vill. . . .	1488	<i>Wirtgeni</i> Koch. . . .	184
<i>cannabinum</i> . . . .	984	<i>glauca</i> Shd. . . <i>b.</i>	1483	<b>FUMARIACEE</b> . . p.	30
<b>Euphorbia</b> . . . .	425	<i>heterophylla</i> Lk. . . .	1481	<b>Gagea</b> Salisb. . . .	456
<i>amygdaloides</i> . . . .	1112	<i>heterophylla</i> . . . .	1482	<i>arvensis</i> Shlt. . . .	1199
<i>Cyparissias</i> . . . .	1121	<i>foliacea</i> Hds. . . .	1485	<i>lutea</i> Shlt. . . .	1201
<i>dulceis</i> Jeq. . . .	1116	<i>Myuros</i> Ehr. . . .	1479	<i>minima</i> Shlt. . . .	1200
<i>Esula</i> . . . .	1122	<i>ovina</i> . . . .	1483	<i>pratensis</i> Shlt. . . .	1198
<i>exigua</i> . . . .	1115	<i>pravoae</i> . . . .	1418	<i>silytica</i> . . . .	1200
<i>fedida</i> Hipp. . . .	1119	<i>pratensis</i> Hds. . . .	1484	<i>stenopetala</i> Rehb.	1196
<i>Gerardiana</i> Jeq. . . .	1120	<i>Pseudo-Myuros</i> Soy.	1479	<b>Galanthus</b> . . . .	472
<i>helioscopia</i> . . . .	1114	<i>radicans</i> . . . <i>b.</i>	1484	<i>nivalis</i> . . . .	1238
<i>Lathyris</i> . . . .	1111	<i>rigida</i> Kth. . . .	1176	<b>Galega</b> Trn. . . .	115
<i>micrantha</i> M. B. . . .	1119	<i>rubra</i> . . . .	1480	<i>officinalis</i> . . . .	295
<i>Peplus</i> . . . .	1113	<i>seuiroides</i> Rh. . . .	1478	<b>Galeobolton</b> Hds.	302
<i>platyphyllos</i> . . . .	1118	<i>silytica</i> Vill. . . .	1487	<i>luteum</i> Hds. . . .	789
<i>purpurata</i> Th. . . .	1116	<i>unguis</i> Dmtr. . . .	1477	<b>Galeopsis</b> . . . .	303
<i>silvatica</i> Jeq. . . .	1112	<i>valesiaea</i> Schleich <i>c</i>	1483	<i>angustifolia</i> Ehr.	785
<i>stricta</i> . . . .	1119	<b>Glebaria</b> Dill. . . .	7	<i>bifida</i> Englm. <i>b.</i>	781
<i>verrucosa</i> . . . .	1117	<i>ranunculoides</i> . . . .	34	<i>cannabinna</i> Rth. <i>c.</i>	781
<b>Euphrasia</b> Trn. . . .	280	<b>Flilago</b> Trn. . . .	366	<i>Galeobolton</i> . . . .	780
<i>lutea</i> . . . .	733	<i>arvensis</i> Fr. . . .	954	<i>grandiflora</i> Rth.	783
<i>nemorosa</i> Pers. . . .	730	<i>gallica</i> . . . .	952	<i>intermedia</i> Vill. . . .	784
<i>Odontites</i> . . . .	731	<i>germanica</i> . . . .	951	<i>Ladanum</i> . . . .	785
<i>officinalis</i> . . . .	729	<i>minima</i> Fr. . . .	953	<i>ochroleuca</i> Lk. . . .	783
<i>serotina</i> Lk. . . .	732				

<b>Galeopsis</b> . . . . .	303	<b>Geranium</b> . . . . .	44	<b>HALORAGEE</b> . . . . .	p. 71
speciosa M. . . . .	782	sanguineum . . . . .	420	<b>Hedera</b> . . . . .	217
<b>Tetrahit</b> . . . . .	784	silvaticum . . . . .	147	<b>Helix</b> . . . . .	572
<i>versicolor</i> Crf. . . . .	782	<b>Gerum</b> . . . . .	151	humil-repens Lej. <i>b.</i>	572
<i>villosa</i> Hd. . . . .	783	<i>intermedium</i> Ehr. . . . .	437	<b>HEREDAGEE</b> . . . . .	p. 79
<b>Gallum</b> . . . . .	331	<i>intermedium</i> Wlhr. . . . .	438	<b>Hedysarum</b>	
<i>agreste</i> Wlr. . . . .	863	<i>rivale</i> . . . . .	436	<i>Onobrychis</i> . . . . .	366
Aparine . . . . .	863	<i>rivale-urbanum</i> M. . . . .	437	<b>Helleboris</b> R. Br. . . . .	503
<b>Cruciata</b> Sep. . . . .	854	urbanum . . . . .	435	acicularis R. Br. . . . .	1368
<i>elatum</i> Th. . . . .	857	urbano-rivale M. . . . .	439	palustris R. Br. . . . .	1367
erectum Hd. . . . .	858	<b>Githago</b> Df. . . . .		<b>Helianthemum</b> Tr. . . . .	102
<i>glaucum</i> . . . . .	851	<i>segetum</i> Df. . . . .	77	Ghamæcistus Mill. . . . .	260
<i>hercynicum</i> DC. . . . .	860	<b>Glaucium</b> Trn . . . . .	67	obscurum Pers. <i>b.</i> . . . . .	260
<i>lave</i> Th. . . . .	859	<b>Ilavum</b> Crutz. . . . .	179	polifolium . . . . .	261
<i>lucidum</i> Al. . . . .	858	<b>Glechoma</b>		pulverulentum DC. <i>b.</i> . . . . .	261
Mollugo . . . . .	857	hederacea . . . . .	774	serpyllifolium Clz. <i>c.</i> . . . . .	261
palustre . . . . .	864	<i>hirsuta</i> Koch. <i>b.</i> . . . . .	774	<i>vulgare</i> G. . . . .	260
saxatile . . . . .	850	<i>villosa</i> Rehb. . . . .	774	<b>Helianthus</b> . . . . .	349
silvaticum . . . . .	856	<b>Glyceria</b> R. Br. . . . .	539	annuus . . . . .	917
silvestre Poll. . . . .	859	aquatica Whit. . . . .	1448	rigidus . . . . .	918
spurium . . . . .	863	<i>agnatica</i> Prest. . . . .	1445	tuberosus . . . . .	918
supinum DC. <i>b.</i> . . . . .	859	distans Whlb. . . . .	1449	<b>Heliclysum</b> Grtn. . . . .	263
tricornis With. . . . .	864	fluitans R. Br. . . . .	1446	arenarium DC. . . . .	916
uliginosum . . . . .	862	<i>maritima</i> T. . . . .	1449	<b>Heliotropium</b> . . . . .	256
Vaillantii DC. <i>b.</i> . . . . .	862	plicata Fr. . . . .	1447	europæum . . . . .	657
verum . . . . .	855	<i>rigida</i> Sm. . . . .	1476	<b>Helleborus</b> Ad. . . . .	10
<b>Genista</b> . . . . .	107	<i>spectabilis</i> M. K. . . . .	1448	fetidus . . . . .	39
anglica . . . . .	2792	<b>Geophalum</b> Trn. . . . .	364	hiemalis . . . . .	36
germanica . . . . .	279	<i>acanthium</i> . . . . .	946	niger . . . . .	37
juncea . . . . .	283	<i>arvense</i> Lk. . . . .	954	<i>pallens</i> . . . . .	38
pilosa . . . . .	282	<i>dioicum</i> . . . . .	950	viridis . . . . .	38
sagittalis . . . . .	280	luteo-album . . . . .	948	<b>Helianthis</b> Juss. . . . .	388
<i>scoparium</i> . . . . .	277	<i>montanum</i> Hds. . . . .	953	eclitoides Grtn . . . . .	999
tinctoria . . . . .	281	nudum Hfm. <i>b.</i> . . . . .	949	<b>Helosciadum</b> Koch. . . . .	186
<b>Gentiana</b> . . . . .	241	<i>rectum</i> Sm. . . . .	947	inundatum K. . . . .	525
acaulis . . . . .	622	silvaticum . . . . .	947	nodiflorum K. . . . .	524
Amarella . . . . .	620	uliginosum . . . . .	949	<b>Hemerocallis</b> . . . . .	462
campestris . . . . .	618	<b>GRAMINEE</b> . . . . .	p. 182	flava . . . . .	1222
<i>Centaureum</i> . . . . .	624	<b>Gratiola</b> . . . . .	273	fulva . . . . .	1223
ciliata . . . . .	621	officinalis . . . . .	704	<b>Hepatica</b> Dill. . . . .	
cruciata . . . . .	616	<b>GROSSULARIÉE</b> . p . . . . .	80	<i>triloba</i> G. . . . .	40
<i>filiformis</i> . . . . .	624	<b>Gymnadenia</b> R. Br. . . . .	479	<i>nobilis</i> Rehb. . . . .	10
germanica Wlhr. . . . .	619	albida Rich. . . . .	1263	<b>Hieracium</b> . . . . .	203
Pneumonanthe . . . . .	617	<i>albiflora</i> . . . . .	1261	elegans Jcq. <i>b.</i> . . . . .	552
<i>pulchella</i> Hw. . . . .	625	conopsea R. Br. . . . .	1261	sibiricum <i>c.</i> . . . . .	552
<b>GENTIANÉE</b> . . . . .	p. 86	odoratissima Rich. . . . .	1262	Spondylium . . . . .	552
<b>GERANIACEE</b> . . . . .	p. 21	ornithis Jcq. <i>b.</i> . . . . .	1261	<b>Hernium</b> R. Br. . . . .	476
<b>Geranium</b> . . . . .	44	viridis Rich. . . . .	1264	<i>chandestinum</i> G. G. . . . .	1260
<i>ciutarium</i> . . . . .	127	<b>Gyneryum</b> H et B. . . . .	534	Monorchis R. Br. . . . .	1260
columbinum . . . . .	121	argenteum N. . . . .	1439	<b>Herniaria</b> Trn. . . . .	138
dissectum . . . . .	122	<b>Gypsophila</b> . . . . .	19	glabra . . . . .	375
molle . . . . .	123	muralis . . . . .	52	hirsuta . . . . .	376
palustre . . . . .	149	<i>serotina</i> Hyn. . . . .	52	<b>Hesperis</b> A. . . . .	81
phaeum . . . . .	116	<i>Vaccaria</i> Sm. . . . .	61	Alliaria Wlhr. . . . .	209
pratense . . . . .	118	<b>Habenaria</b> R. Br. . . . .		incana fl. pl. <i>b.</i> . . . . .	218
pusillum . . . . .	124	<i>albida</i> Sm. . . . .	1263	<i>inodora</i> . . . . .	218
Robertianum. . . . .	126	<i>viridis</i> R. Bw. . . . .	1264	matronalis . . . . .	218
rotundifolium . . . . .	125				

<b>Hibiscus</b> . . . . .	48	<b>Hordeum</b> . . . . .	549	<b>Isoplepis</b>	
<i>syriacus</i> . . . . .	138	<i>vulgare</i> . . . . .	1500	<i>acicularis</i> . . . . .	1368
Trionum . . . . .	137	<i>zeocrithon</i> . . . . .	1499	<i>setacea</i> . . . . .	1371
<b>Hieracium</b> Trn. . . . .	399	<b>Humulus</b> . . . . .	413	<b>Jasione</b> . . . . .	319
<i>auricula</i> . . . . .	1031	Lupulus . . . . .	1095	<i>humilis</i> . . . . .	832
<i>autumnale</i> Grb. . . . .	1037	<b>Hydrocotyle</b> Trn. . . . .	176	<i>montana</i> . . . . .	831
<i>biene</i> Karsch. . . . .	1027	<i>vulgaris</i> . . . . .	512	<i>perennis</i> Lk. . . . .	832
<i>boreale</i> Fr. . . . .	1038	<b>Hyoscyamus</b> Trn. . . . .	268	JASMINEÆ . . . . .	p. 85
<i>caespitosum</i> D. . . . .	1033	<i>niger</i> . . . . .	668	<i>Jasminum</i> . . . . .	235
<i>collinum</i> Rehb. . . . .	1033	<b>Hyoseris</b> . . . . .	382	<i>fruticosum</i> . . . . .	609
<i>dubium</i> Willd. . . . .	1031	<i>minima</i> . . . . .	988	JUGLANDEÆ . . . . .	p. 149
<b>Hieracium</b> Trn . . . . .	399	HYPERICINÆ . . . . .	p. 26	<b>Juglans</b> . . . . .	430
<i>fatidum</i> Krsch. . . . .	1022	<b>Hypericum</b> . . . . .	58	<i>nigra</i> . . . . .	1131
<i>Lactucella</i> Willr. . . . .	1031	<i>dubium</i> Lrs . . . . .	158	<i>regia</i> . . . . .	1130
<i>murorum</i> . . . . .	1034	<i>hirsutum</i> . . . . .	161	JUNCAGINEÆ . . . . .	p. 172
<i>oblongum</i> Jor. . . . .	1034	<i>humifusum</i> . . . . .	156	JUNCEÆ . . . . .	p. 175
<i>paludosum</i> . . . . .	1026	<i>perforatum</i> . . . . .	155	<b>Juncus</b> . . . . .	499
<i>Pelterianum</i> M. b. . . . .	1030	<i>montanum</i> . . . . .	160	<i>acutiflorus</i> Ehr. . . . .	1309
<i>petiolare</i> Jor. . . . .	1034	<i>polchrum</i> . . . . .	159	<i>angustifolius</i> Will. . . . .	1318
<i>petrogenes</i> Jor. . . . .	1034	<i>quadrangulare</i> Sm. . . . .	158	<i>articulatus</i> . . . . .	1310
<i>Pilosella</i> . . . . .	1034	<i>quadrangulum</i> . . . . .	157	<i>bulbosus</i> Aust. . . . .	1314
<i>praefaltum</i> Vill. . . . .	1032	<i>tetrapterum</i> Fr. . . . .	158	<i>bulfonius</i> . . . . .	1316
<i>pratensis</i> . . . . .	1024	<b>Hyppocharris</b> . . . . .	384	<i>cumpestris</i> . . . . .	1320
<i>sabaudum</i> . . . . .	1037	<i>glabra</i> . . . . .	991	<i>compressus</i> Jeq. . . . .	1314
<i>silvaticum</i> . . . . .	1035	<i>maculata</i> . . . . .	993	<i>communis</i> G. Mey. . . . .	1305
<i>tectorum</i> Krsch. . . . .	1028	<i>radicata</i> . . . . .	992	<i>conglomeratus</i> . . . . .	1306
<i>tridentatum</i> Fr. . . . .	1038	<b>Hyssopus</b> . . . . .	291	<i>effusus</i> . . . . .	1306
<i>umbellatum</i> . . . . .	1039	<i>officinalis</i> . . . . .	760	<i>fasciculatus</i> . . . . .	1316
<i>virens</i> Krsch. . . . .	1029	<b>Iberis</b> . . . . .	95	<i>filiformis</i> . . . . .	1308
<i>vulgatum</i> Fr. . . . .	1035	<i>amara</i> . . . . .	249	<i>fluitans</i> Lk. . . . .	1312
<b>Hierochloa</b> Gm. . . . .	509	<i>cumpestris</i> Willr. . . . .	252	<i>glauca</i> Ehr. . . . .	1307
<i>borealis</i> R. et Sch. . . . .	1387	<i>nudicaulis</i> . . . . .	244	<i>lamprocarpus</i> Ehr. . . . .	1310
<i>odorata</i> Willbg. . . . .	1387	<b>Ilex</b> . . . . .	231	<i>nemorosus</i> Pil. . . . .	1318
<b>Himantoglossum</b> Spr. . . . .	1239	<i>aquifolium</i> . . . . .	603	<i>obtusiflorus</i> Ehr. . . . .	1311
<i>hircinum</i> Spr. . . . .	1240	<i>heterophyllum</i> Rb. . . . .	c. 603	<i>ranarius</i> Pr. . . . .	b. 1316
HIPOCASTANEE . . . . .	p. 25	<i>senescens</i> Gd. . . . .	b. 603	<i>repens</i> . . . . .	b. 1312
<b>Hippocrepis</b> . . . . .	131	ILICINÆ . . . . .	p. 84	<i>silvaticus</i> Hds. . . . .	1309
<i>comosa</i> . . . . .	365	<b>Impatiens</b> . . . . .	43	<i>squarrosus</i> . . . . .	1313
<b>Hippophaë</b> . . . . .	420	Balsamina . . . . .	115	<i>subverticillatus</i> Hf. . . . .	1312
<i>rharnoides</i> . . . . .	1105	Noli-tangere . . . . .	113	<i>supinus</i> Meh. . . . .	1312
HIPPERIDEÆ Lk. . . . .	p. 146	<b>Imperatoria</b> . . . . .		<i>Tenageia</i> Ehr. . . . .	1315
<b>Hippuris</b> . . . . .	421	<i>silvestris</i> . . . . .	543	<i>uliginosus</i> Rth. . . . .	b. 1312
<i>vulgaris</i> . . . . .	1106	<b>Inula</b> . . . . .	318	<i>vernalis</i> Ehr. . . . .	1317
<b>Holcus</b> . . . . .	530	<i>britannica</i> . . . . .	959	<b>Juniperus</b> . . . . .	445
<i>arenaceus</i> Sep. . . . .	1432	<i>Coryza</i> DC. . . . .	957	<i>communis</i> . . . . .	1180
<i>lanatus</i> . . . . .	1433	<i>dyssenteria</i> . . . . .	955	<i>Sabina</i> . . . . .	1181
<i>mollis</i> . . . . .	1434	<i>Pulicariu</i> . . . . .	956	<i>virginiana</i> . . . . .	1182
<i>odoratus</i> . . . . .	1386	<i>salicina</i> . . . . .	958	<b>Kerria</b> DC. . . . .	149
<i>saccharatus</i> . . . . .	1435	<b>Iris</b> . . . . .	469	<i>japonica</i> DC. . . . .	407
<b>Holosticum</b> . . . . .	34	<i>germanica</i> . . . . .	1232	<b>Knaulia</b> . . . . .	336
<i>umbellatum</i> . . . . .	88	Pseudo-Acorus . . . . .	1234	<i>arvensis</i> Dub. . . . .	879
<b>Hordeum</b> . . . . .	548	<i>pumila</i> . . . . .	1233	<b>Kochia</b> . . . . .	
<i>distichum</i> . . . . .	1498	IRIDEÆ . . . . .	p. 162	<i>Scoparia</i> . . . . .	1063
<i>hexastichon</i> . . . . .	1501	<b>Isatis</b> . . . . .	99	<b>Krleria</b> Pers. . . . .	532
<i>murinum</i> . . . . .	1496	<i>tinctoria</i> . . . . .	257	<i>cristata</i> Pers. . . . .	1437
<i>pratense</i> Hds. . . . .	1497	<b>Isuardia</b> . . . . .	173	<i>glauca</i> DC. . . . .	b. 1437
<i>secalinum</i> Schb. . . . .	1497	<i>palustris</i> . . . . .	505		

<b>Labiatae</b> . . . p.	102	<b>Lavandula</b> Trn.	286	<b>Linaria</b> Trn.	276
<b>Lactuca</b> . . .	395	vera DC.	745	arvensis Dsf.	714
capitata B.	b. 1017	<b>Leersia</b> Sol.		Cymbalaria Mill.	717
crispa B.	d. 1017	<i>oryzoides</i> Sw.	1384	Elatine Dsf.	718
muralis . . .	1013	<b>Lemna</b> . . .	493	minor Dsf.	713
romana B.	c. 1017	gibba . . .	1296	<i>repens</i> Dsf.	716
perennis . . .	1014	minor . . .	1295	simplex DC.	715
saligna . . .	1015	polyrrhiza . . .	1297	spuria Mill.	719
sativa . . .	1017	trisulea . . .	1294	striata DC.	716
Scariola . . .	1016	<b>LEMNACEE</b> . . . p.	173	vulgaris Mill.	712
<i>silvestris</i> Lmk.	1016	<b>Lens</b> Trn.		<b>LINEE</b> . . . p.	20
virosa . . .	1018	<i>esculenta</i> Meh.	345	<b>Linosyris</b> DC.	373
<b>Lamium</b> . . .	301	<b>LENTIBULARIÆ</b> p.	100	vulgaris DC.	970
album . . .	778	<b>Leontodon</b> . . .	386	<b>Liatrum</b> . . .	38
amplexicaule.	775	autumnalis . . .	997	caharticum . . .	106
<i>hirsutum</i> Lmk.	779	hastilis . . .	996	<i>Radiola</i> . . .	109
incisum Wld.	776	bispidus . . .	995	tenuifolium . . .	167
<i>lavigatum</i> . . .	779	<i>Taraxacum</i> . . .	1009	usitatissimum . . .	108
maculatum . . .	779	<b>Leonurus</b> . . .	308	<b>Lisiera</b> R. Br.	486
mutabile . . . b.	779	Cardiaca . . .	797	ovata R. Br.	1275
purpureum . . .	779	Marrubiastrum . . .	798	<b>Lithospermum</b> Tn.	252
<b>Lampsana</b> Trn.	381	<b>Lepidium</b> . . .	97	arvense . . .	648
communis . . .	987	campestre R. Br.	252	officinale . . .	646
<b>Lappa</b> Trn.	344	Draba . . .	255	purpureo-cœruleum	647
<i>Burdaua</i> . . .	902	graminifolium . . .	253	<b>Lolium</b> . . .	547
glabra Lmk.	900	ruderalis . . .	254	arvense With.	b. 1493
major Grn.	899	sativum . . .	251	italicum R. Br.	1492
minor DC.	900	<i>scapiferum</i> Wall.	244	<i>linicolum</i> A. Br.	1495
<i>macrosperma</i> Wlfr.	901	<b>Lepigonum</b> Whlh.		multiflorum Lm. b.	1492
nemorosa Körn.	900	<i>rubrum</i> Whlh.	79	perenne . . .	1491
officinale Ah.	899	<i>segetalis</i> Whlh.	78	remotum Schnk.	1495
tomentosa Lmk.	902	<b>Lerouxia</b> Mët.		temulentum . . .	1494
<b>Lappula</b> Rupp.		<i>nemorum</i> . . .	593	tenuis . . . b.	1491
<i>Myosotis</i> Meh.	653	<b>Leucolum</b> . . .	471	<b>Lonicera</b> . . .	327
<b>Lapsana</b> v. <i>Lampsana</i>		vernum . . .	1235	caprifolium . . .	847
<b>Larix</b> Trn.	442	<b>Leucorehis</b> E. Mey.		Periclymenum . . .	846
decidua Mill.	1175	<i>albida</i> E. Mey.	1263	Xylosteum . . .	845
<i>europaea</i> DC.	1175	<b>Levisticum</b> Koch.	196	<b>LORANTHACEE</b> . . . p.	80
<b>Laserpitium</b> . . .	205	officinale Koch.	541	<b>Loroglossum</b> Rich.	474
latifolium . . .	534	<b>Libanotis</b> Crtz.	191	<i>anthropophorum</i> R.	1239
<b>Lathraea</b> . . .	285	montana All.	535	hireinum R.	1240
squamaria . . .	744	<b>Libertia</b> Dmtr.		<b>Lotus</b> . . .	112
<b>Lathyrus</b> . . .	127	<i>arduennensis</i> Lj.	1474	corniculatus . . .	290
Aphaca . . .	349	<b>Ligusticum</b>		major Sm.	291
hirsutus . . .	352	<i>Levisticum</i> . . .	541	tenuis Kit.	b. 290
latifolius . . .	357	<i>Meum</i> . . .	539	uliginosus Sch.	291
<i>macrorrhizus</i> Wim!	358	<b>Ligustrum</b> Trn.	232	<b>Lunaria</b> . . .	87
<i>montanus</i> Brnd.	358	vulgare . . .	604	<i>anna</i> . . .	232
<i>tiger</i> Brnd.	359	<b>LILIACEE</b> . . . p.	157	biennis Meh.	232
Nissolia . . .	350	<b>Lilium</b> . . .	454	<i>odorata</i> Meh.	231
odoratus . . .	356	bulbiferum . . .	1193	rediviva . . .	231
pratensis . . .	354	candidum . . .	1194	<b>Lupinus</b> . . .	108
sativus . . .	351	<b>Limonanthemum</b> G.	240	angustifolius . . .	284
<i>silvestris</i> . . .	355	<i>nymphoides</i> Lk.	615	luteus . . .	285
tuberosus . . .	353	<b>Limodorum</b> Trn.	482	<b>Luzula</b> DC.	500
velutinus DC.	b. 354	abortivum Sw.	1268	<i>albida</i> DC.	1319
<i>vernus</i> Brnd.	360	<b>Limosella</b> . . .	271	angustifolia Wlf.	1318
		aquatica . . .	698	campestris DC.	1320

<b>Luzula</b> DC. . . . . 500	<b>Malva</b> . . . . . 46	<b>Mentha</b> . . . . . 288
<i>congesta</i> Lej. <i>b.</i> 1324	<i>moschata</i> . . . . . 130	<i>acutifolia</i> Sm. <i>b.</i> 750
<i>maxima</i> DC. . . . . 1319	<i>neglecta</i> Wllr. . . . . 132	<i>aquatica</i> . . . . . 753
<i>multiflora</i> Lej. . . . . 1321	<i>rotundifolia</i> . . . . . 132	<i>aquatica-silvestris</i> M. 753
<i>nemorosa</i> E. M. . . . . 1318	<i>silvestris</i> . . . . . 131	<i>arvensis</i> . . . . . 754
<i>pilosa</i> Willd. . . . . 1317	<b>MALVACEÆ</b> . . . . . p. 23	<i>austriaca</i> Jcq. <i>e.</i> 754
<i>silvatica</i> Gud. . . . . 1319	<b>Marrubium</b> . . . . . 306	<i>candicans</i> Crtz. <i>b.</i> 747
<i>vernalis</i> DC. . . . . 1317	<i>vulgare</i> . . . . . 795	<i>crispa</i> . . . . . 752
<b>Lychnis</b> Trn. . . . . 25	<b>Mathiola</b> DC. . . . . 71	<i>crispata</i> Schd. <i>b.</i> 749
<i>chalcedonica</i> . . . . . 73	<i>annua</i> Br. . . . . 188	<i>cordifolia</i> Opz. <i>c.</i> 749
<i>dioica</i> . . . . . 72	<b>Matricaria</b> . . . . . 354	<i>gentilis</i> . . . . . 750
<i>Flos-Cuculi</i> . . . . . 74	<i>Chamomilla</i> . . . . . 927	<i>gratissima</i> Willd. <i>e.</i> 747
<i>Githago</i> Lmk. . . . . 77	<i>inodora</i> . . . . . 928	<i>hirsuta</i> . . . . . 753
<i>silvestris</i> . . . . . 71	<i>pyrethrum</i> . . . . . 928	<i>nemorosa</i> Wld. <i>c.</i> 747
<i>tomentosa</i> . . . . . 75	<i>suaveolens</i> . <i>b.</i> 927	<i>nepetoides</i> Lej. <i>b.</i> 753
<i>Viscaria</i> . . . . . 76	<b>Medicago</b> . . . . . 119	<i>parietariaefolia</i> Bk. <i>f.</i> 754
<b>Lycium</b> . . . . . 265	<i>denticulata</i> Wld. 311	<i>piperita</i> . . . . . 752
<i>barbarum</i> . . . . . 665	<i>Echinus</i> DC. . . . . 309	<i>pubescens</i> Willd. 751
<b>Lycopersteum</b> Trn. 262	<i>falcata</i> . . . . . 305	<i>Pulegium</i> . . . . . 755
<i>esculentum</i> Mill. 662	<i>falcato-sativa</i> Reh. 307	<i>rotundifolia</i> . . . . . 748
<b>Lycopsils</b> . . . . . 249	<i>intertexta</i> Dmtr. 309	<i>Rothii</i> Nees. . <i>c.</i> 754
<i>arvensis</i> . . . . . 635	<i>lupulina</i> . . . . . 304	<i>rugosa</i> Rth. . <i>b.</i> 748
<b>Lysimachia</b> . . . . . 226	<i>maculata</i> W. . . . . 310	<i>rubra</i> Sm. . <i>d.</i> 754
<i>nemorum</i> . . . . . 593	<i>media</i> Pers. . . . . 307	<i>sativa</i> Dm. . <i>b.</i> 754
<i>Nummularia</i> . . . . . 592	<i>minima</i> Lmk. . . . . 308	<i>silvestris</i> . . . . . 747
<i>paludosus</i> Bing. . . . . 595	<i>polymorpha</i> . . . . . 308	<i>tomentilla</i> Optz. <i>b.</i> 755
<i>punctata</i> . . . . . 594	<i>saliva</i> . . . . . 306	<i>velutina</i> Lej. <i>d.</i> 747
<i>suaveolens</i> Lch. 592	<i>versicolor</i> T. . . . . 307	<i>viridis</i> . . . . . 749
<i>vulgaris</i> . . . . . 595	<i>Willdenowii</i> B. <i>b.</i> 304	<b>Mezanthus</b> Trn. 239
<b>LYTHRARIÆ</b> . . . . . p. 51	<b>Melampyrum</b> Tr. 279	<i>nymphoides</i> . . . . . 615
<b>Lythrum</b> . . . . . 133	<i>arvense</i> . . . . . 727	<i>trifoliata</i> . . . . . 614
<i>hyssopifolia</i> . . . . . 368	<i>barbatum</i> . <i>b.</i> 727	<b>Mercurialis</b> Trn. 426
<i>salicaria</i> . . . . . 367	<i>cristatum</i> . . . . . 726	<i>annua</i> . . . . . 1123
<b>Madia</b> Mol. . . . . 350	<i>pratense</i> . . . . . 728	<i>perennis</i> . . . . . 1124
<i>sativa</i> Mol. . . . . 920	<b>Melandryum</b> Röhl. 24	<b>Mespilus</b> . . . . . 161
<b>Malanthemum</b> Wg. 466	<i>album</i> Gk. . . . . 72	<i>Amelanchier</i> . . . . . 482
<i>bifolium</i> DC. . . . . 1229	<i>diurnum</i> . . . . . 71	<i>Cotoneaster</i> . . . . . 481
<b>Malachium</b> Fr. . . . . 35	<i>noctiflorum</i> Fr. . . . . 69	<i>germanica</i> . . . . . 477
<i>aquaticum</i> Fr. . . . . 104	<i>pratense</i> Röhl. . . . . 72	<i>monogyne</i> W. . . . . 479
<i>arenaria</i> God. <i>b.</i> 104	<i>silvestre</i> Rhl. . . . . 71	<i>oxyacantha</i> Grt. 478
<b>Malus</b> Trn. . . . . 167	<b>Melica</b> . . . . . 536	<b>Meum</b> Trn. . . . . 194
<i>acerba</i> Mrt. . . . . 486	<i>ciliata</i> . . . . . 1441	<i>athamanticum</i> Jcq. 539
<i>baccata</i> . . . . . 488	<i>cærulea</i> . . . . . 1444	<b>Michelaria</b> Dmtr.
<i>communis</i> Poir. 487	<i>nebrodensis</i> Parl. 1441	<i>brownoides</i> Dmtr. 1474
<i>costata</i> Sch. et M. 487	<i>nutans</i> . . . . . 1443	<b>Micropus</b> . . . . . 363
<i>dasyphylla</i> Brk. <i>b.</i> 487	<i>uniflora</i> Rtz. . . . . 1442	<i>erectus</i> . . . . . 945
<i>luciliburgensis</i> <i>c.</i> 487	<b>Melilotus</b> Trn. . . . . 118	<b>Millium</b> . . . . . 522
<i>Megamilla</i> S. et M. 487	<i>alba</i> Lmk. . . . . 801	<i>effusum</i> . . . . . 1413
<i>mitis</i> Will. . . . . 487	<i>arvensis</i> Wall. . . . . 298	<b>Muhlenbergia</b> . . . . . 30
<i>paradisiaca</i> . . . . . 487	<i>cærulea</i> Lmk. . . . . 303	<i>trinervia</i> Chr. . . . . 87
<i>Platymela</i> M. . . . . 487	<i>leucantha</i> DC. . . . . 300	<b>Muenchia</b> Ehr. . . . . 35
<i>Prasomilla</i> Pers. 487	<i>macrorrhiza</i> Pers. 299	<i>erecta</i> Fl. Wett. 103
<b>Malva</b> . . . . . 46	<i>parviflora</i> Desf. . . . . 302	<b>Molinia</b> Mch. . . . . 535
<i>Alcea</i> . . . . . 129	<i>Melissa</i> . . . . . 297	<i>cærulea</i> Mch. . . . . 1444
<i>bismalva</i> Lej. <i>b.</i> 129	<i>Acinos</i> Benth. . . . . 767	<b>Monotropa</b> . . . . . 57
<i>crispa</i> . . . . . 133	<i>Calanintha</i> . . . . . 768	<i>hypophagea</i> Will. <i>b.</i> 154
<i>fastigiata</i> Lej. <i>b.</i> 129	<i>Clinopodium</i> Benth. 770	<i>hypopitys</i> . . . . . 154
	<i>officinalis</i> . . . . . 771	<b>MONOTROPEÆ</b> . . . . . p. 26



<b>Montia</b> Mch. . . . .	136	<b>Nasturtium</b> R. Br. . . . .	76	<b>Ophrys</b> . . . . .	477
<i>arvensis</i> Wlhr. . . . .	372	<i>amphibium</i> R. Br. . . . .	206	<i>activatis</i> Lmk. . . . .	1276
<i>fontana</i> Lj. . . . .	372	<i>aquaticum</i> Wlhr. . . . .	204	<i>anthropophora</i> . . . . .	1239
<i>minor</i> Gmel. . . . .	372	<i>fontanum</i> Asehr. . . . .	204	<i>apifera</i> Hds. . . . .	1259
<i>rivularis</i> Gm. . . . .	373	<i>officinale</i> R. Br. . . . .	204	<i>apiculata</i> Dmtr. <i>b.</i>	1259
<b>MOREE</b> . . . . .	p. 144	<i>palustre</i> DC. . . . .	207	<i>arachnites</i> Reich. . . . .	1238
<b>Morus</b> Trn. . . . .	411	<i>silvestre</i> R. Br. . . . .	205	<i>aranifera</i> Hds. . . . .	1257
<i>alba</i> . . . . .	1092	<b>Nemophar</b> Hyn. . . . .		<i>bombiflora</i> Lk. <i>b.</i>	1259
<i>nigra</i> . . . . .	1093	<i>luteum</i> Hyn. . . . .	170	<i>fluciflora</i> Ség. . . . .	1258
<b>Muscari</b> Trn. . . . .	459	<b>Neselia</b> Reh. . . . .	485	<i>insectifera d.</i> . . . .	1257
<i>comosum</i> Mill. . . . .	1218	<i>activatis</i> DC. . . . .	1276	<i>insectifera</i> . . . . .	1256
<b>Myagrum</b> Trn. . . . .		<i>latifolia</i> Rich. . . . .	1275	<i>insectifera i.</i> . . . .	1259
<i>paniculatum</i> . . . . .	258	<i>nidus-avis</i> Rich. . . . .	1274	<i>insectifera h.</i> . . . .	1258
<i>sativum</i> . . . . .	245	<i>orata</i> Bl. et F. . . . .	1275	<i>Monorchis</i> . . . . .	1260
<b>Myosotis</b> . . . . .	251	<b>Nepeta</b> . . . . .	299	<i>muscifera</i> Hds. . . . .	1256
<i>arvensis</i> Schd. . . . .	614	<i>Cataria</i> . . . . .	773	<i>myoides</i> Jeq. . . . .	1256
<i>arvensis</i> . . . . .	614	<i>Glechoma</i> Bnth. . . . .	774	<i>Nidus-avis</i> Crtz. . . . .	1274
<i>caespitosa</i> Sehtz. . . . .	639	<b>Nestia</b> Desv. . . . .	100	<i>orata</i> . . . . .	1275
<i>collina</i> Rehb. . . . .	642	<i>paniculata</i> Desv. . . . .	258	<i>pseudo-speculum</i> DC. . . . .	1257
<i>hispida</i> Schl. . . . .	642	<b>Nicotiana</b> . . . . .	206	<b>Opilismenus</b> P. B. . . . .	512
<i>intermedia</i> Lk. . . . .	641	<i>rusticana</i> . . . . .	666	<i>Crus-galli</i> Kth. . . . .	1389
<i>laxiflora</i> Rb. <i>d.</i>	637	<b>Nigella</b> Trn. . . . .	11	<b>ORCHIDEE</b> . . . . .	p. 163
<i>lingulata</i> Lhm. . . . .	639	<i>arvensis</i> . . . . .	40	<b>Orehis</b> . . . . .	476
<i>multiflora</i> Mrt. <i>c.</i>	637	<i>damascena</i> . . . . .	41	<i>arbolina</i> . . . . .	1268
<i>palustris</i> With. . . . .	637	<i>sativa</i> . . . . .	42	<i>albida</i> Sc. . . . .	1263
<i>perennis</i> Mch. . . . .	637	<b>Nuphar</b> Sm. . . . .	63	<i>angustifolia</i> Wm. <i>b.</i>	1255
<i>repens</i> Rb. . . . .	637	<i>luteum</i> Sm. . . . .	170	<i>aphylla</i> Sch. . . . .	1267
<i>sparsiflora</i> Phl. . . . .	645	<b>Nymphæa</b> Trn. . . . .	64	<i>bifolia b.</i> . . . .	1265
<i>silvatica</i> Hfm. . . . .	640	<i>alba</i> . . . . .	171	<i>brachygllossa</i> Wall. . . . .	1265
<i>stricta</i> Lk. . . . .	644	<i>lutea</i> . . . . .	171	<i>cercopitheca</i> Lmk. . . . .	1243
<i>strigulosa</i> Rb. . . . .	638	<b>NYPHÆACEE</b> . . . . .	p. 28	<i>cinceca</i> Shrck. . . . .	1245
<i>versicolor</i> Pers. . . . .	642	<b>Odontites</b> Hll. . . . .	281	<i>condensata</i> Dsf. . . . .	1241
<b>Myosurus</b> Dill. . . . .	5	<i>lutea</i> . . . . .	733	<i>Conopsea</i> . . . . .	1261
<i>minimus</i> . . . . .	14	<i>rubra</i> . . . . .	731	<i>coriophora</i> . . . . .	1247
<b>Myriophyllum</b> Vail. . . . .	175	<i>serotina</i> Lmk. . . . .	732	<i>divaricata</i> Rich. . . . .	1255
<i>alternifolium</i> DC. . . . .	511	<i>verna</i> Reh. . . . .	731	<i>fusca</i> Seg. . . . .	1258
<i>intermedium</i> Kch. <i>b.</i>	509	<b>Oenanthe</b> . . . . .	190	<i>fusca</i> Coss. . . . .	<i>b.</i> 1244
<i>pectinata</i> Wld. <i>c.</i>	509	<i>aquatica</i> . . . . .	534	<i>fusca</i> Jacq. . . . .	1244
<i>spicatum</i> . . . . .	510	<i>fistulosa</i> . . . . .	532	<i>fusco-Rivini</i> T. <i>b.</i>	1244
<i>verticillatum</i> . . . . .	509	<i>pencedanifolia</i> Poll. . . . .	533	<i>galeata</i> P. . . . .	1245
<b>Myrrhis</b> Sep. . . . .	213	<i>Phellandrium</i> Lmk. . . . .	534	<i>hircina</i> Crntz. . . . .	1240
<i>bulbosa</i> Sep. . . . .	566	<b>Oenothera</b> . . . . .	172	<i>hybrida</i> Bng. <i>b.</i>	1244
<i>hirsuta</i> All. . . . .	567	<i>biennis</i> . . . . .	504	<i>incarnata</i> . . . . .	1255
<i>odorata</i> Sep. . . . .	568	<b>OLEINEE</b> . . . . .	p. 84	<i>Jacquini</i> God. <i>b.</i>	1244
<i>temula</i> All. . . . .	565	<b>Omphalodes</b> Trn. . . . .	257	<i>latifolia</i> . . . . .	1253
<b>NAIADÉE</b> . . . . .	p. 173	<i>verna</i> Mch. . . . .	655	<i>laxiflora</i> Lmk. . . . .	1251
<b>Najas</b> . . . . .	492	<b>ONAGRARIÉE</b> . . . . .	p. 69	<i>maculata</i> . . . . .	1252
<i>major</i> All. . . . .	1293	<b>Onobrychis</b> Trn. . . . .	132	<i>mascula</i> . . . . .	1250
<i>mariana</i> . . . . .	1293	<i>saliva</i> Lk. . . . .	366	<i>militaris c.</i> Ldh. <i>b.</i>	1244
<b>Narcissus</b> . . . . .	470	<i>viçiaefolia</i> Sep. . . . .	366	<i>militaris b. c.</i> . . . .	1244
<i>poeticus</i> . . . . .	1236	<b>Ononis</b> . . . . .	110	<i>militaris</i> . . . . .	1245
<i>Pseudo-Narcissus</i>	1235	<i>campestris</i> Kch. . . . .	287	<i>militaris e.</i> . . . .	1246
<b>Nardus</b> . . . . .	552	<i>procurrens</i> Wlhr. . . . .	288	<i>militaris</i> . . . . .	1245
<i>stricta</i> . . . . .	1511	<i>repens</i> . . . . .	288	<i>minima</i> Md. . . . .	<i>c.</i> 1250
<b>Narthecium</b> Mhr. . . . .	461	<i>spinosa</i> . . . . .	287	<i>mimusops</i> Th. <i>b.</i>	1244
<i>ossifragum</i> Hds. . . . .	1221	<b>Onopordon</b> . . . . .	338	<i>montana</i> Sm. . . . .	1265
		<i>Acanthium</i> . . . . .	884	<i>moravica</i> Jeq. <i>c.</i>	1244
				<i>Morio</i> . . . . .	1248

<b>Orchis</b> . . . . .	476	<b>Orobus</b> . . . . .	128	<b>Persica</b> Trn. . . . .	143
<i>odoratissima</i> . . . . .	1262	tuberosus . . . . .	358	vulgaris Mil. . . . .	390
nervata Md. . . . .	1245	vernus . . . . .	361	<b>Petasites</b> Trn. . . . .	380
pallens . . . . .	1249	<b>Oryza</b> A. Br. . . . .	508	officinalis Much. . . . .	986
purpurea Hds. . . . .	1244	clandestina A. Br. . . . .	1384	<b>Petroselinum</b> Hfm. . . . .	184
<i>pyramidalis</i> Rehb. . . . .	1241	<b>OXALIDÆE</b> DC. p. . . . .	21	salivum Hfm. . . . .	522
<i>Rivini</i> G. . . . .	1245	<b>Oxalis</b> . . . . .	40	<b>Peucedanum</b> . . . . .	200
sambucina . . . . .	1254	acetosella . . . . .	110	<i>carvifolium</i> . . . . .	545
<i>Scopoli</i> Timb. . . . .	1243	stricta . . . . .	111	Cervaria Lap. . . . .	546
<i>Simia</i> Vill. . . . .	1243	<b>Oxycoccus</b> Pers. . . . .	315	Chabraei Reh. . . . .	545
Simia Lk. . . . .	1246	palustris Pers. . . . .	816	Oreoselinum Mch. . . . .	548
speciosa Hst. . . . .	1250	<b>Paeonia</b> Trn. . . . .	46	ramosum Mch. . . . .	547
<i>tephrosanthus</i> Vil. . . . .	1246	officinalis . . . . .	49	<i>Silvaus</i> . . . . .	540
Traunsteineri St. b. . . . .	1253	<b>Panicum</b> . . . . .	516	<b>Phalangium</b> Trn. . . . .	460
tridentata Sep. . . . .	1243	<i>Crus-galli</i> . . . . .	1389	Liliago Schb. . . . .	1220
ustulata . . . . .	1242	<i>filiforme</i> Gk. . . . .	1391	ramosum Lmk. . . . .	1219
<i>variegata</i> All. . . . .	1238	<i>glaucum</i> . . . . .	1395	<b>Phalaris</b> . . . . .	511
<i>viridis</i> Crtz. . . . .	1264	<i>italicum</i> . . . . .	1396	<i>arundinaceum</i> . . . . .	1388
<i>zophora</i> Th. . . . .	1246	miliaceum . . . . .	1397	canariensis . . . . .	1387
<b>Origanum</b> Trn. . . . .	292	<i>sanguinale</i> . . . . .	1390	<i>oryzoides</i> . . . . .	1384
megastachyum Br. b. . . . .	761	<i>verticillatum</i> . b. . . . .	1393	phleodes . . . . .	1403
Majorana . . . . .	762	<i>viride</i> . . . . .	1393	<b>Phaseolus</b> . . . . .	121
vulgare . . . . .	761	<b>Papaver</b> Trn. . . . .	65	multiflorus Lmk. . . . .	329
<b>Oriaya</b> Hff. . . . .	207	Argemone . . . . .	175	vulgaris . . . . .	328
grandiflora Hff. . . . .	556	dubium . . . . .	176	— volubilis a. . . . .	328
<b>Ormenis</b> Gay. . . . .	352	hybridum . . . . .	174	— nanus . b. . . . .	328
nobilis Gay. . . . .	923	Lecoquii C. . . . .	177	<b>Phelipea</b> Mey. . . . .	283
<b>Ornithogalum</b> . . . . .	455	Rhœas . . . . .	173	æerulea C. A. My. . . . .	735
<i>arvense</i> . . . . .	1199	sitigerum DC. b. . . . .	172	ramosa C. A. My. . . . .	736
<i>minimum</i> . . . . .	1200	somniferum . . . . .	172	<b>Phellandrium</b> . . . . .	
nutans . . . . .	1197	<b>PAPAVERACEÆ</b> p. . . . .	28	<i>aquaticum</i> . . . . .	534
<i>pratense</i> Whlb. . . . .	1198	<b>PAPILIONACEÆ</b> p. . . . .	41	<b>PHILADELPHÆE</b> p. . . . .	69
pyrainicum . . . . .	1195	<b>Parietaria</b> Trn. . . . .	416	<b>Philadelphus</b> . . . . .	169
<i>sylvaticum</i> . . . . .	1201	<i>diffusa</i> M. K. . . . .	1101	coronarius . . . . .	493
<i>sulfureum</i> R. Sch. . . . .	1195	<i>erecta</i> M. K. . . . .	1100	<b>Phicum</b> . . . . .	518
umbellatum . . . . .	1196	<i>julica</i> Hfm. . . . .	1101	Bœhmeri Wib. . . . .	1403
<b>Ornithopus</b> . . . . .	130	officinalis . . . . .	1100	nodosum . . . . .	b. 1402
perpusillus . . . . .	363	ramiflora Mnch. . . . .	1101	<i>phalaroides</i> Koch. . . . .	1403
sativus Broth. . . . .	364	<b>Paris</b> . . . . .	467	pratense . . . . .	1402
<b>Orobanche</b> . . . . .	284	quadrifolia . . . . .	1230	stoloniferum . c. . . . .	1402
alsatica F. Schltz. . . . .	742	<b>Parnassia</b> Trn. . . . .	60	<b>Phragmites</b> Trin. . . . .	533
<i>caryophyllacea</i> Sm. . . . .	739	palustris . . . . .	164	communis Trin. . . . .	1438
<i>cœrulea</i> Vill. . . . .	735	<b>PARONYCHIÆE</b> p. . . . .	52	nigricans Mét. b. . . . .	1438
elatior Sutt. . . . .	738	<b>Passerina</b> . . . . .		<i>vulgaris</i> . . . . .	1438
Epithymum DC. . . . .	740	<i>annua</i> Wikstr. . . . .	1103	<b>Physalis</b> . . . . .	263
Galii Duby. . . . .	739	<b>Pastinaca</b> Trn. . . . .	202	Alkekengi . . . . .	663
<i>Genistæ</i> . . . . .	737	sativa . . . . .	551	<b>Phyteuma</b> . . . . .	318
minor Sutt. . . . .	743	silvestris . . . . .	550	nigrum Sm. . . . .	b. 830
<i>ramosa</i> . . . . .	736	<b>Pauownia</b> L. et Z. p. . . . .	97	orbiculare . . . . .	829
Rapum Th. . . . .	737	imperialis S. et Z. p. . . . .	97	spicatum . . . . .	830
<i>sparsiflora</i> Wall. . . . .	740	<b>Pedicularis</b> Trn. . . . .	277	<b>Picea</b> Lk. . . . .	443
Teucriti F. Schtz. . . . .	741	palustris . . . . .	720	alba Mich. . . . .	1177
<b>OROBANCHEÆ</b> p. . . . .	101	silvatica . . . . .	721	<i>alta</i> My. . . . .	1178
<b>Orobus</b> . . . . .	128	<b>Peplis</b> . . . . .	134	exelsa Lk. . . . .	1176
<i>Aphaca</i> Döll. . . . .	349	Portula . . . . .	369	<i>vulgaris</i> Lk. . . . .	1176
niger . . . . .	359	<b>Persica</b> Trn. . . . .	143	<b>Pteris</b> Juss. . . . .	387
<i>Nissolii</i> Döll. . . . .	350	hevis DC. . . . .	390	hieracioides . . . . .	998
tenuifolius Rth. b. . . . .	358				

<b>Pimpinella</b> . . . . .	188	<b>Platanthera</b> Rich	430	<b>Polygonum</b> . . . . .	409
Anisum . . . . .	530	<i>solstitialis</i> Bög. . . . .	1265	Bellardi All. . . . .	1087
dissectifolia Wllr. <i>b.</i>	529	<i>viridis</i> Lindl. . . . .	1264	Bistorta . . . . .	1079
magna . . . . .	528	PLUMBAGINEÆ . . . . .	83	Convulvulus . . . . .	1088
poterifolia Wllr. <i>c.</i>	529	<b>Poa</b> . . . . .	542	cuspidatum S. et Z.	1078
Saxifraga . . . . .	529	<i>acroides</i> Köl. . . . .	1445	duroetorum . . . . .	1089
<b>Pinus</b> . . . . .	441	<i>altissima</i> Much. . . . .	1448	Fagopyrum . . . . .	1090
<i>Abies</i> Dur. . . . .	1178	anceps Dmtr. . . . .	1459	Hydropiper . . . . .	1085
<i>Abies</i> . . . . .	1476	angustifolia . . . . .	1459	incanum Sm. <i>c.</i>	1081
austriaca Höss. . . . .	1172	annua . . . . .	1453	lapathifolium. . . . .	1084
<i>excelsa</i> Link. . . . .	1176	<i>aquativa</i> . . . . .	1448	<i>lariflorum</i> Wllr. . . . .	1083
<i>Larix</i> . . . . .	1175	bulbosa . . . . .	1454	minus Hds. . . . .	1084
<i>maritima</i> . . . . .	1173	Chaixii Vill. . . . .	1457	mite Schk. . . . .	1083
<i>Picea</i> . . . . .	1178	compressa . . . . .	1460	nodosum Pers. <i>b.</i>	1081
<i>Picea</i> Dur. . . . .	1176	<i>cristata</i> . . . . .	1437	Persicaria . . . . .	1082
Pinaster Sol. . . . .	1173	<i>dura</i> Sep. . . . .	1452	<i>pusillum</i> . . . . .	1084
silvestris . . . . .	1171	<i>fertilis</i> Hst. . . . .	1456	<i>Sieboldi</i> Z. . . . .	1078
strobis . . . . .	1174	fluitans Sep. . . . .	1446	<i>tataricum</i> . . . . .	1191
<b>Pinus</b> Trn. . . . .	166	Langeana Rehb <i>b.</i>	1460	POMACEÆ . . . . .	66
<i>acutata</i> DC. . . . .	486	Lejeuni Dmtr. <i>c.</i>	1459	<b>Populus</b> Trn. . . . .	437
Achras Wll. . . . .	485	memoralis . . . . .	1455	alba . . . . .	1159
<i>aucuparia</i> . . . . .	490	pratensis . . . . .	1459	<i>alba-tremula</i> Wim.	1160
<i>Aria</i> Ehrh. . . . .	492	<i>rigida</i> . . . . .	1476	balsamifera . . . . .	1164
Bergamotia Ruel. <i>c.</i>	485	<i>sativa</i> Poll. . . . .	1449	canadensis Dsf. . . . .	1162
communis . . . . .	485	<i>scabra</i> Ehr. . . . .	1458	canescens Sm. . . . .	1160
<i>Cydonia</i> . . . . .	485	serotina Ehr. . . . .	1456	denudata Hlg. <i>b.</i>	1159
<i>domestica</i> Sm. . . . .	489	<i>silvestica</i> Vill. . . . .	1457	<i>delatata</i> Ait. . . . .	1162
<i>Falerna</i> Pl. . . . .	485	<i>strigosa</i> Köl. . . . .	1459	<i>fastigiata</i> . . . . .	1162
<i>Malus</i> . . . . .	487	<i>sudetica</i> Hnk. . . . .	1457	<i>monolifera</i> Ait. . . . .	1163
rufescens Pers. <i>c.</i>	485	trivialis . . . . .	1458	nigra . . . . .	1162
<i>sativa</i> DC. . . . .	485	vivipara . . . . .	1454	pyramidalis Rz. <i>b.</i>	1162
tomentosa Kch. <i>b.</i>	485	<b>Podospermum</b> DC.	391	tremula . . . . .	1161
<i>torminatis</i> Ehr. . . . .	491	calectrapifolium id.	1007	villosa Rehb. <i>b.</i>	1161
<b>Pisum</b> Trn. . . . .	126	laciniatum DC. . . . .	1006	<b>Portulaca</b> Trn. . . . .	135
arvense . . . . .	348	muricatum DC. . . . .	1008	oleracea . . . . .	370
humile Poir. <i>c.</i>	347	<i>residifolium</i> . . . . .	1007	<i>sativa</i> Hw. . . . .	371
macrocarpum Sr. <i>b.</i>	347	POLEMONIACEÆ. p.	87	PORTULACEÆ . . . . .	52
quadratum . . . . .	347	<b>Polemonium.</b> . . . . .	244	POTAMEÆ . . . . .	172
saccharatum Sr. <i>a.</i>	347	ceruleum . . . . .	626	<b>Potamogeton</b> Trn.	490
sativum . . . . .	347	<b>Polygala</b> . . . . .	50	alpinus Blb. . . . .	1282
PLANTAGINEÆ. p.	84	<i>amara</i> Jeq. . . . .	144	compressus . . . . .	1288
<b>Plantago</b> . . . . .	230	austriaca Clz. . . . .	144	crispus . . . . .	1286
arenaria W. K. . . . .	602	calcarea Schllz. . . . .	143	densus . . . . .	1287
intermedia Gil. <i>b.</i>	599	comosa Schk. . . . .	142	fluitans Rth. . . . .	1281
lanceolata . . . . .	601	oxyptera Rb. <i>b.</i>	141	gramineus . . . . .	1283
major . . . . .	599	vulgaris . . . . .	141	heterophyllus DC. <i>b.</i>	1283
media . . . . .	600	POLYGALÆÆ . . . . .	24	lucens . . . . .	1284
minima DC. . . . .	599	<b>Polycnemum</b> . . . . .	402	nataus . . . . .	1279
<i>ramosa</i> Asch. . . . .	602	arvense Df. . . . .	1045	<i>oblongus</i> Vill. . . . .	1280
PLATANEÆ . . . . .	154	<b>Polygonatum</b> Trn.	465	obtusifolius M. K.	1289
<b>Platanus</b> . . . . .	440	<i>mutiale</i> All. . . . .	1225	pectinatus . . . . .	1291
acerifolia Wld. . . . .	1169	multiflorum All. . . . .	1227	perfoliatus . . . . .	1285
occidentalis . . . . .	1170	officinale All. . . . .	1228	polygonifolius Prt.	1280
orientalis . . . . .	1168	verticillatum. . . . .	1226	pusillum . . . . .	1290
<b>Platanthera</b> Rich.	480	POLYGONÆÆ . . . . .	441	<i>rufescens</i> Schrd. . . . .	1282
<i>albida</i> Ldl. . . . .	1263	<b>Polygonum</b> . . . . .	409	<i>zosterefolius</i> Schm.	1288
bifolia Rehb. . . . .	1265	amphibium . . . . .	1080	<b>Potentilla</b> . . . . .	154
chlorantha Cust. . . . .	1266	aviculare . . . . .	1086	alpestris Hll. . . . .	449

<b>Potentilla</b> . . . . .	154	<b>Pulegium</b> Mill.		<b>Ranunculus</b> . . . . .	6
<i>Anserina</i> . . . . .	450	<i>vulgare</i> Mill. . . . .	755	<i>Lingua</i> . . . . .	24
<i>argentea</i> . . . . .	453	<b>Pultearia</b> Grtn . . . . .	367	<i>nemorosus</i> DC. . . . .	28
<i>aurea</i> . . . . .	449	<i>bellidiflora</i> Wlhr. . . . .	965	<i>parviflorus</i> . . . . .	32
<i>fragaria</i> Gke. . . . .	446	<i>dysenterica</i> Grtn. . . . .	955	<i>parvulus</i> Lej. <i>b.</i> . . . . .	31
<i>fragaristrum</i> Ehr. . . . .	446	<i>vulgaris</i> Grtn. . . . .	956	<i>peucedanifolius</i> All. . . . .	19
<i>memoralis</i> Nstl. . . . .	455	<b>Pulmonaria</b> Trn. . . . .	253	<i>philonotis</i> Ehl. . . . .	31
<i>palustris</i> Nstl. . . . .	445	<i>angustifolia</i> . . . . .	650	<i>platanifolius</i> . . . . .	22
<i>procumbens</i> Hth. . . . .	455	<i>azurea</i> Bess. . . . .	650	<i>repens</i> . . . . .	29
<i>recta</i> . . . . .	454	<i>mollis</i> Wlfr. . . . .	651	<i>sardous</i> Criz. . . . .	31
<i>reptans</i> . . . . .	448	<i>obscura</i> Dmtr. <i>b.</i> . . . .	649	<i>secleratus</i> . . . . .	21
<i>rupestris</i> . . . . .	451	<i>officinalis</i> . . . . .	649	<i>trichophyllus</i> Ch. . . . .	18
<i>sabauda</i> DC. . . . .	449	<i>tuberosa</i> Dmtr. . . . .	650	<i>tripartitus</i> DC. . . . .	17
<i>sterilis</i> . . . . .	446	<b>Pulsatilla</b> Trn. . . . .		<b>Raphanistrum</b> Trn	
<i>supina</i> . . . . .	452	<i>vulgaris</i> Mill. . . . .	6	<i>Lampasna</i> Grm. . . . .	229
<i>silvestris</i> Nk. . . . .	456	<b>Pyrethrum</b> Grtn. . . . .	355	<b>Raphanus</b> Trn . . . . .	
<i>Tormentilla</i> Shk. . . . .	456	<i>canescens</i> Lj. <i>b.</i> . . . .	929	<i>niger</i> DC. . . . . <i>b.</i> . . . .	230
<i>verna</i> . . . . .	447	<i>corymbosum</i> Willd. . . . .	931	<i>radicula</i> DC. . . . . <i>a.</i> . . . .	230
<b>Poterium</b> . . . . .	160	<i>Leucanthemum</i> C. . . . .	929	<i>Raphanistrum</i> . . . . .	229
<i>dietyocarpum</i> Sp. . . . .	475	<i>Parthenium</i> Sm. . . . .	930	<i>salivus</i> . . . . .	230
<i>glaucescens</i> Reh. <i>b.</i> . . . .	475	<i>sinense</i> Sab. . . . .	932	<b>Resedia</b> . . . . .	62
<i>muricatum</i> . . . . .	476	<b>Pyrola</b> Trn. . . . .	61	<i>lutea</i> . . . . .	167
<i>Sanguisorba</i> . . . . .	475	<i>minor</i> . . . . .	166	<i>luteola</i> . . . . .	168
<b>Prenanthes</b> . . . . .	394	<i>rotundifolia</i> . . . . .	165	<i>odorata</i> . . . . .	169
<i>hieracifolia</i> . . . . .	1025	<b>Pyrolaceæ</b> . . . . . <i>p.</i>	28	<b>RESEDACEÆ</b> . . . . . <i>p.</i>	28
<i>mutalis</i> . . . . .	1013	<b>Quercus</b> Trn. . . . .	433	<b>RHAMNÆÆ</b> . . . . . <i>p.</i>	41
<i>purpurea</i> . . . . .	1012	<i>alba</i> Mx. . . . .	1138	<b>Rhamnus</b> . . . . .	104
<b>Primula</b> . . . . .	225	<i>pedunculata</i> Ehr. . . . .	1134	<i>cathartica</i> . . . . .	275
<i>acutis</i> Jeq. . . . .	590	<i>racemosa</i> Ehr. . . . .	1134	<i>frangula</i> . . . . .	276
<i>auricula</i> . . . . .	591	<i>Robur</i> . . . . . <i>b.</i> . . . .	1135	<b>Rhinanthus</b> . . . . .	278
<i>elatior</i> Jeq. . . . .	589	<i>Robur</i> . . . . .	1134	<i>Alectorolophus</i> Poll. . . . .	724
<i>grandiflora</i> Lmk. . . . .	590	<i>rubra</i> Mx. . . . .	1136	<i>angustifolius</i> . . . . .	725
<i>officinalis</i> Jeq. . . . .	588	<i>sessiflora</i> Sib. . . . .	1135	<i>Crista-galli</i> . . . . . <i>a.</i> . . . .	723
<i>veris</i> . . . . . <i>b.</i> . . . .	588	<i>tinctora</i> Mx. . . . .	1137	<i>Crista-galli</i> . . . . . <i>b.</i> . . . .	722
<i>veris</i> . . . . .	589	<b>Radiola</b> Dill. . . . .	39	<i>major</i> Ehr. . . . .	722
<i>vulgaris</i> . . . . .	590	<i>linoides</i> Gm. . . . .	109	<i>minor</i> Ehr. . . . .	723
<b>PRIMULACEÆ</b> . . . . . <i>p.</i>	82	<i>Millegramm</i> Sm. . . . .	109	<b>Rhynchospora</b> Val. . . . .	501
<b>Prismatocarpus</b>		<b>RANUNCULACEÆ</b> <i>p.</i>	8	<i>alba</i> Val. . . . .	1366
<i>speculum</i> DC. . . . .	827	<b>Ranunculus</b> . . . . .	6	<b>Ribes</b> . . . . .	220
<b>PRUNELLA V. BRUNELLA</b>		<i>aconitifolius</i> . . . . .	22	<i>alpinum</i> . . . . .	578
<b>Prunus</b> . . . . .	146	<i>acris</i> . . . . .	26	<i>baceiferum</i> Wall. <i>b.</i> . . . .	578
<i>Armeniaca</i> . . . . .	392	<i>aquatilis</i> . . . . .	16	<i>Grossularia</i> . . . . .	576
<i>avium</i> . . . . .	398	<i>arvensis</i> . . . . .	33	<i>nigrum</i> . . . . .	579
<i>Catharina</i> DC. <i>b.</i> . . . .	395	<i>aureus</i> Schl. . . . .	28	<i>reclinatum</i> . . . . . <i>c.</i> . . . .	576
<i>Cerasus</i> . . . . .	399	<i>auricomus</i> . . . . .	25	<i>rubrum</i> . . . . .	577
<i>cerasifera</i> Ehr. . . . .	397	<i>bulbosus</i> . . . . .	30	<i>sterile</i> Wall. <i>d.</i> . . . .	578
<i>cerea</i> . . . . . <i>d.</i> . . . .	395	<i>divaricatus</i> Schkr. . . . .	20	<i>Uva-crispa</i> . . . . . <i>b.</i> . . . .	576
<i>Claudiana</i> Prs. <i>c.</i> . . . .	395	<i>ficaria</i> . . . . .	34	<i>Uva-crispa</i> . . . . .	576
<i>damascena</i> . . . . . <i>b.</i> . . . .	394	<i>Flammula</i> . . . . .	23	<b>Robinia</b> . . . . .	114
<i>domestica</i> . . . . .	396	<i>fluitans</i> Lk . . . . .	19	<i>pseudo-acacia</i> . . . . .	293
<i>fruticans</i> Wh. . . . .	394	<i>fluvialis</i> Web . . . . .	19	<i>umbraclifera</i> Df <i>b.</i> . . . .	293
<i>institia</i> . . . . .	395	<i>hederaceus</i> . . . . .	15	<i>viscosa</i> Vent. . . . .	294
<i>Mahaleb</i> . . . . .	400	<i>heterophyllus</i> Web. . . . .	16	<b>Roripa</b> Sep. . . . .	
<i>Padus</i> . . . . .	401	<i>hirsutus</i> Col. . . . .	31	<i>palustris</i> Rehb. . . . .	205
<i>Meyeri</i> Bek. . . . .	393	<i>inermis</i> . . . . . <i>b.</i> . . . .	33	<i>silvestris</i> Rehb. . . . .	207
<i>spinosa</i> . . . . .	393	<i>lanuginosus</i> . . . . .	27	<b>Rosa</b> . . . . .	156
<b>Prarmica</b> DC. . . . .				<i>arvensis</i> Hds. . . . .	469
<i>vulgaris</i> DC. . . . .	922			<i>bibracteata</i> Bst. <i>c.</i> . . . .	469

<b>Rosa</b> . . . . .	156	<b>Rubus</b> . . . . .	150	<b>Sahiana</b> Spch.	
<i>campestris</i> Dmtr.	467	<i>Idaeus</i> . . . . .	433	<i>officinalis</i> Gke. . . . .	4181
<i>canina</i> . . . . .	468	<i>infestus</i> W. et N.	424	<i>virginiana</i> Ant. . . . .	4182
<i>centifolia</i> . . . . .	460	<i>Lejeuni</i> W. et N.	427	<i>vulgaris</i> Ant. . . . .	4181
<i>cinnamomea</i> . . . . .	458	<i>leucostachys</i> . . . . .	414	<b>Sagina</b> . . . . .	28
<i>cinerascens</i> Dmtr. <i>b.</i>	462	<i>nemorosus</i> H. . . . .	430	<i>apetala</i> . . . . .	83
<i>collina</i> Lej. . . . <i>g.</i>	468	<i>nitidus</i> W. et N. <i>d.</i>	409	<i>ciliata</i> Fr. . . . .	84
<i>cuspidatoides</i> Cp. <i>c.</i>	462	<i>odoratus</i> . . . . .	430	<i>depressa</i> Schlz. <i>b.</i>	84
<i>dumetorum</i> Th. <i>f.</i>	468	<i>pallidus</i> W. et N.	430	<i>procumbens</i> . . . . .	82
<i>eglanteria</i> . . . . .	463	<i>plicatus</i> W. et N. <i>b.</i>	409	<i>recta</i> . . . . .	103
<i>gallica</i> . . . . .	459	<i>pygmaeus</i> W. et N.	429	<i>saxatilis</i> Wim. <i>b.</i>	83
<i>glaucescens</i> Dr. <i>e.</i>	468	<i>Radula</i> W. et N. . . . .	422	<b>Sagittaria</b> . . . . .	440
<i>inermis</i> DC. . . . <i>b.</i>	457	<i>rharnnifolius</i> W. N. <i>b.</i>	411	<i>sagittifolia</i> . . . . .	1187
<i>lutea</i> Mill. . . . .	463	<i>rosaceus</i> W. et N. <i>b.</i>	422	SALICINEE . . . . .	151
<i>luxemburgensis</i> C. <i>b.</i>	468	<i>rudis</i> W. et N. . . . .	423	<b>Salix</b> Trn. . . . .	436
<i>malmundariensis</i> L. <i>c.</i>	468	<i>saxatilis</i> . . . . .	432	<i>acuminata</i> Kch. . . . .	1154
<i>micrantha</i> Sm. . . . .	463	<i>Schlechtendalii</i> W. N.	415	<i>alba</i> . . . . .	1143
<i>microphylla</i> Willr. <i>c.</i>	464	<i>Schleicheri</i> W. et N.	420	<i>amygdalina</i> . . . . .	1145
<i>muscosa</i> Hort. <i>b.</i>	460	<i>serpens</i> God. . . . <i>e.</i>	431	<i>aurita</i> . . . . .	1159
<i>nitens</i> Dv. . . . .	468	<i>sylvaticus</i> W. et N.	416	<i>babylonica</i> . . . . .	1144
<i>pimpinellifolia</i> Sr.	457	<i>Sprengelii</i> W. . . . .	413	<i>Caprea</i> . . . . .	1153
<i>pomifera</i> Herr. . . . .	461	<i>suberectus</i> And. . . . .	409	<i>cinerea</i> . . . . .	1154
<i>pomponica</i> Hort. <i>c.</i>	460	<i>thyrsoides</i> Wim. . . . .	411	<i>concolor</i> Koch. <i>b.</i>	1145
<i>repens</i> Sep. . . . <i>b.</i>	469	<i>tomentosus</i> Arrh. <i>b.</i>	430	<i>daphnoides</i> Vill. . . . .	1147
<i>rubiginosa</i> . . . . .	464	<i>tomentosus</i> Willd. . . . .	412	<i>decipiens</i> Hoff. <i>b.</i>	1142
<i>rubifolia</i> T. . . . <i>b.</i>	468	<i>umbrosus</i> God. . . . .	414	<i>depressa</i> . . . . .	1156
<i>subglobosa</i> Sm. <i>c.</i>	462	<i>vestitus</i> W. et N. . . . .	418	<i>fragilis</i> . . . . .	1142
<i>tomentosa</i> Sm. . . . .	462	<i>vestitus</i> Wim. <i>d.</i> . . . .	431	<i>hippochaëfolia</i> Th.	1146
<i>tomentella</i> Lrs. . . . .	466	<i>villicaulis</i> W. et N. <i>b.</i>	417	<i>incana</i> Schk. . . . .	1152
<i>umbellata</i> Lrs. <i>b.</i>	464	<i>villosus</i> DC. . . . .	428	<i>licida</i> Whlbg. . . . .	1156
<b>ROSACEE</b> . . . . .	p. 56	<i>vinetorum</i> Hol. . . . .	418	<i>pentandra</i> . . . . .	1141
<b>RUBIACEE</b> . . . . .	p. 115	<i>viscosus</i> W. . . . .	419	<i>purpurea</i> . . . . .	1148
<b>Rubus</b> . . . . .	150	<i>vulgaris</i> W. et N. . . . .	414	<i>repens</i> . . . . .	1157
<i>affinis</i> W. et N. . . . .	410	<b>Rumex</b> . . . . .	408	<i>rosmarinifolia</i> . . . . .	1158
<i>agrestis</i> W. et N. <i>b.</i>	431	<i>Acetosa</i> . . . . .	1067	<i>rubra</i> Hds. . . . .	1149
<i>argenteus</i> W. et N. <i>c.</i>	417	<i>Acelosella</i> . . . . .	1068	<i>Seringeana</i> Gaud. . . . .	1151
<i>Bellardii</i> W. et N. . . . .	428	<i>aquaticus</i> . . . . .	1076	<i>triandra</i> . . . . <i>b.</i>	1165
<i>caesius</i> . . . . .	431	<i>conglomeratus</i> Mr. . . . .	1078	<i>viminalis</i> . . . . .	1150
<i>caudicans</i> Rehb. . . . .	411	<i>crispus</i> . . . . .	1074	<i>vitellina</i> . . . . .	1143
<i>carpinifolius</i> W. N. <i>b.</i>	414	<i>Friesii</i> G. . . . .	1064	<b>Salvia</b> . . . . .	291
<i>cordifolius</i> W. N. <i>c.</i>	411	<i>Hydrolapathum</i> Hd.	1076	<i>officinalis</i> . . . . .	760
<i>corytifolius</i> H. . . . .	410	<i>maritimus</i> Schbr. . . . .	1070	<i>pratensis</i> . . . . .	758
<i>discolor</i> W. et N. . . . .	417	<i>macrocarpa</i> . . . . <i>d.</i>	1068	<i>Sclarea</i> . . . . .	759
<i>diversiflorus</i> Ldly. . . . .	418	<i>maximus</i> Schb. . . . .	1067	<b>Sambucus</b> Trn. . . . .	325
<i>dumetorum</i> God. . . . .	430	<i>microcarpa</i> . . . . <i>c.</i>	1069	<i>Ebulus</i> . . . . .	840
<i>dumetorum</i> W. N. <i>c.</i>	431	<i>Nemolapathum</i> Eh. . . . .	1072	<i>humilis</i> Lk. . . . .	840
<i>fastigiatus</i> W. N. <i>c.</i>	409	<i>nemorosus</i> Schd. <i>b.</i>	1073	<i>laciniata</i> . . . . <i>b.</i>	841
<i>ferox</i> Vent. . . . <i>d.</i>	431	<i>obtusifolius</i> . . . . .	1064	<i>nigra</i> . . . . .	841
<i>fruticosus</i> . . . . .	408	<i>palustris</i> Sm. . . . .	1071	<i>racemosa</i> . . . . .	842
<i>fruticosus</i> W. et N. . . . .	411	<i>Patientia</i> . . . . .	1075	<b>Sanguisorba</b> . . . . .	159
<i>fruticosus</i> DC. . . . .	417	<i>purpureus</i> . . . . <i>b.</i>	1064	<i>minor</i> Sep . . . . .	475
<i>fuscus-ater</i> W. et N. . . . .	421	<i>sanguineus</i> . . . . .	1073	<i>officinalis</i> . . . . .	474
<i>glandulosus</i> Bll. . . . .	428	<i>scutatus</i> . . . . .	1066	SANGUISOREE. . . . .	p. 66
<i>glandulosus</i> Sch. . . . .	420	<i>silvestris</i> Wl. . . . <i>c.</i>	1064	<b>Sanicula</b> Trn. . . . .	177
<i>Guntheri</i> W. et N. . . . .	426	<b>Ruta</b> . . . . .	41	<i>europaea</i> . . . . .	513
<i>hirtus</i> Wgt. . . . <i>b.</i>	418	<i>graveolens</i> . . . . .	112	SANTALACEE . . . . .	p. 146
<i>hirtus</i> W. et N. . . . .	425	<b>RUTACEE</b> . . . . .	p. 21	<b>Saponaria</b> . . . . .	21
<i>hybridus</i> Vill. . . . .	427			<i>noctiflora</i> Fzl. . . . .	69

<b>Saponaria</b> . . . . . 21	<b>Scirpus</b> . . . . . 503	<b>Scliumm</b> . . . . . 197
<i>officinalis</i> . . . . . 62	<i>maritimus</i> . . . . . 1374	<i>Carvifolia</i> . . . . . 542
<i>Vaccaria</i> . . . . . 61	<i>medius</i> Schrd. <i>b.</i> . . . . 1372	<i>Chabrei</i> Jeq. . . . . 545
<b>Sarothamnus</b> Wim. 105	<i>micronatus</i> . . . . . 1373	<i>palustris</i> . . . . . 547
<i>scoparius</i> Keh. . . . . 277	<i>palustris</i> . . . . . 1367	<b>Sempervivum</b> . . . . . 142
<i>vulgaris</i> Wim. . . . . 277	<i>patelliflorus</i> Lghtf. . . . . 1369	<i>lectorum</i> . . . . . 389
<b>Saturria</b> . . . . . 298	<i>Polichii</i> Gdr. . . . . 1373	<b>Senecio</b> <i>hiera</i> Pers. . . . . 98
<i>hortensis</i> . . . . . 772	<i>setaceus</i> . . . . . 1371	<i>Coronopus</i> Poir. . . . . 256
<b>Satyrinum</b>	<i>silvaticus</i> . . . . . 1375	<i>Senecio</i> . . . . . 376
<i>Albidum</i> . . . . . 1263	<i>triqueter</i> Auct. . . . . 1373	<i>aquaticus</i> Hds. . . . . 978
<i>bifolium</i> . . . . . 1265	<b>Scleranthus</b> . . . . . 139	<i>erucifolius</i> . . . . . 976
<i>Epipogium</i> . . . . . 1267	<i>annuus</i> . . . . . 377	<i>Fuchsii</i> Gm. . . . . 981
<i>hircinum</i> . . . . . 1240	<i>commosus</i> Dmtr. <i>c.</i> . . . . 377	<i>germanicus</i> Wlhr. . . . . 979
<i>viride</i> . . . . . 1264	<i>divaricatus</i> Dmtr. <i>b.</i> . . . . 377	<i>Jacobæa</i> . . . . . 977
<b>Saxifraga</b> . . . . . 221	<i>perennis</i> . . . . . 378	<i>nemorensis</i> . . . . . 979
<i>agregata</i> Lj. . . . . 582	<b>Sclerochloa</b> P. B. . . . . 542	<i>ovatus</i> . . . . . 982
<i>caespitosa</i> . . . . . 582	<i>dura</i> P. B. . . . . 1452	<i>Sarracenicus</i> . . . . . 980
<i>condensata</i> Gmel. <i>c.</i> . . . . 582	<b>Scorzonera</b> . . . . . 390	<i>silvaticus</i> . . . . . 975
<i>confusa</i> Lej. . . . . 582	<i>angustifolia</i> . . . . . 1004	<i>spathulifolius</i> . . . . . 972
<i>decipiens</i> Ehr. . . . . 582	<i>hispanica</i> . . . . . 1005	<i>tenuiflorus</i> Jeq. . . . . 976
<i>granulata</i> . . . . . 581	<i>humilis</i> . . . . . 1004	<i>viscosus</i> . . . . . 974
<i>hypnoides</i> . . . . . 583	<i>plantaginea</i> Sl. <i>c.</i> . . . . 1004	<i>vulgaris</i> . . . . . 973
<i>sponhemica</i> Gm. <i>b.</i> . . . . 582	<b>Scrophularia</b> Trn. . . . . 272	<b>Scrapias</b>
<i>tridaetylites</i> . . . . . 580	<i>alata</i> . . . . . 699	<i>ensifolia</i> Mr. . . . . 1270
<i>uniflora</i> Stbg. <i>d.</i> . . . . 582	<i>aquatica</i> . . . . . 702	<i>grandiflora</i> . . . . . 1269
SAXIFRAGEE . . . . . p. 81	<i>aquatica</i> Koch. . . . . 700	<i>Helleborine</i> . . . . . 1272
<b>Scabiosa</b> . . . . . 335	<i>Balbisii</i> Hr. . . . . 702	<i>lanceifolia</i> Mr. . . . . 1269
<i>arvensis</i> . . . . . 879	<i>betonicifolia</i> DC. . . . . 702	<i>latifolia</i> . . . . . 1272
<i>atropurpurea</i> . . . . . 878	<i>Erharti</i> St. . . . . 700	<i>longifolia</i> . . . . . 1269
<i>Columbaria</i> . . . . . 876	<i>Neesii</i> Wrtg. . . . . 701	<i>longifolia</i> . . . . . 1273
<i>patens</i> Jrd. . . . . 876	<i>nodosa</i> . . . . . 699	<i>longifolia</i> . . . . . 1271
<i>pratensis</i> Jrd. <i>b.</i> . . . . 876	<i>umbrosa</i> Dmtr. <i>b.</i> . . . . 699	<i>longifolia</i> . . . . . 1270
<i>silvatica</i> . . . . . 880	<i>vernalis</i> . . . . . 703	<i>palustris</i> Sep. . . . . 1273
<i>Succisa</i> . . . . . 877	SCROPULARINEE . . . . . p. 94	<i>rubra</i> . . . . . 1271
<b>Scandix</b> . . . . . 214	<b>Scutellaria</b> . . . . . 310	<i>Xiphophyllum</i> . . . . . 1270
<i>infesta</i> . . . . . 561	<i>galericulata</i> . . . . . 802	<b>Serratula</b> . . . . . 345
<i>odorata</i> . . . . . 568	<i>minor</i> . . . . . 803	<i>arvensis</i> . . . . . 901
<i>Pecten-Veneris</i> . . . . . 569	<b>Secale</b> . . . . . 550	<i>tinctoria</i> . . . . . 903
<b>Schenodorus</b> P. B.	<i>cereale</i> . . . . . 1503	<b>Seseli</b> . . . . . 192
<i>arundinaceus</i> P. B. . . . . 1486	<b>Setium</b> . . . . . 141	<i>annuum</i> . . . . . 536
<i>elatior</i> P. B. . . . . 1484	<i>aere</i> . . . . . 380	<i>Curvi</i> . . . . . 536
<i>foliaceus</i> P. B. . . . . 1485	<i>album</i> . . . . . 386	<i>coloratum</i> Ehr. . . . . 532
<i>pratensis</i> . . . . . 1485	<i>aureum</i> Wrtg. . . . . 384	<i>Libanotis</i> Keh. . . . . 533
<i>silvaticus</i> P. B. . . . . 1487	<i>bolomense</i> DC. . . . . 382	<i>montanum</i> . . . . . 537
<b>Schœnus</b>	<i>glaucescens</i> . . . . . 383	<b>Sesleria</b> Sep. . . . . 524
<i>albus</i> . . . . . 1366	<i>liridum</i> Brnd. . . . . 318	<i>cœrulea</i> Ard. . . . . 1415
<i>compressus</i> . . . . . 1376	<i>maximum</i> St. . . . . 387	<b>Setaria</b> P. B. . . . . 515
<b>Scilla</b> . . . . . 457	<i>mitis</i> . . . . . 381	<i>germanica</i> P. B. <i>b.</i> . . . . 1396
<i>bifolia</i> . . . . . 1202	<i>purpurascens</i> Koch. . . . . 388	<i>glauca</i> P. B. . . . . 1395
<b>Scirpus</b> . . . . . 503	<i>purpureum</i> Lk. . . . . 388	<i>italica</i> P. B. . . . . 1396
<i>acicularis</i> . . . . . 1368	<i>reflexum</i> . . . . . 383	<i>rubicunda</i> . . . . . 1395
<i>Bastrygon</i> Ehr. . . . . 1369	<i>rubens</i> Hk. . . . . 379	<i>verticillata</i> P. B. . . . . 1393
<i>caespitosus</i> . . . . . 1370	<i>rubrum</i> . . . . . 379	<i>verticilliformis</i> <i>b.</i> . . . . 1392
<i>canpestris</i> Rth. . . . . 1369	<i>rupestre</i> . . . . . 383	<i>viridis</i> P. B. . . . . 1394
<i>Caricis</i> Rlz. . . . . 1376	<i>schistosum</i> Lj. . . . . 382	<b>Sherardia</b> Dill. . . . . 329
<i>compressus</i> Pers. . . . . 1376	<i>sexangulare</i> . . . . . 381	<i>arvensis</i> . . . . . 849
<i>glaucus</i> Sm. . . . . 1372	<i>Telephium</i> Auct. . . . . 387	<b>Sieglingia</b> Bhd. . . . . 522
<i>laustris</i> . . . . . 1372	<i>treviricum</i> Rsb. . . . . 385	<i>decumbens</i> Bhd. . . . . 1435

<b>Silaus</b> Bess. . . . .	195	<b>Sorbus</b> . . . . .	168	<b>Stellaria</b> . . . . .	33
pratensis Bess. . . . .	540	Aria Crtz. . . . .	492	graminea . . . . .	94
<b>Silene</b> . . . . .	23	aucuparia . . . . .	490	holostea . . . . .	92
Armeria . . . . .	70	domestica . . . . .	489	media Vill. . . . .	91
conica . . . . .	65	terminalis Crtz. . . . .	491	nemorum . . . . .	90
conoidea . . . . .	66	<b>Sorghum</b> . . . . .	24	uliginosa Mrr. . . . .	95
gallica . . . . .	68	saccharatus . . . . .	1436	<b>Stellera</b>	
inflata Sm. . . . .	64	<b>Sparganium</b> . . . . .	498	Passerina . . . . .	1103
noctiflora . . . . .	69	erectum . . . . . a.	1303	<b>Stenactis</b> Cass. . . . .	371
nutans . . . . .	67	erectum . . . . . b.	1504	annua Nees. . . . .	964
<i>Saponaria</i> Frzl . . . . .	62	ramosum Hds. . . . .	1303	bellidiflora A. . . . .	964
venosa Aschs. . . . .	64	simplex Hds. . . . .	1304	<b>Stipa</b> . . . . .	323
<b>Silybum</b> Vill. . . . .	343	<b>Spartium</b>		pennata . . . . .	1414
marianum Grtn. . . . .	898	scoparium . . . . .	277	<b>Succisa</b> M. et K.	
<b>Sinapis</b> . . . . .	85	<b>Specularia</b> Hst. . . . .	317	pranorsa Aschn. . . . .	877
alba . . . . .	227	hybrida DC. . . . .	828	pratensis Mch. . . . .	877
arvensis . . . . .	226	speculum DC. . . . .	827	<b>Symphytum</b> Trn. . . . .	250
Cheiranthus Keh. . . . .	228	<b>Spergula</b> . . . . .	27	officinale . . . . .	636
nigra . . . . .	225	arvensis . . . . .	80	patens Sibth. . . . . b.	636
<b>Sisymbrium</b> . . . . .	78	maxima Whe. . . . . b.	80	<b>Syringa</b> . . . . .	234
Alliaria Sep. . . . .	209	pentandra . . . . .	81	persica . . . . .	608
amphibium . . . . .	206	sativa Bngh. . . . . c.	80	vulgaris . . . . .	607
arenosum . . . . .	197	<b>Spergularia</b> Pol. . . . .	26	<b>Symphoria</b> Prsch. . . . .	328
marale . . . . .	220	rubra Prsl. . . . .	79	racemosa Mx. . . . .	848
<i>Nasturtium</i> . . . . .	204	segetalis Fzl. . . . .	78	<b>Tajetes</b> Trn. . . . .	360
officinale Sep. . . . .	214	<b>Splinaea</b> Trn. . . . .	404	patula . . . . .	942
palustre Lys. . . . .	207	glabra . . . . .	1051	<b>Tamus</b> . . . . .	468
silvestre . . . . .	205	iuermis Mch. . . . .	1051	communis . . . . .	1231
Sophia . . . . .	212	oleracea . . . . .	1052	<b>Tanacetum</b> . . . . .	359
supinum . . . . .	213	spinosa Mch. . . . .	1052	Balsamita . . . . .	941
tenusifolium . . . . .	220	<b>Spiraea</b> . . . . .	148	corymbosum Schtz. . . . .	931
Thalianum Gd. . . . .	210	denudata H. . . . . b.	403	Parthenium Schtz. . . . .	930
<b>Slum</b> . . . . .	187	Filipendula . . . . .	402	vulgare . . . . .	940
angustifolium . . . . .	527	hypericifolia . . . . .	405	<b>Taraxacum</b> Jss. . . . .	392
Angeraria . . . . .	546	prunifolia V. H. . . . .	406	arcuatum Tsch. d. . . . .	1009
Falcaria . . . . .	518	salicifolia . . . . .	404	laevigatum DC. . . . . b.	1009
imudatum . . . . .	525	Ulmaria . . . . .	403	officinale Wg. . . . .	1009
latifolium . . . . .	526	<b>Splranthes</b> Reh. . . . .	487	paludosum Sep. . . . .	1010
nodiflorum . . . . .	524	festivalis Reh. . . . .	1276	udum Jd. . . . . c.	1009
<b>SOLANÆ</b> . . . . . p.	92	<b>Stachys</b> . . . . .	304	<b>Taxus</b> Trn. . . . .	447
<b>Solanum</b> Trn. . . . .	260	alpina . . . . .	787	baccata . . . . .	1184
Dulcamara . . . . .	658	ambigua Sm. . . . .	789	<b>Teesdalla</b> R. Br. . . . .	93
humile Bd. . . . . c.	659	annua . . . . .	792	Iberis . . . . .	244
miniatum Bhd. d. . . . .	659	arvensis . . . . .	791	nudicaulis RB. . . . .	244
nigrum . . . . .	659	betonica Rth. . . . .	794	integrifolia . . . . . b.	244
ochroleucum Bast. b. . . . .	659	germanica . . . . .	786	<b>Teucrium</b> . . . . .	312
tuberosum . . . . .	660	palustris . . . . .	790	alba T. . . . . b.	809
villosum Lmk . . . . . c.	659	recta . . . . .	793	Rotrys . . . . .	809
<b>Soldago</b> . . . . .	369	sideritis Vill. . . . .	793	Chamædrys . . . . .	811
alpestris W. et K. b. . . . .	960	silvatica . . . . .	788	Chamaepitys . . . . .	817
canadensis . . . . .	961	<b>Staphylea</b> . . . . .	55	montanum . . . . .	812
Virga-aurea . . . . .	960	pinnata . . . . .	152	Scordium . . . . .	810
<b>Sonchus</b> . . . . .	396	<b>Statice</b>		Scorodonia . . . . .	808
arvensis . . . . .	1021	Armeria . . . . .	598	supinum Jq. . . . . b.	812
asper Vil. . . . .	1020	<b>Stellaria</b> . . . . .	33	<b>Thalictum</b> . . . . .	2
lacerus Wll. . . . . b.	1029	aquatica Rd. . . . .	95	aquilegifolium . . . . .	3a
lævis Vil. . . . .	1019	Alsine Reh. . . . .	95	elatum M. . . . . b.	4
oleraceus . . . . .	1019	glauca With. . . . .	93		

<b>Thalictrum</b> . . . . . 2	<b>Tragopogon</b> . . . . . 389	<b>Tulipa</b> Trn. . . . . 452
<i>flavum</i> . . . . . 5	<i>orientalis</i> . . . . . 1002	<i>silvestris</i> . . . . . 1190
<i>majus</i> J. . . . . 4	<i>porrifolius</i> . . . . . 1000	<b>Tunica</b> Sep. . . . .
<i>minus</i> . . . . . 3	<i>pratensis</i> . . . . . 1003	<i>prolifera</i> Sep. . . . . 53
<i>montanum</i> Wlb. . . . . 3	<i>undulatum</i> Jq. d. . . . . 1003	<b>Turgentia</b> Hfm. . . . . 208
<i>nigricans</i> J. . . . . 5	<b>Trifolium</b> Trn. . . . . 120	<i>latifolia</i> Hfm. . . . . 557
<i>saxatile</i> G. . . . . 3	<i>agrarium</i> . . . . . 315	<b>Turritis</b> Dill. . . . . 77
<b>Thelata</b> Alfd. . . . .	— <i>majus</i> a. . . . . 315	<i>glabra</i> . . . . . 208
<i>rotundifolia</i> . . . . . 165	— <i>minus</i> b. . . . . 315	<i>hirsuta</i> . . . . . 195
<b>Thesium</b> . . . . . 422	<i>alpestre</i> . . . . . 318	<b>Tussilago</b> . . . . . 379
<i>linophyllum</i> . . . . . 1107	<i>arvense</i> . . . . . 322	<i>Farfara</i> . . . . . 985
<i>pratense</i> Ehr. . . . . 1107	<i>aureum</i> Pll. . . . . 314	<i>officinalis</i> . . . . . 986
<b>Thlaspi</b> . . . . . 94	<i>campestre</i> Schr. . . . . 315	<b>Typha</b> . . . . . 497
<i>alpestre</i> . . . . . 248	<i>caeruleum</i> . . . . . 303	<i>angustifolia</i> . . . . . 1302
<i>arvense</i> . . . . . 245	<i>filiforme</i> . . . . . 312	<i>latifolia</i> . . . . . 1301
<i>Bursa pastoris</i> . . . . . 250	<b>Trifolium</b> Trn. . . . . 120	<i>media</i> . . . . . b. 1301
<i>campestre</i> . . . . . 252	<i>flexuosum</i> Jcq. . . . . 317	TYPHACEÆ . . . . . p. 174
<i>montanum</i> . . . . . 246	<i>fragiferum</i> . . . . . 327	<b>Ulex</b> . . . . . 109
<i>perfoliatum</i> . . . . . 247	<i>hybridum</i> . . . . . 326	<i>europæus</i> . . . . . 286
<b>Trinela</b> Rth. . . . . 385	<i>incarnatum</i> . . . . . 321	ULMACEÆ . . . . . p. 144
<i>hirta</i> Rth. . . . . 994	<i>indicum</i> . . . . . 302	<b>Ulmaria</b> Trn. . . . .
<b>Thuta</b> Trn. . . . . 446	<i>macrorrhizum</i> W. K. . . . . 299	<i>Filipendula</i> A. B. . . . . 402
<i>occidentalis</i> . . . . . 1183	<i>medium</i> . . . . . 317	<i>pentapetala</i> Gil. . . . . 403
<b>Thymelæa</b> Trn. . . . . 418	<i>micranthum</i> . . . . . 302	<b>Ulmus</b> . . . . . 414
<i>Passerina</i> . . . . . 1103	<i>minus</i> . . . . . 312	<i>campestris</i> . . . . . 1096
THYMELACEÆ . . . . . p. 145	<i>montanum</i> . . . . . 324	<i>corylifolia</i> Host. c. . . . . 1096
<b>Thymus</b> . . . . . 293	<i>ochroleucum</i> . . . . . 319	<i>effusa</i> Wd. . . . . 1097
<i>Acinos</i> . . . . . 767	<i>officinalis</i> . . . . . 298	<i>montana</i> Sm. . . . . 1096 <sup>2</sup>
<i>Chamædryas</i> Fr. . . . . 764	<i>pratense</i> . . . . . 316	<i>suberosa</i> Ehr. . . . . b. 1096
<i>Serpyllum</i> . . . . . 763	<i>procumbens</i> . . . . . 313	UMBELLIFERÆ . . . . . p. 72
<i>vulgaris</i> . . . . . 765	<i>procumbens</i> Schb. b. . . . . 315	<b>Urtica</b> Trn. . . . . 415
<b>Tilia</b> . . . . . 49	<i>repens</i> . . . . . 325	<i>dioica</i> . . . . . 1098
<i>europæa</i> . . . . . 139	<i>rubens</i> . . . . . 320	<i>urens</i> . . . . . 1099
<i>grandiflora</i> Ehr. . . . . 139	<i>sativum</i> . . . . . b. 316	URTICÆE . . . . . p. 145
<i>parviflora</i> Ehr. . . . . 140	<i>striatum</i> . . . . . 323	<b>Utricularia</b> . . . . . 282
<i>platyphyllos</i> Sc. . . . . 139	<b>Triglochin</b> . . . . . 489	<i>vulgaris</i> . . . . . 734
<i>microphylla</i> . . . . . 140	<i>palustris</i> . . . . . 1278	
<i>silvestris</i> Dsf. . . . . 140	<b>Trigonella</b> . . . . . 113	<b>Vaccaria</b> Md. . . . .
TILIACEÆ . . . . . p. 24	<i>Fœnum-græcum</i> . . . . . 292	<i>parviflora</i> Meh. . . . . 61
<b>Tidymalus-Euphorbia</b> . . . . .	<b>Triodia</b> R. Br. . . . .	VACCINEÆ DC. . . . . p. 111
<b>Tordylium</b> Trn. . . . . 204	<i>decumbens</i> P. B. . . . . 1436	<b>Vaccinium</b> . . . . . 314
<i>Anthriscus</i> . . . . . 560	<b>Trisetum</b> P. B. . . . .	<i>Myrtillus</i> . . . . . 815
<i>latifolium</i> . . . . . 557	<i>flavescens</i> P. B. . . . . 1431	<i>Oxyccocos</i> . . . . . 816
<i>maximum</i> . . . . . 553	<b>Triticum</b> . . . . . 551	<i>Vitis-Idæa</i> . . . . . 834
<i>nodosum</i> . . . . . 562	<i>æstivum</i> . . . . . a. 1504	<b>Valantia</b> . . . . .
<b>Torilis</b> Ad. . . . . 210	<i>caninum</i> Schb. . . . . 1509	<i>Aparine</i> . . . . . 863
<i>Anthriscus</i> Gml. . . . . 560	<i>compositum</i> . . . . . 1505	<i>Cruciata</i> . . . . . 854
<i>infesta</i> Dby. . . . . 561	<i>durum</i> Df. . . . . 1505	<i>tricornis</i> . . . . . 864
<i>nodosa</i> Grta. . . . . 562	<i>hibernum</i> . . . . . b. 1504	<b>Valeriana</b> . . . . . 333
<b>Tormentilla</b> . . . . . 155	<i>monococcum</i> . . . . . 1508	<i>dioica</i> . . . . . 868
<i>erecta</i> . . . . . 456	<i>pinnatum</i> . . . . . 1489	<i>exaltata</i> Mik. . . . . b. 866
<i>procumbens</i> Sbt. . . . . 455	<i>repens</i> . . . . . 1508	<i>officinalis</i> . . . . . 866
<i>reptans</i> . . . . . 455	<i>silvaticum</i> Meh. . . . . 1490	<i>Phu</i> . . . . . 867
<i>silvestris</i> Nkr. . . . . 456	<i>Spelta</i> . . . . . 1507	VALERIANEÆ . . . . . p. 117
<b>Tragopogon</b> . . . . . 389	<i>turgidum</i> . . . . . 1506	<b>Valerianella</b> Trn. . . . . 334
<i>angustissimus</i> Dr. c. . . . . 1003	<i>vulgare</i> . . . . . 1504	<i>auricula</i> DC. . . . . 871
<i>major</i> Jq. . . . . 1001	<b>Tulipa</b> Trn. . . . . 452	<i>carinata</i> Lois. . . . . 870
<i>minor</i> Fr. . . . . b. 1003	<i>Gesneriana</i> . . . . . 1191	<i>coronata</i> DC. . . . . 874



<b>Valerianella</b> Trn. . . . .	344	<b>Veronica</b> . . . . .	270	<b>Viola</b> Trn. . . . .	103
<i>dentata</i> Dv. . . . .	872	<i>polita</i> Fr. . . . .	694	<i>canina</i> . . . . .	265
<i>eriocarpa</i> Dv. . . . .	873	<i>polyanthos</i> Th. <i>b.</i>	689	<i>elatiar</i> Fr. . . . .	272
<i>hamata</i> Lj. . . . .	874	<i>præcox</i> All. . . . .	692	<i>hirta</i> . . . . .	263
<i>Locusta</i> . . . . .	874	<i>prostrata</i> . . . . .	684	<i>intermedia</i> Lej. . . . .	274
<i>Morisonii</i> DC. . . . .	872	<i>romana</i> Pail. . . . .	687	<i>mirabilis</i> . . . . .	269
<i>olitoria</i> Meh. . . . .	869	<i>scutellata</i> . . . . .	678	<i>montana</i> . . . . .	266
<i>rimosa</i> Bst. . . . .	871	<i>serpyllifolia</i> . . . . .	686	<i>odorata</i> . . . . .	264
<i>vesicaria</i> Meh. . . . .	875	<i>spadana</i> Lej. <i>b.</i>	683	<i>palustris</i> . . . . .	262
<b>VERBASCEÆ</b> . . . . .	p. 93	<i>Teuerium</i> . . . . .	685	<i>Reichenbachia</i> . . . . .	267
<b>Verbascum</b> Trn. . . . .	269	<i>triphyllus</i> . . . . .	691	<i>Riviniana</i> Rehb. . . . .	268
<i>album</i> Meh. . . . .	675	<i>verna</i> . . . . .	690	<i>rothomagensis</i> Dsf. . . . .	273
<i>floccosum</i> W. K. . . . .	674	<b>Viburnum</b> . . . . .	326	<i>silvestris</i> Kch. . . . .	267
<i>Lychnitis</i> . . . . .	675	<i>Lantana</i> . . . . .	834	<i>tricolor</i> . . . . .	270
<i>montanum</i> Schr. . . . .	672	<i>Opulus</i> . . . . .	835	<i>vulgaris</i> . . . . .	270
<i>nigro-floccosum</i> . . . . .	677	<i>sterilis</i> DC. . . . .	835	<b>VIOLARIÆ</b> . . . . .	p. 40
<i>nigrum</i> . . . . .	676	<b>Viola</b> . . . . .	123	<b>Viscaria</b>	
<i>phlomidoides</i> . . . . .	671	<i>angustifolia</i> All. . . . .	338	<i>purpurea</i> Wim. . . . .	76
<i>putverulentum</i> Vill. . . . .	673	<i>Cræcea</i> . . . . .	332	<i>viscosa</i> Aschr. . . . .	76
<i>Schottianum</i> Schrd. . . . .	677	<i>Ervillea</i> Wld. . . . .	344	<i>vulgaris</i> Röhl. . . . .	76
<i>Schraderi</i> My. <i>b.</i>	669	<i>Faba</i> . . . . .	346	<b>Viscum</b> . . . . .	219
<i>tapsiforme</i> Schrd. . . . .	670	<i>gracilis</i> Lsl. . . . .	342	<i>album</i> . . . . .	575
<i>Thapsus</i> . . . . .	669	<i>hirsuta</i> Kch. . . . .	340	<b>Vitis</b> . . . . .	53
<b>Verbena</b> . . . . .	313	<i>lathyroides</i> . . . . .	339	<i>hederacea</i> Wld. . . . .	151
<i>officinalis</i> . . . . .	813	<i>Lens</i> . . . . .	345	<i>vinifera</i> . . . . .	150
<b>VERBENACEÆ</b> . . . . .	p. 111	<i>lutea</i> . . . . .	336	<b>Wahlenbergia</b> Sch. . . . .	320
<b>Veronica</b> Trn. . . . .	270	<i>monantha</i> Koch. . . . .	343	<i>hederacea</i> Rehb. . . . .	833
<i>acinifolia</i> . . . . .	688	<i>onobrychioides</i> . . . . .	334	<b>Wiegartneria</b> Bh . . . . .	525
<i>agrestis</i> . . . . .	693	<i>Orobis</i> DC. . . . .	358	<i>canescens</i> . . . . .	1416
<i>Anagallis</i> . . . . .	679	<i>pisiformis</i> . . . . .	331	<b>Wiggersta</b> F. W. H. . . . .	
<i>arvensis</i> . . . . .	689	<i>sativa</i> . . . . .	337	<i>lathyroides</i> F. W. H. . . . .	339
<i>Beccabunga</i> . . . . .	680	<i>sepium</i> . . . . .	335	<i>minima</i> Alt. . . . .	339
<i>Buxbaumii</i> Ten. . . . .	696	<i>tenuifolia</i> Rth. . . . .	333	<i>sepium</i> Fl. W. H. . . . .	335
<i>Chamædrys</i> . . . . .	681	<i>tetrasperma</i> Meh. . . . .	341	<b>Xanthium</b> Trn. . . . .	400
<i>didyma</i> Sch. Trn. . . . .	693	<b>Villarsia</b> . . . . .	240	<i>strumarium</i> . . . . .	1040
<i>filiformis</i> Lej. . . . .	696	<i>nymphæoides</i> Vent. . . . .	615	<b>Zinnichella</b> . . . . .	491
<i>hederæfolia</i> . . . . .	697	<b>Vinea</b> . . . . .	236	<i>palustris</i> . . . . .	1292
<i>Lappago</i> Schr. <i>b.</i>	697	<i>major</i> . . . . .	611	<b>Zen</b> . . . . .	506
<i>latifolia</i> . . . . .	685	<i>minor</i> . . . . .	610	<i>Mays</i> . . . . .	1383
<i>limosa</i> Lej. . . . .	680	<b>Vincetoxicum</b> Mch. . . . .	237		
<i>montana</i> . . . . .	682	<i>album</i> Achr. . . . .	612		
<i>officinalis</i> . . . . .	683	<i>officinale</i> . . . . .	612		
<i>opaca</i> Fr. . . . .	695	<b>Viola</b> Trn. . . . .	103		
<i>peregrina</i> . . . . .	687	<i>Altaica</i> Pall. . . . .	271		
<i>persica</i> Poir. . . . .	696	<i>arvensis</i> . . . . .	270		

## Table des noms français et allemands des genres et des noms vulgaires en idiome luxembourgeois.

(Les noms allemands ou français ressemblant aux dénominations latines sont omis.)

(Les chiffres rapprochés des noms s'appliquent aux espèces.)

### I. Noms français.

Abricotier . . .	145	Calaminthe . . .	295	Douçette. . . .	334
Absinthe . . .	358	Canche . . . .	526	Douce-amère	636
Agripaume . . .	308	Canneberge . . .	315	Echalotte	1215
Aigremoine . . .	157	Cardère . . . .	337	Egopode. . . .	182
Ail . . . . .	458	Carotte . . . .	206	Endive	1016
Airelle . . . .	314	Cassis	579	Engrain	1508
Ajone . . . . .	109	Céleri. . . . .	185	Epeautre	1507
Alpiste. . . . .	511	Centenille . . .	227	Epervière . . .	399
Amandier . . .	144	Cérasite . . . .	34	Epiaire . . . .	304
Ancolie . . . .	12	Cerfeuil	563	Epicea . . . .	1176
Anserine . . . .	406	Cerisier	398	Epinard. . . .	1075
Appétit	1214	Chalef . . . . .	419	Epine-vinette . .	17
Arbre de Judée .	330	Chanvre . . . .	412	Epurge	1111
Argousier . . .	420	Chardon . . . .	48	Erable . . . . .	51
Armoise . . . .	358	Charme . . . . .	435	Ers . . . . .	124
Arroche . . . .	413	Châtaignier . . .	432	Estragon	936
Arabette . . . .	74	Chêne . . . . .	433	Faux-acacia	293
Artichaut . . .	340	Chèvre-feuille. .	327	— ébénier. . . .	106
Asaret . . . . .	423	Chicorée . . . .	383	Fenouil . . . . .	293
Asperge . . . .	463	Chiendent	1509	Fenu-grec . . . .	292
Aubépine . . . .	162	Chou . . . . .	84	Fétuque. . . . .	545
Aulne . . . . .	439	— navel	b. 223	Fève . . . . .	125
Avoine. . . . .	528	— fleur	e. 222	Ficaire . . . . .	7
Baguenaudier . .	116	Ciboule	1214	Fléole . . . . .	518
Bardane . . . .	341	Ciguë . . . . .	215	Flouve . . . . .	508
Belladone . . . .	264	Civetle	1214	Flûteau . . . . .	448
Benoite . . . . .	151	Coignassier . . .	165	Fraisier. . . . .	152
Berece . . . . .	203	Commaret. . . .	153	Framboisier	433
Berle . . . . .	187	Concombre . . . .	322	Fraxinelle . . . .	42
Betoine . . . . .	305	Consoude . . . .	250	Frêne . . . . .	233
Betterave . . . .	405	Coquelicot. . . .	173	Froment . . . . .	551
Bluet	906	Coqueret . . . .	263	Fumeterre . . . .	70
Bois-gentil. . . .	417	Corète . . . . .	149	Fusain . . . . .	56
Boucage . . . . .	188	Cornille . . . . .	429	Gaillet . . . . .	331
Bouillon blanc	669	Cornouiller . . .	218	Gainier . . . . .	122
Bouleau . . . .	438	Corynophore . . .	526	Galantine . . . .	472
Boule de neige	b. 844	Coudrier . . . .	431	Gaude	167
Bourage . . . . .	633	Cotonnière. . . .	366	Genêt . . . . .	277
Bruyère . . . .	323	Courge. . . . .	322	Genévrier	1144
Brocoli . . . . .	c. 222	Cranson . . . . .	91	Germandré . . . .	312
Bugle . . . . .	311	Cresson . . . . .	76	Gesse . . . . .	127
Buglosse . . . .	248	Dauphinelle . . .	13	Giroflée . . . . .	72
Bugrane . . . . .	110	Dompte-venin. . .	237	Glaucière . . . .	67
Buis . . . . .	427	Dorinc . . . . .	222	Gnavelle . . . . .	139

Gouet . . . . .	494	Nénuphar . . . . .	64	Reine-claude <i>c.</i>	395
Grateron . . . . .	10	Nerprun . . . . .	104	Reine des prés	403
Grosseiller . . . . .	220	Nielle . . . . .	76	Renouée	1109
Gui . . . . .	219	Nivéole . . . . .	471	Riz . . . . .	503
Guimauve . . . . .	134	Noisetier . . . . .	434	Ronce . . . . .	150
Gynervi . . . . .	13	Noyer . . . . .	421	Rossolie . . . . .	59
Haricot . . . . .	121	Obier	835	Rubannier . . . . .	495
Hêtre . . . . .	431	Oeillet . . . . .	20	Rue . . . . .	112
Houblon . . . . .	413	Oignon	1216	Sabline . . . . .	32
Houx . . . . .	231	Onagre . . . . .	172	Sabot de Vénus . . . . .	483
If . . . . .	447	Orge . . . . .	549	Sainfoin . . . . .	132
Immortelle . . . . .	363	Orme . . . . .	414	Salicaire . . . . .	123
Ivraie . . . . .	548	Origan . . . . .	292	Salsifis . . . . .	389
Jacée	910	Orpin . . . . .	141	Sapin . . . . .	444
Jacobée	626	Ortie . . . . .	405	Sarrasin . . . . .	410
Jonc . . . . .	499	Panais . . . . .	202	Saricé . . . . .	345
Joubarbe . . . . .	142	Panicault . . . . .	179	Saricette . . . . .	298
Julienne . . . . .	81	Paquerette . . . . .	357	Sauge . . . . .	291
Jusquiambe . . . . .	268	Pariétaire . . . . .	416	Saule . . . . .	430
Kalmie . . . . .	48	Parisette . . . . .	467	Scorzonère . . . . .	390
Kalteron . . . . .	396	Pas-d'âne . . . . .	379	Seigle . . . . .	550
Laitier . . . . .	50	Passerage . . . . .	97	Sélerie . . . . .	185
Laitue . . . . .	395	Pastel . . . . .	99	Séringat . . . . .	169
Lampourde . . . . .	400	Patience	1075	Senecion . . . . .	376
Lavande . . . . .	286	Paturin . . . . .	542	Serpolet . . . . .	293
Lentille . . . . .	124	Pavot . . . . .	65	Sorbier . . . . .	168
Lenticule . . . . .	493	Pêcher . . . . .	143	Souchet . . . . .	505
Lierre . . . . .	217	Pensée	270	Souci . . . . .	361
Lilas . . . . .	234	Perce-neige	1238	Spargoute . . . . .	27
Lin . . . . .	38	Perdrigon <i>b.</i>	395	Sureau . . . . .	325
Linaigrette . . . . .	504	Persil . . . . .	184	Symphoricape . . . . .	328
Liondent . . . . .	386	Pervenche . . . . .	23	Tabac . . . . .	206
Lis . . . . .	454	Peusse	421	Tabouret . . . . .	94
Liseron . . . . .	245	Peuplier . . . . .	437	Tamier . . . . .	408
Livèche . . . . .	196	Phléole . . . . .	518	Tanaisie . . . . .	359
Luzerne . . . . .	119	Pigamon . . . . .	8	Thym . . . . .	293
Lyciet . . . . .	265	Piment	661	Tilleul . . . . .	10
Mais . . . . .	506	Pimpernelle . . . . .	476	Topinambour	918
Marbelle . . . . .	500	Pin . . . . .	441	Tourette . . . . .	77
Marronnier . . . . .	52	Pissenlit . . . . .	392	Trèfle . . . . .	120
Masette . . . . .	497	Plantain . . . . .	230	Tremble	1161
Mauve . . . . .	46	— d'eau . . . . .	448	Troène . . . . .	232
Mélèze . . . . .	442	Poireau	1207	Troscart . . . . .	489
Melon . . . . .	236	Poirier . . . . .	166	Ulmaire	103
Millepertuis . . . . .	58	Pois . . . . .	126	Velar . . . . .	80
Millet . . . . .	522	Pomme de terre	660	Verge-d'or	960
Molène . . . . .	269	Pommier . . . . .	167	Vergerelette . . . . .	370
Morelle . . . . .	260	Porcelle . . . . .	389	Verveine . . . . .	313
Mouron . . . . .	228	Potamot . . . . .	490	Vesce . . . . .	123
Moutarde . . . . .	85	Pourpier . . . . .	135	Vigne . . . . .	53
Mûllier . . . . .	275	Primevère . . . . .	225	Vinettier . . . . .	17
Muguet . . . . .	464	Prunehier . . . . .	146	Violette	103
Murier . . . . .	411	Radis . . . . .	86	Viorne . . . . .	326
Myrtille	815	Raifort . . . . .	239	Vipérine . . . . .	254
Navet <i>b.</i>	224	Raiponce . . . . .	318	Vulnéraire	289
— de Suède <i>b.</i>	223	Râpette . . . . .	258	Vulpin . . . . .	517
Navette	224 <i>a</i>	Ratoncule . . . . .	5	Yèble	842
Néflier . . . . .	101	Rave	230		

## II. Noms allemands.

Afterquendel . . .	134	Buchs . . . . .	427	Fingerhirse . . . .	514
Ahorn . . . . .	51	Cornelkirsche . . .	218	Fingerhut . . . . .	274
Akazie . . . . .	293	Cristophskraut . . .	15	Flachs . . . . .	108
Akelei . . . . .	12	Cypergras . . . . .	505	— seide . . . . .	631
Alant . . . . .	368	Daun . . . . .	303	Flattergras . . . .	522
Amaranth . . . . .	401	Dickblatt . . . . .	140	Flieder . . . . .	234
Ampfer . . . . .	408	Dill . . . . .	201	Flockenblume . . . .	316
Andorn . . . . .	306	Dügel . . . . .	482	Flöhkraut . . . . .	367
Apfelbaum . . . . .	167	Dinkel 1507		Föhre 1171	
Aprikosenbaum . . .	145	Diptam. . . . .	42	Frauenflachs . . . .	276
Artischoke . . . . .	340	Distel . . . . .	342	— schuh . . . . .	488
Aron . . . . .	494	Doppelsame . . . . .	82	— thräne . . . . .	477
Augentrost . . . . .	280	Dost . . . . .	292	Friedlos . . . . .	226
Aspe 1161		Dotterblume . . . .	12	Froschlöffel . . . . .	448
Baldgreis . . . . .	376	Dreizack . . . . .	489	Fuchsschwanz . . . .	517
Bärenklaue . . . . .	203	Dürrwurz . . . . .	370	Fünffingerkraut . . .	154
Bärwurz . . . . .	194	Eberesche . . . . .	168	Gänseblümchen . . .	357
Basilikenkraut . . .	287	Eberwurz . . . . .	339	— fuss . . . . .	406
Batunge . . . . .	305	Edelkamlie . . . . .	352	— kresse . . . . .	74
Bauernsenf . . . . .	95	Edeltanne 1178		Gamander . . . . .	812
Becherblume . . . .	160	Ehrenpreis . . . . .	270	Gartenkerbel 563	
Beifuss . . . . .	358	Eibe . . . . .	447	— kresse 251	
Beinheil . . . . .	461	Eibisch . . . . .	47	Gauchheil . . . . .	597
Beisbeere . . . . .	261	Eiche . . . . .	433	Gedenkemein . . . . .	257
Betterich . . . . .	387	Einbeere . . . . .	467	Geisblatt . . . . .	327
Biebernelle . . . . .	188	Einkorn 1508		Geisraute . . . . .	115
Bilsenkraut . . . . .	268	Eisenhut . . . . .	14	Georgine . . . . .	377
Bingelkraut . . . . .	426	Eller . . . . .	439	Gersch . . . . .	519
Binse . . . . .	499	Elsbeere 491		Gerste . . . . .	548
Binsenstrauch . . .	105	Endivie 1016		Gewürzstrauch . . . .	170
Birke . . . . .	438	Engelwurz . . . . .	199	Ginster . . . . .	107
Birnbaum . . . . .	166	Ephed . . . . .	217	Glaskraut . . . . .	416
Bisamhyacinthe . . .	459	Erbse . . . . .	126	Glockenblume . . . .	316
Bisamkraut . . . . .	324	Erdbeere . . . . .	152	Glockenhaide . . . . .	586
Blasenstrauch . . . .	116	— Spinat . . . . .	407	Gnadenkraut . . . . .	273
Blattkohl <i>a.</i> 222		Erdkohlrabi <i>b.</i> 223		Goldlack . . . . .	72
Blumenkohl . . . . .	222	Erdnuss . . . . .	353	Goldnessel 780	
Blutauge . . . . .	153	Erdrauch . . . . .	70	Goldruthie . . . . .	369
Blutze . . . . .	375	Erle . . . . .	439	Goldhaar . . . . .	373
Boecksdorn . . . . .	265	Erve . . . . .	124	Goldstern . . . . .	456
Bockshorn . . . . .	113	Esparsette . . . . .	132	Gottesvergeß 796	
Bohne . . . . .	125	Espe 1161		Grastilie . . . . .	459
Bohnenbaum . . . . .	106	Estragon 936		Grünkohl 222	
Boretsch . . . . .	247	Falsblume . . . . .	362	Günsel . . . . .	311
Borstengras . . . . .	552	Faulbaum 276		Gundelrebe . . . . .	300
Braunwurz . . . . .	272	Feigwurz . . . . .	7	Gurke . . . . .	322
Braunkohl . . . . .	222	Feldkresse . . . . .	98	Gypskraut . . . . .	19
Breitsame . . . . .	207	Felsenmispel 164		Haargras . . . . .	550
Brennessel . . . . .	415	Fenchel . . . . .	538	Haarstrang . . . . .	200
Brombeere . . . . .	150	Fennig . . . . .	515	Habichtskraut . . . .	399
Brunnenkresse . . . .	76	Ferkelkraut . . . . .	384	Hafer . . . . .	528
Bruchkraut . . . . .	138	Fettkraut . . . . .	141	Haferwurz . . . . .	389
Brustwurz . . . . .	198	Fichte 443		Haftdolde . . . . .	209
Buche . . . . .	431	Fiebersklee . . . . .	239	Hahnenfuss . . . . .	6

Hainbuche. . . . .	435	Karloffel 660	Löffelkraut . . . . .	91
Hanf . . . . .	412	Kastanie . . . . .	Löwenmaul. . . . .	275
Hanftod . . . . .	283	Katzenminze . . . . .	Löwenzahn . . . . .	386
Hartgras . . . . .	541	Katzenpfötgen. . . . .	Lolch . . . . .	547
Hartriegel . . . . .	218	Kellerhals 1102	Männertreu. . . . .	179
— . . . . .	232	Kerbel . . . . .	Mäuseschwanz . . . . .	5
Hasel . . . . .	434	Kiefer . . . . .	Maiblume . . . . .	464
Haselwurz . . . . .	423	Kirschbaum . . . . .	Mais. . . . .	506
Hasenlattich . . . . .	394	Klappertopf . . . . .	Mastkraut . . . . .	28
Hauhechel. . . . .	110	Klee . . . . .	Malve . . . . .	46
Hauswurz . . . . .	142	Kleinling . . . . .	Mandelbaum . . . . .	144
Hecksame . . . . .	109	Klettenkerbel . . . . .	Mariengras . . . . .	510
Hederich 220		Klingel. . . . .	Massholder 145	
Heide . . . . .	224	Knabenkraut . . . . .	Mauerpfeffer 380	
Heidelbeere . . . . .	314	Knautkraut . . . . .	Maulbeere . . . . .	411
Heilwurz . . . . .	191	Knaulgras. . . . .	Meerrettig . . . . .	239
Helmer. . . . .	310	Knoblauch 1205	Meerzwiebel . . . . .	457
Herbstzeitlose 451		Knöterich . . . . .	Meister . . . . .	330
Herzblatt . . . . .	60	Knotenblume . . . . .	Melde . . . . .	403
Herzgespann . . . . .	308	Knörpelkraut . . . . .	Melone 836	
Hexenkraut . . . . .	174	Kohl . . . . .	Merk. . . . .	187
Himbeere 433		Kohlrabi 222	Milche . . . . .	381
Himmelsteiter. . . . .	244	Kohlrops 222	Milzkraut . . . . .	222
Himmelschlüssel . . . . .	225	Kohlrübe 222	Minze . . . . .	288
Hirschsprung . . . . .	137	Kornblume 906	Mispel . . . . .	161
Hirse . . . . .	513	Kranzrade. . . . .	Mistel . . . . .	375
— . . . . .	516	Kratzdistel. . . . .	Mohn . . . . .	65
Hirtentasche . . . . .	96	Kresse . . . . .	Möhre 555	
Hohlzahn . . . . .	303	Kreuzblume . . . . .	Mondviole . . . . .	87
Hohlwurz . . . . .	69	Kronenwicke . . . . .	Monke . . . . .	319
Hollunder . . . . .	325	Krumhals . . . . .	Moorkönig . . . . .	277
Höswurz . . . . .	479	Krümling . . . . .	Moosbeere 816	
Honiggras . . . . .	530	Kugeldistel . . . . .	Mumel . . . . .	63
Honigklee . . . . .	118	Kuhblume. . . . .	Mutterkraut 930	
Hopfen . . . . .	413	Kümmel . . . . .	Nachtkerze . . . . .	172
Hornkraut. . . . .	34	Kunigundenkraut. . . . .	Nachtschatten . . . . .	260
Hornmohn. . . . .	67	Kürbiss 323	Nachtviole . . . . .	81
Huflattich . . . . .	370	Labkraut . . . . .	Nadelkerbel. . . . .	214
Hundsauge . . . . .	256	Lack . . . . .	Natterkopf . . . . .	254
Hundskamille . . . . .	353	Läusekraut. . . . .	Nelke . . . . .	20
Hundsrauke . . . . .	83	Lärche. . . . .	Nelkenwurz. . . . .	151
Hundswurz . . . . .	475	Laichkraut. . . . .	Nessel . . . . .	334
Hungerblume . . . . .	90	Lammkraut . . . . .	Nieswurz . . . . .	10
Igellock . . . . .	489	Laserkraut. . . . .	Nixkraut . . . . .	492
Igelsame . . . . .	255	Lattich. . . . .	Ochsenzunge . . . . .	248
Igelkolbe . . . . .	498	Lauch . . . . .	Odermennig . . . . .	157
Immerschön . . . . .	363	Lavendel . . . . .	Oelweide . . . . .	419
Incarnatklee 321		Lebensbaum . . . . .	Ohnblatt . . . . .	57
Johannisbeere 221		Leimkraut. . . . .	Ohnhorn . . . . .	473
Johanniskraut. . . . .	58	Lein . . . . .	Osterluzei . . . . .	424
Judasbaum . . . . .	122	Levkoje . . . . .	Pampasgras. . . . .	534
Judenkirsche . . . . .	263	Lichtnelke. . . . .	Pappel . . . . .	437
Kälberkropf . . . . .	213	Liebesapfel . . . . .	Pastinack . . . . .	202
Kalmus . . . . .	496	Liebstöckel . . . . .	Perlgras. . . . .	536
Kamille . . . . .	923	Lieschgras. . . . .	Pestwurz . . . . .	380
Kammgras. . . . .	536	Lilie . . . . .	Petersilie . . . . .	184
Karde . . . . .	342	Linde . . . . .	Peterstrauch . . . . .	328
Karnunkelstrauch. 149		Linse . . . . .	Pfefferkraut. . . . .	772

Pfefferminz . . .	752	Scheibenreich . . .	186	Spierstaude . . .	148
Pfeifengras . . .	537	Schierling . . .	215	Springkraut . . .	114
Pfeifenstrauch . . .	169	Schilf . . . . .	521	Spurre . . . . .	31
Pfeilkraut . . . .	449	Setaumkraut . . .	75	Stachelbeere . . .	220
Pfeilstrosee . . .	49	Schelwurz . . . .	178	Stechapfel . . . .	267
Pflirsichbaum . . .	143	Schlämmling . . .	271	Stechpalme . . . .	231
Pflaumenbaum . . .	146	Schorfkraut . . . .	258	Steinbrech . . . .	221
Pfötgen . . . . .	366	Schlehe 393		Steinklee . . . . .	132
Pfriemen . . . . .	105	Schlüssel . . . . .	253	Steinkraut . . . . .	88
Pfriemengras . . .	523	Schmalzblume . . .	35	Steinnelke . . . . .	229
Phalaris . . . . .	512	Schmeerwurz . . . .	468	Sternmiere . . . . .	90
Pimpinelle . . . .	160	Schmiele . . . . .	526	Stielsame . . . . .	391
Pimpernuss . . . .	55	Schneeball <i>b.</i> 840		Storchschnabel . . .	44
Platterbse . . . .	127	Schnabelsame . . .	502	Straussgras . . . .	519
Quecke 1509		Schneeglöckchen . .	472	Sumpfwurz . . . . .	484
Quellgras . . . . .	538	Schnittlauch 1214		Süssdolde . . . . .	213
Quitte . . . . .	483	Schottenklee . . . .	112	Süssholz . . . . .	297
Rade . . . . .	77	Schotenklee . . . .	119	Tabak . . . . .	266
Radieschen . . . .	86	Schuppenmiere . . .	26	Taglilie . . . . .	462
Ragwurz . . . . .	478	Schuppenwurz . . . .	285	Tännel . . . . .	37
Rainfarn . . . . .	359	Schwaden . . . . .	539	Täschelkraut . . . .	94
Ranke . . . . .	78	Schwalbenwurz . . .	237	Tanne . . . . .	444
Raponica . . . . .	172	Schwarzwurz . . . .	390	Tannenwedel . . . .	421
Raps 223		Schwannenblume . .	450	Taubenropf . . . . .	22
Rapünzchen . . . .	334	Schwarzdorn . . . .	393	Taubnessel . . . . .	790
Rapunzel 830		Schwarzkümmel . . .	41	Taunellolch 1494	
Raute . . . . .	112	Schwarde . . . . .	329	Tauröschen . . . . .	180
Raygras . . . . .	547	Schweinekraut . . . .	495	Tausendgarbe . . . .	351
Reis . . . . .	508	Schwertel . . . . .	469	Teichbinse . . . . .	502
Reitlig . . . . .	11	Schwingel . . . . .	545	Teufelsauge . . . . .	9
Riemenzunge . . . .	474	Seekanne . . . . .	240	Teufelskrallen . . .	318
Riet . . . . .	503	Seelilie . . . . .	64	Thurmkraut . . . . .	77
Ringelblume . . . .	361	Segge . . . . .	501	Thymian . . . . .	203
Rispengras . . . . .	542	Seide . . . . .	211	Tollkirsche . . . . .	264
Rittersporn . . . .	13	Seidelbast . . . . .	417	Traganth . . . . .	117
Roggen . . . . .	550	Seidenpflanze . . . .	285	Trespe . . . . .	544
Rohr . . . . .	533	Seifenkraut . . . . .	21	Ulme . . . . .	414
Rohrkolben . . . .	497	Senf . . . . .	85	Veilehen . . . . .	103
Rosenkohl . . . <i>g.</i>	222	Serradella 364		Venuspiegel . . . . .	317
Roskastanie . . . .	52	Sichelmöhre . . . . .	121	Vergissmeinnicht . .	251
Ruchgras . . . . .	509	Silbergras . . . . .	525	Verneinkraut . . . .	422
Rübe . . . . .	224	Silge . . . . .	197	Vogelfuss . . . . .	130
Rüben. . . . . <i>b.</i>	224	Simse . . . . .	503	Vogelkirsche . . . .	490
Rüster . . . . .	414	Sinau . . . . .	158	Vogelmilch . . . . .	455
Ruhrkraut . . . . .	364	Sinngrün . . . . .	236	Vogelnest . . . . .	485
Runkelrübe . . . .	405	Sockenblume . . . .	18	Wachholder . . . . .	465
Sadebaum 1181		Sonnenröschen . . . .	102	Wachtelweizen . . . .	279
Samtblume . . . . .	360	Sonnentau . . . . .	59	Waid . . . . .	99
Salvei . . . . .	760	Sonnenblume . . . .	319	Waldmeister 851	
Saubohne . . . . <i>a.</i>	346	Sonnenwende . . . .	259	Walderbse . . . . .	128
Saudistel . . . . .	396	Sommerwurz . . . . .	284	Waldnessel . . . . .	302
Sauerdorn . . . . .	17	Spargel . . . . .	463	Waldrebe . . . . .	1
Sauerklee . . . . .	40	Spark . . . . .	27	Waldvöglein . . . . .	483
Sauerkirsche 399		Spatenzunge . . . . .	418	Wallnuss . . . . .	430
Schachblume . . . .	453	Spelz 1507		Wasserdost . . . . .	348
Schattenblume . . .	466	Spinat 1104		Wasserlinse . . . . .	493
Schattenkraut . . . .	307	Spindelbaum . . . .	56	Wassernabel . . . . .	176
Scharle . . . . .	345	Spitzklette . . . . .	400	Wasserstern . . . . .	428

Wasserschlauch . . . . .	282	Widerbart . . . . .	481	Wurmkraut. . . . .	388, 940
Wau . . . . .	62	Wiesenknopf . . . . .	159	Yssop . . . . .	294
Wegerich . . . . .	230	Wiesenraute . . . . .	8	Zaunrübe . . . . .	321
Wegedorn . . . . .	104	Winde . . . . .	245	Zeitlose . . . . .	451
Weichkraut . . . . .	36	Windhalm . . . . .	521	Ziegenfuss . . . . .	182
Weide . . . . .	486	Windröschen . . . . .	3	Ziestl. . . . .	304
Weidenröschen . . . . .	471	Winterblume . . . . .	355	Zinnensaat . . . . .	385
Weiderich . . . . .	133	Wintergrün . . . . .	61	Zirnet . . . . .	204
Wegwarte . . . . .	383	Winterkresse . . . . .	73	Zittergras . . . . .	541
Weinstock . . . . .	150	Winterling . . . . .	9	Zweiblatt . . . . .	486
Weissdorn . . . . .	162	Wirbeldost . . . . .	296	Zwenke . . . . .	347
Weissstanne . . . . .	1178	Wohlverleih . . . . .	374	Zwiesel . . . . .	208
Weisswurz . . . . .	463	Wolfsfuss . . . . .	289	Zwiebel 1216	
Weizen . . . . .	552	Wolfsmilch . . . . .	425		
Wendelorchee . . . . .	487	Wollgras . . . . .	504		
Weymuthskiefer . . . . .	1174	Wollwurz . . . . .	250		
Wicke . . . . .	123	Wundklee . . . . .	289		

### III. Noms en idiome luxembourgeois.

Abkraut . . . . .	984	Batteralzem . . . . .	937	Bordurierbes . . c.	347
Ablatz . . . . .	774	— welle . . . . .	936	Botterblät . . . . .	1074
Abriko. . . . .	392	Beaumier . . . . .	1179	Botterblum <sup>1)</sup> . . . . .	23
Abrikosebäm . . . . .	392	Bettfös . . . . .	770	Bourage . . . . .	633
Acacien . . . . .	293	Beidelschmidder . . . . .	250	Boutsch . . . . .	1003
Ackerlaus . . . . .	556	Beifoss . . . . .	936	Brandkraut . . . . .	387
Aesp . . . . .	1161	Beirooz . . . . .	1199	Bratzel . . . . .	1214
Allekapp . . . . .	1257	Benzeller . . . . .	490	Bredercheskraut . . . . .	132
Ahlenter . . . . .	1164	Bergamottebir. . . . .	485	Brehm . . . . .	431
Alzem . . . . .	358	Beschweid. . . . .	1053	Brehmendaar . . . . .	431
Amerikanesch Perdsbier	[434	Bettséchesch . . . . .	1009	Brenndeschtel 1098,	1099
Andiv . . . . .	990	Bësy . . . . .	485	— giel . . . . .	780
Aneis . . . . .	530	Beurre. . . . .	485	— ród . . . . .	777
Aneiskierwel . . . . .	568	Bieh . . . . .	1132	— weiss. . . . .	778
Anthonisthee . . . . .	794	Bierek . . . . .	1165	— well . . . . .	790
Apelbäm . . . . .	485	Bigarro . . . c.	398	— zahm. . . . .	778
Appetit . . . . .	1204	Bir. . . . .	485	Brennende Liebe . . . . .	73
Arlesbäm . . . . .	492	Birebäm . . . . .	485	Brochdeschtel . . . . .	515
Armenee . . . . .	56	Birefang . . . . .	610	Brochkraut . . . . .	473
— Gräs . . . . .	60	Birreselchen . . . . .	610	Brockelè . . . c.	222
— well . . . . .	54	Bliederzalót . . . . .	1017	Brugnon . . . b.	390
Artischô . . . . .	886	Bloderkraut . . . . .	209	Buchacker . . . . .	1132
Aaschtert . . . . .	147	Blò Kuorblum. . . . .	906	Burekascht . . . . .	204
Aaschtholz. . . . .	147	Bocksbärt . . . . .	1103	— welle . . . . .	680
Asperseh . . . . .	1224	— . . . . .	1240	Euisson-ardent. . . . .	480
Aspern. . . . .	477	Böhn . . . . .	346	Cabisett. . . . .	869
Aster . . . . .	969	— Garde- . . b.	346	Calebass. . . . .	837—838
Balsamin . . . . .	115	— Mier-. . . . .	328	Calvill . . . . .	487
Bältes . . . . .	866	— Perds- . . . . .	346	Caméleblum . . . . .	927
Bämnoss . . . . .	1130	— Sau- . . . . .	346	Caneda . . . . .	1163
Bannweid . . . . .	1150	— Stache- . . a.	328	Cèdre de Virginie . . . . .	1182
Bârtel . . . . .	1003	— Stäckelches- b.	328	Celleree. . . . .	185
Bartunekel. . . . .	794	Böhnekreitgen. . . . .	772		
Basilik. . . . .	746	Bonzei . . . . .	610		
		Bonzenkraut . . . . .	570		

1) Toutes les Renonculacées à fleurs jaunes sont comprises sous ce nom.

Cinerair . . .	972	Éech, Summer-	1134	Fullegrétchen . . .	292
Chicong . . .	c. 1017	— Steen-	1134	Fullegrieschen . . .	1450
Chikoré welle . . .	989	— Wanter-	1135	Fullegras . . .	91
Chou-fleur . . .	a. 222	Eerblum . . .	290	Fullekisch . . .	490
Chrysanthèm . . .	932	Eerblum . . .	1009	Fullekischtebàm . . .	490
Colerây . . .	e. 222	Eiseech . . .	1135	Fullekraut . . .	91
— Erd-	b. 223	Ehrholz . . .	51	Fullesæmchen . . .	1387
Colza . . .	223	Ehrepreis . . .	683	— . . .	1396
Coklikô . . .	173	Elechter . . .	490	Gaffel . . .	435
Coriander . . .	571	Ellend . . .	515	Gänsekreitchen . . .	91
Cornichong . . .	835	Eller . . .	1164	— . . .	597
Cornichongskraut	549	Ellriecher . . .	490	Gardebón . . .	346
Court-pendu . . .	487	Engelsblum . . .	173	Gardegránt . . .	817
Corsonnier . . .	1005	Engelsblimmchen . . .	950	Geckege Klée . . .	304
Cotong . . .	1377	Engelskapp . . .	173	Geesbläd . . .	847
Creschtblum . . .	37	Englesche Wees . . .	1506	Geesklé . . .	614
Cressong . . .	251	Enn . . .	1216	Geeskraut . . .	92
Cruchtblum . . .	1250	Enzian . . .	241	Gehaansblum . . .	929
Daarâpel . . .	667	Eppelbàm . . .	486	Gehaanskréschel . . .	577
Dahlia . . .	983	Epicia . . .	1176	Genz . . .	277
Dahndeschtel . . .	781	Erdbier . . .	439	Gehänkte Männchen . . .	1239
Dämantel . . .	472	Erdknuod . . .	520	Geifer . . .	1180
Damaschtblum	b. 218	Erdkréschel . . .	432	Giel Brenndeschtel . . .	780
Damaschtepraum	b. 394	Erdkolerây . . .	b. 223	Giele Klée . . .	314
Daudeschtel . . .	781	Erdnoss . . .	353	Giel Lilie . . .	1223
Dausendblum . . .	669	Esch . . .	605	Giele Männchen . . .	289
Dausendknuod . . .	367	Esp. . . .	1161	Giele Sæmchen . . .	242
Dausendguldekraut	624	Estragon . . .	935	Giel Weid . . .	b. 1142
Dausendschéergen	921	Eweg Blimmchen . . .	946	Gielzegskraut . . .	178
Dauveföss . . .	425	Ewege Peinetsch . . .	1075	Giersch . . .	519
Deiwelswurzel . . .	1075	Fajoil . . .	264	Giesekraitgen . . .	597
Dell . . .	519	Fangerhutt . . .	705	Giescht . . .	1498
Delpes . . .	26	— . . .	824	— well . . .	1496
Denn . . .	1171	Faulbàm . . .	276	Goldblum . . .	949
Deschtel . . .	887	— røde . . .	573	Goldwurzel . . .	43
— Broch-	515	— schwarze . . .	276	Gottesvergess . . .	796
— Dråhm-	885	— weisse . . .	844	Grandkraut . . .	876
— Wiesen-	892	Feechholz . . .	1102	Grasarnicée . . .	60
Diederchen . . .	242	Feierblum . . .	971	Grasilie . . .	1219
Dódeblée . . .	848	Feierkraut . . .	495	Greiskraut . . .	962
Domeldaar . . .	287	Fenchel . . .	538	Greng Heedekaar . . .	1091
Domerian . . .	955	Fescherkraut . . .	1112	Gréschel . . .	576
Domporen . . .	351	Fetz . . .	340	— deck . . .	576
Donnerkraut . . .	389	Fichtenholz . . .	1102	— Erd- . . .	432
Doucín . . .	487	Fils-avant-le-père . . .	10	— röth . . .	576
Dragunner . . .	447	Fimmel . . .	1094	— schwarz . . .	576
Drämdeschtel . . .	885	Fioringras . . .	1405	— weiss . . .	576
Dreschklée . . .	a. 315	Flékraut . . .	955	Gri-gra-Grieschen . . .	1450
Dreidaar . . .	50	Fléschblum . . .	74	Gromes . . .	29
Dreiföss . . .	519	Flockegras . . .	1377	Grompier . . .	660
Dreijährege Klée	b. 316	Fluos . . .	108	— russesch . . .	918
Dronkekaar . . .	1494	Fli-fla-flieschen . . .	1450	Guckgucksblum . . .	588
Dunggras . . .	1509	Focksschwanz . . .	1043	— . . .	589
Durchkraut . . .	516	Fransésche Pálm . . .	1184	— well . . .	649
Éech . . .	430	Frém . . .	631	Guckgucksbród . . .	100
— Eis-	1139	Frescheblum . . .	35	Guckguckséer . . .	1189
— Fräiche . . .	1134	Fröng . . .	627	Guimov . . .	134
— Männchen . . .	1135	Fugelskraut . . .	1055	Gunclriev . . .	774



Gurgel . . . . .	699	Ierbes . . . . .	347	Klée, dreijährige <i>b.</i>	316
Haackernoss . . . . .	1130	— Bordur-	347	— Dresch-	<i>a.</i> 315
Hambier . . . . .	433	— Pell-	347	— geckege . . . . .	304
Happ . . . . .	414	— Rides-	347	— Gees-	614
Happklée . . . . .	320	— Zocker-	347	— giele . . . . .	314
Hartholz . . . . .	145	terben . . . . .	844	— Happ-	320
— . . . . .	492	Ieselsföss . . . . .	985	— Hybrid-	326
Hartknep . . . . .	910	Ieselsöeren . . . . .	1298	— Stée-	366
Hartnohl . . . . .	58	Igelskraut . . . . .	435	— russesche . . . . .	321
— . . . . .	573	Jasming, welle . . . . .	493	— weisse . . . . .	325
Harttrutt . . . . .	573	Jenk . . . . .	499	— welle . . . . .	317
Hèderzatöt . . . . .	<i>b.</i> 1017	Jerschen . . . . .	572	Kliend . . . . .	899
Heed . . . . .	587	Jockobstäf . . . . .	626	Klied . . . . .	863
Heedekaar . . . . .	1090	Joli-bois . . . . .	1102	Knäf . . . . .	863
— greng . . . . .	1091	Judendrauw . . . . .	386	Kneppgen . . . . .	474
— well . . . . .	1089	Judekischt . . . . .	664	Knuodlesch . . . . .	1303
Heckewann . . . . .	628	Judenholz . . . . .	846	Knuoweleck . . . . .	1203
Heelriew . . . . .	774	Judesél . . . . .	846	Kockelter . . . . .	152
Heelwurzel . . . . .	636	— . . . . .	1	Kokkraut . . . . .	1123
Hèerblum . . . . .	164	Jungfer-im-Grünen	41	Kohtuht . . . . .	1189
Heifkraut . . . . .	795	Kaasel . . . . .	722	Kohwees . . . . .	727
Hemmelsplanken . . . . .	781	Kabes . . . . .	<i>b.</i> 922	— welle . . . . .	726
Herzgespann . . . . .	245	— røde . . . . .	222	Koir . . . . .	551
Hespel . . . . .	477	— weisse . . . . .	222	Koirblum . . . . .	173
Hexemeléeh . . . . .	1121	Käsch . . . . .	1133	— blö . . . . .	906
Hexestrang . . . . .	1	— well . . . . .	148	— ród . . . . .	173
Hielenter . . . . .	841	Käschtebäm . . . . .	1133	Koischt . . . . .	1134
— rólen . . . . .	840	— welle . . . . .	148	Kool . . . . .	223
— wellen . . . . .	842	Kälzercher . . . . .	322	— Summer-	223
— schwarzen	841	Kaffé, welle . . . . .	285	— Wanter-	223
Hierschblum . . . . .	1189	Kalmes . . . . .	1300	— -Söm . . . . .	223
Hieselnoss . . . . .	1139	Kardel . . . . .	882	Krackelnoss . . . . .	139
Hieseller . . . . .	1139	Kamélleblum . . . . .	923	Kranzblum . . . . .	141
Hieschem . . . . .	1395	— . . . . .	927	Krêschel . . . . .	576
Huosesauerampel	1068	— Honds-	928	— Erd-	432
Huosebröd . . . . .	110	— well . . . . .	927	— Gehannes-	577
Huosemöss . . . . .	987	Kätzeföss . . . . .	1030	— ród . . . . .	577
Huuseläffel . . . . .	1185	Kätzekielwel . . . . .	183	— schwarz . . . . .	579
Huower . . . . .	1423	Kätzekraut . . . . .	927	— weiss . . . . .	577
— Straussen-	1424	Kätzenä . . . . .	635	Kretzschiel . . . . .	276
— well . . . . .	1427	Kätzeschwanz . . . . .	600	Kreiskreidchen . . . . .	973
Holzäpel . . . . .	486	Kéesblum . . . . .	200	Kreizdenn . . . . .	1178
Holzäpelbäm . . . . .	486	Kéeskreitgen . . . . .	132	Krombier . . . . .	660
Hombuch . . . . .	1140	Kéerweid . . . . .	1150	— russesche . . . . .	918
Hondsäseh . . . . .	477	Kellerholz . . . . .	604	Kuckguksblum . . . . .	588
Hondsäsehbäm . . . . .	477	— . . . . .	1102	Kundelkraut . . . . .	763
Hondsdeschtel . . . . .	890	Késérkrön . . . . .	1192	Kwetsch . . . . .	396
Hondskamelleblum	925	Ketteblum . . . . .	1009	Kwetschebäm . . . . .	396
Hondspeterselig . . . . .	534	Kierel . . . . .	574	Laun . . . . .	139
Hondsröss . . . . .	438	Kierwel . . . . .	563	— . . . . .	140
Hondswierger . . . . .	612	Kierfechsblum . . . . .	944	— well . . . . .	1097
Hoobich . . . . .	1140	Kill . . . . .	1131	Langhalm . . . . .	1431
Hoodaar . . . . .	478	Kimmel . . . . .	42	Lantago . . . . .	1164
Hunneknep . . . . .	973	Kisch . . . . .	398	Lavendel . . . . .	745
— . . . . .	411	Kischtebäm . . . . .	398	Lefstack . . . . .	541
Hunnegsäck . . . . .	778	Klackebblum . . . . .	818	Lehmblát . . . . .	985
Hybridklée . . . . .	326	Kleckkraut . . . . .	64	Leiskraigen . . . . .	717
Ierbes . . . . .	347	Klée . . . . .	120	Leiskraut . . . . .	720

Leiskraut . . . . .	377	Moteler . . . . .	843	Polferholz . . . . .	276
Lenneblut . . . . .	573	Moutz . . . . .	614	Pomme d'amour . . . . .	662
Lens . . . . .	345	— ród. . . . .	153	Pompadour . . . . .	494
Lentes . . . . .	470	— schwarz . . . . .	604	Porgéeerkraut . . . . .	659
Lensöeren . . . . .	351	Mudderkraut . . . . .	48	Porgéeerkier . . . . .	1111
Leeffrãbettströe . . . . .	761	Mutterkraut . . . . .	930	Poretz . . . . .	1267
Leeffrãwesch . . . . .	541	Muurwied . . . . .	1154	Portulak . . . . .	371
Lesch . . . . .	1369	Murth . . . . .	555	Pouplier . . . . .	1162
— . . . . .	1138	Nareiss. . . . .	1236	Praum . . . . .	395
Léyemaul . . . . .	711	Nêchesblum . . . . .	697	— Damaschte <i>b</i> . . . . .	394
Lichtblum . . . . .	1189	Noisscheet . . . . .	658	— Russesch . . . . .	397
Lilie, giel . . . . .	1223	Noss . . . . .	1130	— Scheis-. . . . .	394
— Gräs- . . . . .	1219	Nössert . . . . .	1130	Praumbãm. . . . .	395
— ród . . . . .	1293	Ongräs . . . . .	1509	Quarantaine . . . . .	189
— Wässer-. . . . .	1234	Orangebãm, wellen . . . . .	493	Quetsch . . . . .	396
— weiss . . . . .	1194	Orikeleher . . . . .	391	Quetschbãm . . . . .	396
Longekraut . . . . .	649	Oschterblum . . . . .	6	Quidebãm . . . . .	483
Lord Weymouth . . . . .	1174	Pãfeschêngchen, ród . . . . .	153	Quidebir . . . . .	483
Luping . . . . .	284	— schwarz . . . . .	604	Rãckkraut . . . . .	183
Luzer . . . . .	306	Pãlm . . . . .	1125	Rambour . . . . .	487
— russesch. . . . .	301	— fransésesche . . . . .	1184	Ramheed . . . . .	281
Mãrzblum . . . . .	230	Pampulgen . . . . .	1162	Ramlass . . . . .	230
— . . . . .	1102	Pãschelblum . . . . .	49	Rankelter . . . . .	846
Mãrzvejöl . . . . .	190	Paradis. . . . .	487	Rapouzel . . . . .	817
Mairón . . . . .	762	Pavò . . . . .	172	Rapunzel . . . . .	830
Mandel. . . . .	391	Pavòskapp. . . . .	172	Raut . . . . .	112
Mandelbãm . . . . .	391	Peffler, spuonesche . . . . .	661	Redig, Mond- . . . . .	230
Manz . . . . .	288	Pefflerkraut. . . . .	772	— Wanter- . . . . .	230
Mãrgrétechen . . . . .	934	Pefflermanz. . . . .	752	Reine-des-près. . . . .	403
Marmottebir . . . . .	485	Peiffenholz. . . . .	1110	Reine-claude . . . . .	395
Marong . . . . .	1133	Peinetsch . . . . .	1046	— Marguerite . . . . .	969
Masselter . . . . .	145	— . . . . .	1051	Reinett . . . . .	487
Mauerkreitgen . . . . .	380	— . . . . .	1052	— des vergers <i>c</i> . . . . .	487
Mauerselechen . . . . .	717	— éwege . . . . .	1073	Reigras . . . . .	548
Méderchesblum . . . . .	928	Peischlrós. . . . .	49	Rengelblum. . . . .	933
Meebich . . . . .	1140	Pelpes . . . . .	26	Renglod. . . . .	<i>c</i> . 395
Meekraut . . . . .	851	Pellierbes . . . . .	<i>b</i> . 347	Reseda . . . . .	169
Meerésgen. . . . .	1225	Pempernelle . . . . .	476	— welle . . . . .	168
Meisséeerchen . . . . .	869	Pensée. . . . .	270	Rib . . . . .	<i>b</i> . 224
Meleze . . . . .	1175	Perce-neige . . . . .	1238	Ribkraut . . . . .	<i>a</i> . 224
Melón . . . . .	836	Perdsbier . . . . .	408	Ridesierbes. . . . .	<i>b</i> . 347
Mesch . . . . .	1094	Perdsblum. . . . .	<i>b</i> . 830	Rief . . . . .	150
Meshtel . . . . .	575	Perdsbón . . . . .	346	— well. . . . .	151
Mespel . . . . .	477	Perdsgrãs . . . . .	1407	Rocambole . . . . .	1206
Metzvejöl . . . . .	191	Perdercheswurzel. . . . .	1298	Ród Brenndeschtel. . . . .	777
Mierbón . . . . .	328	Perdrigon. . . . .	<i>b</i> . 395	Ród Denn . . . . .	1176
Mierrédeg . . . . .	239	Péterséleg. . . . .	522	Róden Hicenter . . . . .	840
Mieschen . . . . .	322	Péterstãf . . . . .	960	Róde Faulbãm . . . . .	573
Millionair . . . . .	188	Petner . . . . .	550	Róde Pãfeschêngchen . . . . .	153
Millebilzen . . . . .	481	Pettendierechen . . . . .	464	Róde Kabes. . . . .	<i>c</i> . 222
Millebierechen . . . . .	478	Petitpouen. . . . .	<i>b</i> . 347	Ródholz. . . . .	1193
Mirabel . . . . .	<i>d</i> . 395	Pieg . . . . .	143	Ródkãppechen . . . . .	474
Moderselchen . . . . .	843	Piegebãm . . . . .	143	Ród Kuorblum . . . . .	173
Mókesauerampel . . . . .	1069	Plaine . . . . .	147	Ród Kréschel . . . . .	577
Mólbier . . . . .	815	Plaut . . . . .	890	Ródlilie . . . . .	1293
Mondkraut . . . . .	592	Plattãpel . . . . .	487	Ród Moutz . . . . .	153
Mondrédig . . . . .	230	Plattdennen . . . . .	1168	Rodthen. . . . .	1176
Monzelter . . . . .	843	Poirier du Japon . . . . .	484	Roid. . . . .	77

Rommel . . . . .	1053	Schwarzkréschel . . . . .	579	Tirkische Wees . . . . .	1383
Roos . . . . .	163	Schwarzwurzel . . . . .	1005	Tomat . . . . .	622
Rosemarin . . . . .	737	Schwengselness . . . . .	652	Touback . . . . .	666
Rose papate . . . . .	136	Schwengswurzel . . . . .	834	Trauerweid. . . . .	1144
Rousselett . . . . .	485	Schwerholz . . . . .	492	Treipekreitgen . . . . .	765
Rutabaga . . . . .	223	Scorzoner . . . . .	1005	Tripmadam . . . . .	383
Russischen Apel . . . . .	488	Séhm 1) . . . . .	1293	Tulipant. . . . .	1190
Russesehe Klée . . . . .	321	Selverblät . . . . .	450	Turneps. . . . .	b. 223
Russeseh Krombier . . . . .	918	Setradella . . . . .	354	Tuten . . . . .	552
— Luzer . . . . .	301	Séssholz . . . . .	297	Uchteblum . . . . .	1189
— Praum . . . . .	397	Sésselblum . . . . .	127	Ungrás . . . . .	1509
Salfei . . . . .	760	Sievbam . . . . .	1181	Valjoll . . . . .	264
Salot, Blieder- . . . . .	1017	Silvester . . . . .	1171	Veitgesblum . . . . .	933
— Heder- . . . . .	b. 1017	Smef . . . . .	226	Vergissmeinnicht . . . . .	251
Salsitís . . . . .	1000	Sonneblum. . . . .	917	— . . . . .	655
Samel . . . . .	843	Spackel . . . . .	468	Vijöl . . . . .	264
Sametholz . . . . .	840	Spackeldaar . . . . .	468	— März- . . . . .	190
Sametwiel . . . . .	840	Spackelter . . . . .	468	— Metz- . . . . .	190
Sapinet . . . . .	1177	Spargel . . . . .	1224	— well . . . . .	265
Saubón . . . . .	346	Speer . . . . .	489	Vijöllchen . . . . .	264
Saudeschtel . . . . .	1019	Speerebam . . . . .	489	Vugelskraut . . . . .	1055
Sauerampel . . . . .	1067	— welle . . . . .	491	Vullegreeschen . . . . .	544
— Huose . . . . .	1068	Spelz . . . . .	1507	— . . . . .	1450
— Móke- . . . . .	1069	Spuonesch Grás . . . . .	598	Vullegretgen . . . . .	292
— welle . . . . .	1068	Spuonesche Pfeffer . . . . .	661	Vullegrás . . . . .	91
Sauerkischt . . . . .	399	Spuorblum . . . . .	44	Vullekraut . . . . .	1055
Saunekel . . . . .	513	Sprenze Wees . . . . .	1505	— . . . . .	91
Savoyer . . . . .	c. 222	Stachebón . . . . .	a. 328	Vullekisch . . . . .	490
Schalott . . . . .	1215	Stäckelesesbón . . . . .	b. 328	Vullekischtebam . . . . .	490
Schalotten Ean . . . . .	1217	Stagbón . . . . .	288	Vullesamchen . . . . .	1387
Scharlach . . . . .	565	Steeklée . . . . .	366	— . . . . .	1396
Schéférnöl . . . . .	569	Steenéeh . . . . .	1134	Wäckelter . . . . .	1180
Schéférnoss . . . . .	402	Stenkert . . . . .	125	— Kier . . . . .	1180
Scheisdaar . . . . .	275	Stenkigen Höffert . . . . .	942	Walddeschtel . . . . .	603
Scheispraum . . . . .	394	Straussenhuover . . . . .	1425	Waldmeeschter . . . . .	851
Scheiskraut . . . . .	1054	Stréhpatsch . . . . .	915	Wann . . . . .	627
Scheismiel . . . . .	1056	Summeréeh . . . . .	1134	Wannkraut . . . . .	627
Scheldkraut . . . . .	802	Summerwees . . . . .	a. 1504	Wantercrepp . . . . .	d. 1017
Schierling . . . . .	570	Tackekraut . . . . .	712	Wanteréeh . . . . .	1135
Schlappmöss . . . . .	a. 222	Täckeblum . . . . .	669	Wantergiescht . . . . .	1500
Schlaufhölzchen . . . . .	845	Tändeldaar . . . . .	287	Wantergréng . . . . .	572
Schlesselblum . . . . .	590	— . . . . .	288	Wanterkool . . . . .	a. 223
— . . . . .	1018	Tausendguldekraut . . . . .	624	Wantermöss . . . . .	a. 222
Schléw . . . . .	393	Tausendknuod . . . . .	367	Wanterwees . . . . .	572
Schléwendaar . . . . .	393	— . . . . .	1085	Wassergrás . . . . .	509
Schmalzblum . . . . .	35	Tausendschéergen . . . . .	921	Wasserhousar . . . . .	b. 1162
Schmalzkraut . . . . .	584	Tausendwurzel . . . . .	1075	Wasserlesch . . . . .	1188
Schmeerwurzel . . . . .	387	Teechholz . . . . .	1102	Wasserhlie . . . . .	1234
Schneeball . . . . .	b. 844	Tennegrás . . . . .	1085	Wasserweid. . . . .	1154
Schoeckischt . . . . .	b. 398	Teymergenchen . . . . .	763	Weeblät . . . . .	599
Schöfszong . . . . .	654	Thimotee . . . . .	1402	Weedaa . . . . .	275
Schuurbock . . . . .	34	Thuja . . . . .	1183	Weegrás . . . . .	1086
Schwarze Faulbam . . . . .	276			Wees . . . . .	1504
Schwarzen Hielenter . . . . .	841			— englesche . . . . .	1506
Schwarz Holz . . . . .	276			— Sprenze- . . . . .	1505
— Moulz . . . . .	604			— Summer- . . . . .	a. 1504
Schwarze Päfeschengchen . . . . .	[604			— tirkische . . . . .	1383
				— Wanter- . . . . .	1504

1) Les Potamées, les Naya-  
dées et les Renoucles  
aquatiques, comprises  
dans cette dénomination  
générale, sont employés  
à l'alimentation du bétail  
sur la Moselle.

Weid . . . . .	436	Welle Chikré . . . . .	989	Weymouth . . . . .	1174
— Bann- . . . . .	1150	Well Denn. . . . .	1171	Wibbel-de-Wabbel.	1450
— Besch- . . . . .	1153	— Heedekaar . . . . .	1089	Wick . . . . .	337
— giel . . . . .	b. 1142	— Giècht . . . . .	1496	— well . . . . .	332
— Keeffer- . . . . .	1150	— Gugucksblum . . . . .	649	— — . . . . .	335
— Muor- . . . . .	1151	Welle Kohwees . . . . .	726	Wierk . . . . .	1094
— Trauer- . . . . .	1142	Wellen Hielenter . . . . .	842	Wiesegemmelchen . . . . .	521
— Wasser- . . . . .	1154	Well Huover . . . . .	1427	Wieselchen . . . . .	237
Weidenâpel . . . . .	c. 487	Welle Jasmeng . . . . .	493	Wiesendeschtel. . . . .	892
Weiderich . . . . .	595	— Käschtebâm . . . . .	148	Wierchem . . . . .	c. 222
Weissdaar . . . . .	478	— Kaffée . . . . .	283	Wolfskraut . . . . .	899
Weissdenn. . . . .	1178	Well Kameleblum. . . . .	927	Wolfsmelech . . . . .	1121
Weiss Brenndeschtel	778	Welle Kischtebâm. . . . .	398	Wollkraut . . . . .	669
Weisse Faulbâm . . . . .	844	— Klée . . . . .	317	Wullich. . . . .	669
Weissholz . . . . .	844	Wellkuor . . . . .	1090	Wurmkraut. . . . .	940
Weisse Kabes . . . . .	b. 222	Well Lann . . . . .	1097	Wurzel . . . . .	553
— Klée . . . . .	325	Wellen Orangebâm . . . . .	493	Zahn Brenndeschtel	778
Weiss Lilie . . . . .	1194	Well Rief . . . . .	151	Zalfei . . . . .	760
Weisswurzel . . . . .	1000	Welle Reseda . . . . .	168	Zahnsämchen . . . . .	668
— . . . . .	1228	Welle Sauerampel. . . . .	1068	Zelleré . . . . .	523
Well Armenee . . . . .	54	Well Speeren . . . . .	491	Zennethlieder . . . . .	1111
— Batteralzem . . . . .	936	Welle Speerebâm. . . . .	491	Zierkraut . . . . .	794
Welle Birebâm . . . . .	483	Well Vijöl . . . . .	263	Zockerierbes . . . . .	a. 347
Well Brenndeschtel . . . . .	790	— Wick . . . . .	332	Zweeblât . . . . .	1229
Welle Burekascht. . . . .	680	Wesch . . . . .	936		

## TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

---

---

Prolégomènes . . . . .	1
Liste des personnes auxquelles sont dues le plus grand nombre d'indications de localités. . . . .	6
Ouvrages botaniques concernant la Flore du Grand-Duché .	7
Abréviations et signes. . . . .	7
Plantes Phanérogames ou Cotylédonées . . . . .	8
Calendrier des floraisons . . . . .	199
Additions et corrections . . . . .	245
Table des familles, des genres, des espèces et des synonymes	247
Table des genres: noms vulgaires français . . . . .	268
Table des genres: noms vulgaires allemands . . . . .	270
Table des noms vulgaires en idiome luxembourgeois. . . . .	273

---





## **Pour paraître en 1874 :**

KOLTZ J.-P.-J. — Prodrôme de la Flore du Grand-Duché de Luxembourg.

### **II<sup>e</sup> partie. — Plantes Cryptogames.**

---

Nous prions les personnes qui se sont livrées ou qui se livrent à l'exploration botanique du Grand-Duché de bien vouloir nous communiquer les Plantes Cryptogames qu'elles possèdent. Nous recevrons également avec reconnaissance les plantes vasculaires nouvelles, rares ou douteuses qu'elles voudraient nous adresser, afin de compléter le Prodrôme ci-dessus.

Nous nous engageons à les leur renvoyer si elles le désirent ou à leur offrir en échange les doubles de notre herbier. Le seul but de parvenir à la connaissance des richesses végétales du pays, par le concours de tous, est notre mobile. C'est ce qui justifie l'appel que nous faisons par la présente à la coopération active des disciples de Flore.

---

---







New York Botanical Garden Library

QK 299 .K65 pt.1 gen  
Koltz, Jean Pierre/Prodrome de la flore



3 5185 00105 4947

